

A X P



124 28,840 / A / 2
4th

30 - 48.

must have.

MANUALE

MEDICORUM

RENOVATUM ET AUCTUM,

ACCURANTE

M. HENRICO GUYOT, F. A.

Doctore-Regente Medico Parisiensi.

mort le 28 Mars 1740.

ARS MEDICA, & divi-
nitùs accepta est, & divi-
nitùs exercetur. Nonne RAPHA-
ELEM Archangelum *Hebræi* volunt
hujus artis opus exercuisse? Mit-
tamus reliquos. CHRISTUS ipse,
tanquàm generis humani Medi-
cus, ægros, ægrotosque quot-
cumque offerebantur, curabat,
discipulisque tradidit potestatem
Medendi. Hanc igitur artem, ut-
potè nobilissimam, Reges medi-
tari & exercere quondam nequa-
quàm dedignabantur. Quales fue-
runt SABOR & GIGES *Medorum*
Reges, SABID Rex *Arabum*, MI-
THRIDATES *Ponti* Rex, *Ægyptio-*
rum verò HERMES, MESUE Regis
Damasci nepos. Volunt nonnulli
& AVICENNAM fuisse *Cordubæ*
principem, &c.

*Marsilius Ficinus Lib. i. Epist. ad
Thomam Valerium physicum.*

Hippocrates

42530

MANUALE MEDICORUM,

S E U

PROMPTUARIUM HIPPOCRATIS

APHORISMORUM, PRÆNOTIO-
NUM, PRÆDICTIONUM ET
COACARUM, secundum propriam
morborum omnium nomenclaturam,
alphabetico digestum ordine.

Jàm olîm editum à D. HONOR. BICAISSIO.
D. M. & Prof. Pr. Aq.

*De novo recollectum, plurimis novis accessio-
nibus auctum, & insignioribus Aurelii-
Cornelii Celsi sententiis locupletatum*

A M. HENRICO GUYOT Flexico-
Andegavenfi, Doctore-Regente Medico
Parisiensi.



Martin Langer

LUTETIÆ - PARISIORUM,

Apud QUILLAU, Facul. Med. Typographum,
viâ vulgò dictâ Gallande, ad Forum
M. Alberti, sub signo Annunciationis.

M. DCC. XXXIX.

Cum Approbationibus & Privilegio Regis.





SAPIENTISSIMO

NOBILISSIMOQUE VIRO

D. D. JOANNI-BAPTISTÆ

SILVA,

DOCTORI-REGENTI MEDICO

PARISIENSI,

SALUBRIS CONSILII REGII SOCIO,

SERENISS. DUCIS BORBONII

MEDICO ORDINARIO,&c.



IHI serió pensi-
tanti, VIR PRÆ-

CLARISSIME,

quodnam munus tibi præbere

A ij

possem, ut grati animi pignus
 & monumentum erga te
 publicè expromerem, satiùs
 visum est sententias Prin-
 cipum Medicorum sub tuis
 auspiciis promulgare, quàm
 opus aliquod proprium, sed
 levidense munusculum, tibi
 offerre, hâc ratione meliùs
 illustris nominis tui gloriæ
 consulam, quod nihil mi-
 hi antiquius unquam erit.
 Huic incepto perficiendo
 animum addidit, quod ubi
 ope & consiliis tuis indigeo,
 votis benignè annuere jam
 dudum solitus es, VIR ME-
 RITISSIME, quotiescunque
 auxilium tuum expetiverim,
 semper tutela ac dulce præ-
 sedium meum fuisti; non se-

mèl gravissimo morbo labo-
rantem ex orci faucibus eri-
puiſti, meæ incolumitatis ita
ſtudioſus ut nulli labori pe-
perceris. Hoc beneficium
eò majus videri debet, quod
inſinitis negotiis implicitus,
parcus tam pretioſi tempo-
ris eſſe debeas: quippè Ur-
bi paritèr & Aulæ apprimè
notum omnes te, VIR EXPE-
RIENTISSIME, de ſuâ ſa-
lute conſulere geſtiunt. VIR
nominis famâ celeberrimus,
doctrinâ ornatiffimus, &
eâ vi ingenii præditus ut
ſagacitas in te, cum urbani-
tate & ſacundiâ certare vi-
deatur. LUDOVICUS NO-
STER REX CHRISTIA-
NISSIMUS pluriès cum ſuc-

cessu tuis consiliis usus est.
 Insupèr SERENISSIMUS
 DELPHINUS, firma no-
 stra spes atque Augustis-
 simi Patris incrementum,
 perfectam & constantem
 sanitatem adeptus est, cui
 operi absolvendo tuæ Consul-
 tationes, VIR PRÆSTAN-
 TISSIME, unà cum Archia-
 tro illustrissimo & aliis Me-
 dicis aulicis, maximè profi-
 tuæ fuere, quod REGEM NO-
 STRUM MUNIFICENTIS-
 SIMUM adduxit, ut tibi
 clariora nobilitatis insignia
 largiretur. REX NOSTER
 INVICTISSIMUS non minùs
 nobilitandos esse censet eos,
 qui sospitem atque incolu-
 mem gentis protectorem ser-

vant, quàm illos qui hostes
regni fugant atque arcant.
Vivas ergò diù, DO-
CTOR NOBILISSIME,
atque Saluberrimi Ordinis
Parisiensis decus & orna-
mentum non mediocre, nam
non solùm Medicinæ facien-
dæ invigilas, sed etiam alios
erudire scriptis tuis doctis
& elegantibus dignatus es.
Utinam Praxim & Theo-
riam per multos annos exer-
cere & illustrare pergas!
Hæc sunt vota,

COLLEGA COLENDISSIME,

Addictissimi tibi & devotissimi;
H. GUYOT, Doct. Reg.
Med. Paris.

A iiij



LECTORI BENEVOLO

H. BICAISSIUS S.

SPARSA passim Divi *Hippocratis* placita (*Lector Clarissime*) eâ quâ potui industriâ redegî, ut tanti viri doctrinæ fervor aliquis accresceret. Scimus enim radiare in cœlo solem, à quo abstractus magnam sui luminis partem amitteret. Scimus sydera in firmamento micantia, quæ, si ab hoc extraherentur, fulgura desinerent; sic varia Principis nostri monita non elucerent, seu (ut veriùs dicam) incognita jacerent, nisi locum illis designassem. Habes igitur in hoc pretioso libello, non confusè, tanquam in lapidicinis, sed ordinatè, ut in annulo aureo divites gemmas coacervatas. Illum lege, illum fove,

illum ama si cupias magnus
 esse Medicus. Reclufit in ſcri-
 nio lapillis ornato *Homeri*
Poemata Alexander ; vellem
 ego ut in pectoris tui abdita,
 vel (ut rectiùs loquar) in me-
 moriæ tuæ penetralia hunc in-
 cluderet libellum. Hâc præci-
 puè de cauſâ publicum feci,
 ut fluxilem memoriam iuva-
 rem. Meum feceram, niſi,
 quibus nihil unquàm juſtè de-
 nego, ſubſtraxiſſent amici.
 Quod ſi à te mea non probe-
 tur industria, ſat erit ut cùm
 Poetâ dicam,

Hæc, ſi diſplicui, fuerint ſolatia
 nobis,

Hæc fuerint nobis præmia, ſi
 placui.

Ne prætereas moneo in ma-
 teriæ alicujus quæſitu, analo-
 gas inquirere litteras, ſeu con-
 ſimilis naturæ titulos, quales
 eſſe poſſunt *INSANIA, DELI-
 RIUM, PHRENITIS, &c.*



H. GUYOT

MEDICINÆ STUDIOSIS.

*De Libris Medicinæ eligendis,
ubi eorum utilitas aut dam-
num indicatur.*

ET si veterum Medicorum placita in lucem de novo edamus, ut diù noctûque evolvantur atque memoriæ faciliùs mandentur; attamen à novis inventis ediscendis, Medicos distrahere non contendimus, modo hæc inventa priſcis obſervationibus non refragentur nequè adverſentur, juxtà monitum Hippocratis qui aſſerit, ſemper ab inventis ad nova invenienda procedendum eſſe. Hic autor mentis acie, ubertate ingenii conſpicuus, nullâ aliâ ratione,

quàm ipsius naturæ observatione instrui atque erudiri decrevit ipse. Omnes enim ejus sententiæ, leges à naturâ sanctæ sunt. Hanc sapientissimam methodum secuti sunt *Areteus*, *Calius Aurelianus*, *Celsus* atque *Galenus* omnibus micans fulgoribus dum *Hippocratis* vestigiis inhæsit, aliique non pauci inter antiquos. Inter recentiores verò habentur *Duretus*, *Fernelius*, *Martinus*, *Hollerius*, *Ballonius* (Medici Parisienses) *Lomnius*, *Sydenhamius*, *Morthonius*, *Hoffmannus*, *Boërhaavius* aliique complures. Quî fit ut prisca Medicina observationibus suffulta, non muta tantùm, sed præstantior salubriorque sit, quam malè garrulam reddiderunt phisices plus æquò lascivientis & evagantis commenta. Ergone omnia syste-



mata ex Arte Medendi expun-
genda veniunt ? Siccinè vi-
tium vitatur in aliud opposi-
tum incurrendo ? *Celsus* nos
monet morbum , cujus naturæ
& causæ innotescunt , perfectè
curatum iri , sed verba & elo-
quentiam non inservire cura-
tioni absolvendæ. Æthiologia
tamen naturæ legibus consen-
tanea maximè proficua , imò
absolute necessaria deprehen-
ditur ; sed systemata naturæ ,
non verò natura systematibus
accomodanda : alioquin syste-
mata hæc ratione non stabili-
progressui Medicinæ obsistunt.
Hujus methodi contemptus ex
observatione crifium & con-
coctionum maximè arguitur ,
quas Antiqui serio atque atten-
to examini subiciebant , nunc
verò apud quosdam Neote-
ricos ferè exoleverunt obser-
vationes illæ. Hæc peccamina

45
evitabunt qui methodo *Hip-
pocratis* in hoc libro allatæ in-
stiterint, ita ut ad veram Me-
dicinam reduces, salubriora
atque utiliora studia amplexen-
tur. Profectò Medendi Ars lu-
dibrio & despectui non obji-
cietur, cujus honor & digni-
tas à veritate dependent, quæ
in placitis veterum græcorum
Medicorum maximè elucescit.
Horum sententiæ veluti sunt
germina atque semina, quæ
ritè examinata uberes fructus
edunt atque varias partes Me-
dicinæ illustrent. *Coacæ*, præ-
dictiones præcipuè prognosim;
Aphorismi Diagnosim curationē
que morborum confirmant.
Etenim nullum autorem repe-
rire fas est, qui causas proxi-
mas & remotas, naturam, indo-
lem, fines, curas morborum
elegantius descripserit. Ideò
nova inventa menti *Hippocratis*

congruentia jure merito asciscuntur; ad quod cognoscendum collectionibus Præclarissimi *Bicaiffii* adducimur. Nonnulli autores aliquid jucundi aut amœni offerunt, sed pleraque suspecta esse debent, nisi summam utilitatem afferant eorum opera, cui utilitati solummodò inserviebant veteres. Si nova inquirantur, hæc Medicinæ veteri explicandæ atque enucleandæ profint; hæc conditione systemata summi sunt usûs, utpotè quæ ex observationibus & experienciâ conduntur: sic Medicina minus loquax, sed veritati magis consentanea redditur. Apage illos, qui suos conceptus atque vana ratiocinia verbaque pro veris principiis fundamentalisque artis præbent; in quod vitium plurimi incurrerunt, qui cognitionem mechanismi

corporis parvi facientes, ab *Hippocrate* maximè dissident; qui hujusce mechanismi sedulus fuit atque sagax speculator, ut patet ex ejus observationibus ex naturâ ipsâ deductis. Verùm, ut fatear quod res est, *Hippocrates*, in libris qui pro certo illi ascribuntur, parùm in ratiociniis evagatur, sed sententias dissutas, Æthiologiis orbatas referre gestit, ut in *Epidemiis*, *Coacis*, *Aphorismis*, attamen hæc apophregmata à naturâ ipsâ dictata sunt, ejusque reddunt agendi modum exprimuntque. Itaque si conceptus atque ratiocinia in usum vocare opus fuerit, id sit solummodò, ut hæ observationes inter se vinciantur, uniantur, atque exponantur clarius, cum hâc cautione, ut propria verba *Hippocratis* non immutentur ne-

que adulterentur. Hâc ratione textus *Hippocratis* sartus & integer conservatur quem præstò habebimus, ut *Praxis & Therapeia* vera argumenta atque exemplaria non desint. Nam omnes labores, studia, vigiliæ Medici eò collimare debent, ut sanitas præsens conservetur, amissa verò recuperetur, ut patet ex divini senis observationibus, quæ passim in ejus scriptis disseminantur. Eandem ob causam selectiores sententias ex *Celso* exceptas in suo ordine adjecimus, quando quidem autor ille mentem *Hippocratis* secutus, *Hippocrates latinus* audit.

N. B. In referendo textu *Hippocratis*, Editionem hujusce auctoris (ex *Anutio Foesio D. M. Mediom.*) *Frankofurti an. 1624.* adhiberi, Lectorem esse monitum, oportet.

MANUALE



MANUALE

MEDICORUM.



A

ABORTUS.



MULIERI utero ge- Aph.34.
renti, si alvus multum Sect. 5.
profluat, abortionis
periculum est.

MULIERI utero gerenti, si Aph.37.
mammæ derepentè gracilescant, Sect 5.
abortionis periculum est.

QUÆ præter naturam tenues Aph 44.
utero gerunt, abortiunt, donèc Sect. 5.
pleniores evadant.

QUÆ foetus corrupturæ sunt, Aph.53.
iis mammæ extenuantur. Quod Sect. 5.
si contrà duræ evadant, dolor
erit vel in mammis, vel in co-
xis, vel in oculis, vel in geni-

B.

bus, nequè foetum corrumpunt.

Sent. *Quæ* ex partu & abortu co-
516. pioſa celeritè cum impetu fe-
Coac. runtur, ſi ſubſiſtant moleſtiam
exhibent. Hujusmodi mulieribus
rigor inimicus eſt & alvi per-
turbatio, præcipuè verò ſi præ-
cordiorum dolore vexentur.

Sent. Ex abortione ubi alba dere-
543. pentè percurrunt, ſi rigor ali-
Coac. quis corripit, & ad femur im-
petus fiat, tremor moleſtus ſu-
bit.

Vide PARTUM. GRAVI-
DAM. CONCIPERE. PRÆ-
GNANTEM.

ABSCESSUS.

Aph. 51. IN febris quæ abſcedunt,
Sect. 4. ſi primis judicationibus non ſol-
vantur, morbi longitudinem ſi-
gnificant.

Sent. MODERATUS capitis do-
173. lor cum inexhauſtâ ſiti, aut
Coac. ſudore febrem non ſolvente,
gingivarum abſceſſus, aut circà
aures tubercula denunciat, niſi
Sent. a livus erumpat.

203. CONSIDERANDUM in
Coac.

A

3

quibus speramus abscessus circa aures futuros, nùm superiorum partium tenuibus sudoribus diffluant, nùm quid etiã subindè novum rigorem sentiant, an fortè etiã alvi affatim perumpant, aut aliquo sopore detineantur? Videndum quoquè num & in his urina diluta cum sublimibus quibusdam in medio suspensis, albidis, & aliquantùm variantia, exalbicantia, aut graveolentia appareant?

Vide ANGINAM. DOLOREM RENUM. SOPOREM. FEBREM.

ACUTI MORBI.

MORBORUM acutorum non Aph. 19. in totum certæ sunt prænuntiationes, nequè salutis, nequè mortis. Sect. 2.

MORBI acuti intrà dies quatuordecim judicatione terminantur. Aph. 23. Sect. 2.

IN præcipiti morbo, si partes externæ perfrigerentur, internæ verò urantur, ac sitis urgeat, malum denunciatur. Sent. 115. Coac.

IN præcipiti morbo, capitis B ij Sent. 119. Coac.

A

4
dolor, & præcordia revulsa, nisi sanguis ex naribus profluat, ad phrenitidem deveniunt.

Celf. **MULTA** in præcipiti periculo rectè fiunt, aliàs omittenda.

Vide BILEM ATRAM. CRISIM. FACIEM. FEBRES. PHRENITIDEM.

ÆGROTARE.

Aph. 34. **PER** morbos minore sunt periculo, quorum naturæ, & ætati, & habitui, & anni tempestatibus, morbus magis cognatus fuerit, quàm quibus in horum aliquo minimè cognatus fuerit.

Celf. **INTER** initia non difficillima curatio est, si imperata sunt quies, sitis, inedia; at si malum inveteraverit, non sinè magnâ molestiâ discutitur.

Vide MORBUM. ÆTATEM.

ÆRUGINOSI.

Vide MORBUM REGIUM. ICTERUM.

ÆSTAS. ÆSTUS.
ÆSTUATIO.

Vide TEMPUS. CALOREM.

ÆTAS.

QUOD autem ad anni tem- Aph. 18.
pora attinet, vere quidē & Sect. 3.
primā æstate, pueri, & his æta-
te proximi, optimē degunt &
maximē valent; æstate verò &
quadantenus autumno, senes;
reliquā autumnī & hiemis par-
te, qui inter has ætates sunt
medii.

PER ætates hæc eveniunt, Aph. 24.
parvis & recēns natis pueris, ser- Sect. 3.
pentia oris ulcera (*aphthæ* dicta)
vomitiones, tussēs, vigiliæ, pa-
vores, circā umbilicum inflam-
mationes, aurium humiditates.

Ad dentitionem verò progres- Aph. 25.
sis gingivarum stimulantē pru- Sect. 3.
rigines, febres, convulsiones,
alvi profluvia, idquē præcipuē
cū caninos dentes emittere cœ-
perint, & iis qui maximē cras-
si sunt, & alvos duras habent.

Aph.26. AT iis paulùm ætate progres-
 Sect. 3. sis, tonsillarum inflammatio-
 nes, vertebræ quæ ad occipitium
 est interiorem in partem impul-
 siones, crebræ anhelationes, cal-
 culi, lumbrici rotundi, alii te-
 nues & minuti, in recto intes-
 tino orti, *ascarides* dicti, verru-
 cæ (Græcis *acrochordones* dictæ)
 satyriasis, strumæ, & alia tu-
 bercula, præcipuè verò prædi-
 cta.

Aph.27. ADHUC autem ætate prove-
 Sect. 3. ctioribus & ad pubertatem pro-
 gressis, ex iis multa, & febres
 diuturnæ magis, & sanguinis ex
 naribus profluvia.

Præd. QUO AD ætates autem atti-
 lib.2. p. net: tubercula quidèm suppu-
 95. rantur, atquè eadem strumosa
 magnâ ex parte pueros exercent,
 facilèque ex his levantur. At iis-
 dem ubi paulùm ætate processe-
 rint atquè adoleverint, nascuntur
 quidèm minùs, ac difficiliùs tol-
 luntur. Viris autèm id genus tu-
 bercula non admodùm fiunt, ve-
 rùm favi formidabiles & cancri
 abditi, demersi & ex pustulis
 noctu inquietantibus, ulcera ser-

pentia quæ *herpetes* nominant, donèc annos sexaginta longè superârint. Senibus verò ex hujusce-modi tuberculis nullum accidit, at cancri latentes quiquè summa corporis infestant, sunt & ad mortem comitantur. Ex Locis difficilior sanantur alæ, ac laterum cavitates & femora; in his namquè humores subsident & recidivæ fiunt.

ÆTAS media tutissima est, Cels. quia nequè juventæ calore, ne- l. 2. c. 1. què senectutis frigore infestatur.

LONGIS morbis senectus, Cels. acutis adolescentia, magis patet. l. 2. c. 1.

OMNIS pueritia primùm circa quadragesimum diem, dein- l. 2. c. 1. dè septimo mense, tum septimo anno, postea circa pubertatem periclitatur.

ADOLESCENTIA morbis acutis, itèmq; comitialibus, tabique maximè objecta est. Cels. l. 2. c. 1.

Ex toto, non sic pueri, ut Cels. viri, curari debent. l. 3. c. 7.

APHTHÆ longè periculosissima sunt ulcera; sed in pueris, quos sæpè consumunt. Cels. l. 6. c. 11.

Vide MORBUM.

A L V U S.

Aph 20. QUIBUS per juventutem alvi
Sect. 2. sunt humidæ, iis senescentibus
exsiccantur; quibus verò in ju-
ventute alvi siccæ sunt, iis cum
senes evadunt, humectantur.

Aph. 15. LONGO alvi profluvio deten-
Sect. 6. to, spontanea accedens vomiti-
tio, alvi profluvium solvit.

Sent. ALVI solutio quæ præter ra-
258. tionem accidit, cum voce tre-
Coac. mulâ, in his diutius perseverante
perturbatione, pernicies intenta-
tur.

Sent. ALVI durities cum dolore;
303. in febribus horroris sensu infi-
Coac. gnibus, ac cibi fastidio laboran-
tibus, nisi paulum humectatâ al-
vo purgationem faciat, ad suppu-
rationem tendet.

Sent. BILIOSIS alvus perturbata,
455. exigua reddens genituræ similia
Coac. & mucosa, doloremque ad imum
ventrem inferentia, urinæ quò-
que non facile prodeuntes, ad
hydropem tendunt ex hujusmo-
di casibus.

A L V U S.

A

ALVUS perturbata, falsuginosa demittens, unà cum febre, non admodum sopore aut torpore oppressos consequitur.

Sent.
641.
Coac.

UBI alvus intercepta est & arctè conclusa, parvaque & nigra caprarum stercoreibus similia, nec nisi coacta emittit; hoc casu sanguis è naribus erumpens, periculo est.

Sent.
41.
Præd.
lib. I.

ALVUS circumtensa, ex Medici industriâ liquida demittens, celeritè intumescens, convulsionis significationem quamdam præ se fert, (quod *Aspasi* filio contigit.) In his novus subortus rigor perniciem facit. Ex his casibus convulsione tentato ac inflato, ubi diutiùs morbum traxerit, ex ore putrida & virulenta prodeunt.

Sent.
99.
Præd.
lib. I.

ALVUS si vehementiùs fluit, aut sæpiùs ducitur, hominem infirmat.

Cels.
l. 2. c. 12.

ALVUS ducta sæpè superiores partes resolvit.

Cels.
l. 4. c. 3.

UNO die fluere alvum, sæpè pro valetudine est, atque etià pluribus, dùm febris absit, & intrà septimum diem con-

Cels.
l. 4. c. 19.

C

quiescat: purgatur enim corpus, & , quod intus læsurum erat, utiliter effunditur. Verum spatium periculosum est: interdum enim tormina & febriculas excitat, viresque consumit: interdum autem evenit ut id neglectum pluribus diebus curari difficillimum sit.

Vide EXCREMENTA. HYDROPEM. CRISIM. DOLOREM PRÆCORDIORUM. JUVENTUTEM.

ANGINA.

Aph. 10. QUI anginam effugiunt, iis
Sect. 5. in pulmonem vertitur, & intra dies septem intereunt, quos si evaserint, suppurati fiunt.

Aph. 37. IN anginâ detento, si tumor in
Sect. 6. cervice oriatur, bonum, foras enim morbus vertitur.

Aph. 49. IN anginâ detento, si tumor &
Sect. 7. rubor in pectore contingat, bonum, foras siquidem morbus vertitur.

Sent. 363. ANGINÆ in quibus nequē
Coac. in collo, nequē in faucibus quicquam apparet, sed quæ vehementem suffocationem ac spi-

randi difficultatem adferunt, eodem aut tertio die necant.

QUÆ verò tumorem ac ruborem in collo capiunt, in reliquis quidè̃m eodem modo se habent, verùm diuturniores sunt. Sent. 364. Coac.

PRÆCIPUE' autèm malum prorogatur, quibus non solùm fauces, sed cervicem quòque & pectus unà rubor occupat. Maximè verò potest indè̃ secunda valetudo contingere, si rubores ad interna maximè̃ revertantur. Quod si evanescant, nequè in exteriores partes conversum sit tuberculum, nequè pus facilè̃ & sinè dolore excreetur, aut nequè ista diebus judicatoriis contingant, perniciem denunciant. Ac fortassè̃ etiàm suppurati fiunt. Securitatis autèm indicium est ruborem & abscessus ad externas quàm maximè̃ partes vergere. Sent. 365. Coac.

QUIBUS angina ad pulmonem divertit, partim quidè̃m intrà septem dies pereunt, partim verò liberati, pus intrò colligunt, nisi pituitosa fursùm educantur. Sent. 367. Coac.

IN anginâ laborantibus subarida sputa, gracilescentibus fau- Sent. 369. Coac.

cibus, malum prænuntiant.

Sent. IN anginis linguæ tumores
370. absque ullâ significatione eva-
Coac. nescentes, periculum denun-
ciant. Quin etiam dolores citrà
evidentem causam disparentes,
perniciem ostentant.

Sent. ANGINA laborantes nisi ce-
371. leritèr cocta expuant, pernicio-
Coac. sè habent.

Sent. IN anginâ absquè ullâ signi-
372. ficatione redundantes in caput
Coac. dolores cum febre, periculum
indicant.

Sent. IN anginâ absquè ullâ signi-
373. ficatione delati ad crura dolores
Coac. cum febre, perniciosi.

Sent. IN anginâ laborantibus citrà
374. judicationem præcordii dolor,
Coac. cum impotentiâ & torpore ad-
veniens, latentèr necat, etsi mo-
deratè admodùm habere videan-
tur.

Sent. IN anginâ laborantibus, abs-
375. què ullâ significatione graciles-
Coac. centibus faucibus, dolor inten-
sus ad pectus aut ad alvum pro-
gressus, purulentas dejectiones
facit. Alioquì autèm tale quid
solutionem præ se fert.

IN anginâ quæcumque conspi- Sent.
cum dolorem non produnt, 376.
periculi plena sunt. Quin etiâ Coac.
diuturni sunt qui ad crura pro-
grediuntur dolores, ægrèque ad
pus deducuntur.

S P U T A ex anginâ viscida, Sent.
crassa, exalbida, vi educta, 377.
malum denunciant, omnisque Coac.
ejusmodi maturatio mala est. In
his multa deorsum purgatio le-
vis syderationis modo mortem
adfert.

S P U T A ex anginâ subarida, Sent.
crebra, per tussim & cum lateris 378.
dolore educta, perniciem mi- Coac.
nantur. Atque ea quæ inter po-
randum per tussim rejiciuntur,
quæque difficultè deglutiuntur
malum portendunt.

A N X I E T A S.

IN angore & pervigilio ve- Sent.
xatis, ad aures abscessus maxi- 563.
mè obveniunt. Coac,

IN anxietate laborantibus cum Sent.
alvi turbulentâ suppressione, ce- 564.
leritèr velut culicum puncturæ Coac.

in cutem erumpunt, & ad oculos
lacrimosus abscessus procedit.

A P O P L E X I A.

Aph. 42. V A L I D A quidè apoplexia
Sect. 2. nullo modo sanatur, levis verò
non facilè..

Aph. 43. E x strangulatis & dissolutis,
Sect. 2. necdum mortuis, ii minimè ad
vitam redeunt, quibus spuma
circà os collecta fuerit.

Aph. 57. A t corporis syderationes con-
Sect. 6. tingunt eà ætate maximè, quæ
est à quadagesimo ad sexagesi-
mum.

A Q U A.

Aph. 26. A Q U A quæ citò calefcit &
Sect. 5. citò refrigeratur, levissima.

Celf. UBI expletus est aliquis, fa-
l. 1. c. 2. ciliùs concoquit; si quicquid
assumpsit, potionè aquæ frigidæ
includit, tùm paulispèr invigi-
lat, deindè benè dormit.

Celf. ILLUD nosse oportet quod ex
l. 1. c. 3. labore sudanti frigidæ potio per-
niciosissima est, atquè etiàm
cùm sudor se remisit, itinere fa-
tigatis inutilis.

Vide HYGIEINEM.

A T R A B I L I S.

FEBRIUM initio si atra bilis Sent.
 sursum aut deorsum prodeat, 68.
 lethale est. Coac.

Vide BILEM ATRAM. DYSEN-
 TERIAM.

A Q U I L O.

Vide TEMPUS.

A U S T E R.

Vide TEMPUS.

A U T U M N U S.

Vide TEMPUS.

A U R I S.

Vide TINNITUM. SURDITA-
 TEM. TUBERCULUM.



B A L B I.

Aph.32. **B** A L B I longo alvi profluvio
Sect. 6. maximè corripuntur.

B I L I S A T R A.

Aph.22. **P E R** quorumvis morborum
Sect. 4. initia, bilem atram suprà vel
infra prodire, lethale.

Aph.23. **Q U I B U S** per morbos acutos,
Sect. 4. aut diuturnos, aut vulnera, aut
alium quemvis modum exte-
nuatis, bilis atra, aut veluti san-
guis niger subierit, ii postri-
diè moriuntur.

Aph.24. **I N T E S T I N O R U M** difficultas si
Sect. 4. ab atrâ bile ortum duxerit, le-
thalis.

Vide ATRAM BILEM.

B I L I O S U S.

Vide A L V U M.

B I B E R E.

Aph.27. **Q U I B U S** bibendi de nocte ap-
Sect. 5. petentia est, iis admodum si-
tientibus si obdormierint, bo-
no est.

Vide HYGIEINEM.

B U B O

Ex glandularum inflamma- Aph. 55.
tionibus febres omnes malæ, Sect. 4.
præter diarias.



CAPUT ET CEREBRUM.

Aph. 50. **Q**UIBUS perfectum fuerit
Sect. 6. cerebrum, iis febrem &
bilis vomitionem succedere ne-
cesse est.

Aph. 58. **Q**UIBUS ex occasione aliquâ
Sect. 7. cerebrum concussum fuerit, eos
protinùs voce deficere necesse
est.

Sent.
163. **Q**UÆ caput quodam modo
Coac. concutiunt, cum intensâ oculo-
rum rubedine, ac manifesto de-
lirio, perniciem denuntiant. Ne-
què tamèn hoc ad mortem co-
mitatur, verùm circà aurem tu-
morem excitat.

Sent.
167. **Q**UÆ caput concutiunt, & au-
Coac. rium sonitus excitant, sanguinem
è naribus profundunt aut mu-
lieri menstrua deturbant, idquè
præsertim si ad spinam ardor
consequatur. Fortassè etiàm dif-
ficultas intestinorum expectanda
est.

Sent.
168. **Q**UI capite gravati ad synci-
Coac. put dolorem sentiunt, pervigi-
lio torquentur, iis sanguinis
eruptionem fore spes est, tum

verò præcipuè si aliquis contentionis sensus ad cervicem pertingat.

VOMITUS virulenti & æruginosi in capitis doloribus cum surditate & insomniâ, promptam insaniam significant. Sent. 169. Coac.

QUI capitis dolore, siti, levi pervigilio detinentur, obscure loquuntur, ad motum impotentes, humescente alvo, lassitudine vexantur, in iis fortassè infania metuenda est. Sent. 175. Coac.

CAPITI nihil æquè prodest, atque aqua frigida. Cels. l. I. c. 4.

Wide DOLORES CAPITIS.

C A L V I.

QUI calvi sunt, iis varices magni non fiunt. At quibus calvis existentibus, varices succedunt, iis rursus capillitium gignitur. Aph 34. Sect. 6.

C A L C U L U M.

CALCULO laborantes eo habitu constituti, ut ne in urinariam fistulam calculus illabatur, promptè urinam reddunt. Sent. 472. Coac.

CALIDUM ET FRIGIDUM

Aph. 16. CALIDUM, eo frequentius
Sect. 5. utentibus has affert noxias, car-
nium effœminationem, nervo-
rum impotentiam, mentis stu-
porem, sanguinis profluvia, ani-
mi defectiones, ad quæ mors se-
quitur.

Aph. 22. CALIDUM suppurationem
Sect. 5. movens, non in omni ulcere,
maximum securitatis iudicium
exhibet, cutem emollit, exte-
nuat, dolorem tollit, rigores,
convulsiones, nervorum disten-
siones mitigat, capitis gravita-
tem solvit, ossium verò fractu-
ris plurimum confert, sed præ-
cipuè his quæ carne nudata sunt,
iisque maximè qui in capite ul-
cera habent. His etiàm quæ à
frigore emoriuntur, aut exulce-
rantur, & *herpetibus* exedentibus,
fedi, pudendo, utero, vesicæ,
iis omnibus calidum gratum &
judicationem faciens, frigidum
verò inimicum & interimens.

Aph. 23. A T frigido in his utendum
Sect. 5. undè sanguis profluit, aut pau-

Non post fluxurus est, non suprà ipsas partes, sed circà eas undè profluit, adhibito. Et si quæ inflammationes, aut incendiosa quædam ad rubrum & subcruentum ex recenti sanguine vergunt, ad ea admoto. Inveterata namquè denigrat. Erysipelas etiàm non ulceratum juvat, si quidè exulceratum lædit.

Vide FRIGIDUM.

CALOR ET FRIGUS.

ET quâ corporis parte calor Aph. 39.
inest, aut frigus, ibi morbus Sect. 4.
est.

ET ubi toto corpore mutationes Aph. 40.
contingunt, ut si corpus re- Sect. 4.
frigeretur, rursùmque calefiat,
vel color alius ex alio oriatur,
morbi longitudinem significat.

RELICTI in præcordiis æstus, Sent. 7.
cum febre in quâ totius corpo- Præd. 1.
ris habitus perfrigeratur, malo I.
sunt, idquè præsertim si cum sudoribus contingat.

CALOR adjuvat omnia, quæ Cels.
frigus infestat. l. 1. c. 9.

INIMICIOR senibus hiems, Cels.
æstas adolescentibus est. l. 2. c. 1.

C A N C E R.

Aph. 38. QUIBUS cancri occulti oriun-
Sect. 6. tur, eos non curare præstat. Cu-
rati naniquè citò pereunt, non
curati verò diutiùs perdurant.

Cels.
1.5.c.26. OMNIS cancer non solum cor-
rumpit quod occupavit, sed
etiàm serpit.

Cels.
1.5.c.26. CANCRI initium quidè m re-
cipit curationem: ubi verò pe-
nitùs insedit insanabile est. Plu-
rimique sub frigido sudore mo-
riuntur.

C A R U N C U L A.

Vide URINAM. DYSENTE-
RIAM. EXCREMENTA.

C E R V I X.

Sent.
261. CERVIX dura cum dolore,
Coac. & maxillarum connexio, ac ju-
gularium venarum palpitatio ve-
hemens, cum tendinum disten-
sione, perniciem minantur.

Sent.
270. CERVICIS cubitorumque do-
lores convulsiones minantur, ex
Coac.

facie autem ad fauces ista procedunt.

CERVICIS dolor in omni quidem febre malum. In his verò ^{Sent.} 273. ^{Coac.} pessimum, in quibus etiã vehementis insanix metus est.

Vide DOLOREM JUGULI ET CERVICIS.

CHIRURGUS.

Esse Chirurgus debet adolescens, aut certè adolescentiã propior, manu strenuã, stabili, nec unquã tremiscente, eãque non minus sinistrã quã dextrã promptus, acie oculorum acri, clarãque; animo intrepidus, immisericors, sic, ut sanari velit eum, quem accepit, non ut clamore ejus motus, vel magis, quã res desiderat, properet, vel minùs quã necesse est, faciat; sed perindè faciet omnia, ac si nullus ex vagitibus alterius affectus oriatur. ^{Cels.} 1.7. Præ.

MITTERE autem sanguinem cùm sit expeditissimum usum ^{Cels.} 1.2.c.10. habenti, tamen ignaro difficilimum est, juncta est enim ve-

na arteriis, his nervi, ita si nervum scalpellus attigit, sequitur nervorum distensio ea quæ crudeliter hominem consumit. At arteria incisa nequæ coit nequæ fanescit, interdum etiam ut sanguis vehementer erumpat efficit.

Cels. SEMPER ubi scalpellus ad-
17. c. 2. movetur, id agendum est, ut
& quàm minimæ & quàm paucissimæ plagæ sint: cum eo tamen, ut necessitati succurramus; & in modo & in numero.

Vide PHLEBOTOMIAM. VULNUS. SANGUINEM. SECTIONEM.

CIBUS.

Aph. 17. UBI copiosior præter natu-
Sect. 2. ram cibus ingestus fuerit, id morbum creat, quod etiam curatio indicat.

Aph. 31. SI cui ex morbo cibum probè
Sect. 2. sumenti corpus nihil proficit, malum.

Aph. 32. UT plurimum omnes malè
Sect. 2. habentes, circa initia quidè cibus benè sumentes, nequæ quicquam proficientes, ii tandem rursus cibum averfantur.

At

At qui circa initia quidè m vehe-
mentèr cibos fastidiunt , postea
verò eos probè assumunt , ii
meliùs degunt.

CIBUS & potus paulò pejor , Aph. 38.
suavior tamèn , melioribus qui- Sect. 2.
dèm , sed minùs gratis , ante-
ponendus.

QUIBUS tubercula, aut ad arti- Aph. 45.
culos dolores, post febres longas, Sect. 4.
oriuntur , ii copiosioribus cibis
utuntur.

Si febricitanti quis cibum ex- Aph. 67.
hibuerit , sano quidè m robur , Sect. 7.
& ægrotanti morbus.

NUNQUAM utilis est nimia Cels.
farietas. Sæpè inutilis est nimia l. 1. c. 2.
abstinentia. Sæpè si qua intem-
perantia subest , tutior est in po-
tione quàm in escâ.

SECUNDA mensa bono stoma- Cels.
cho nihil nocet , in imbecillo l. 1. c. 2.
coalescit.

SEMPER post cibum conquies- Cels.
cere (oportet) neque intendere l. 1. c. 6.
animum , neque ambulatione
quamvis leni dimoveri.

PLUS alimenti est in pane , Cels.
quàm in ullo alio cibo. l. 2. c. 18.

OMNE animal si lactens est , Cels.
minùs alimenti præstat. D l. 2. c. 18.

Celf. OMNE ferum animal domesti-
1.2.c.18. colevius est.

Celf. OVUM durum valentissimæ
1.2.c.18. materiæ est; molle, vel forbi-
le, imbecillissimæ.

Celf. IN acutis morbis seriùs æger
1.3.c.2. alendus est, ut primò dempta
materia impetum frangat: in
longis maturiùs, ut sustinere
spatium affecturi mali possit.

Celf. OPTIMUM medicamentum est:
1.3.c.4. oportunè cibus datus, qui quan-
dò primùm dari debeat quæritur,
aliis quintum diem, aliis sextum
expectantibus. *Asclepiades* ubi
ægrum triduò per omnia fatiga-
verat, quarto die cibum indul-
gebat. At *Themison* non quandò
cœpisset febris, sed quandò de-
fuiisset aut certè levata esset, &
ab illo tempore expectato die
tertio, cibum dabat. Nihil autem
horum utiquè perpetuum est
nam potest primo die dari, potest
secundo, potest tertio, potest
non nisi quarto aut quinto. Potest
post unam accessionem, potest
post duas, potest post plures,
refert enim qualis morbus sit:
quale corpus, quale cœlum.

quæ ætas , quod tempus anni ;
minimèque in rebus multùm in-
ter se differentibus perpetuum
esse præceptum temporis potest.

APPONENDI sunt ægro varii Cels.
cibi , sicut *Asclepiades* præcepit , l. 3. c. 6.
tùm demùm sunt , ubi fastidio
urgetur , nequè satis vires suffi-
ciunt , ut paulùm ex singulis de-
gustando , famem vitet. At si ne-
què vis nequè cupiditas deest ,
nullâ varietate sollicitandus æger
est , ne plùs assumat quàm con-
coquat ; nequè verum est quod
ab eo dicitur , faciliùs conco-
qui varios cibos : eduntur etiam
faciliùs , ad concoctionem au-
tem , materiæ genus & modus
pertinent.

Vide D Y S E N T E R I A M .
D O L O R E S L U M B O R U M .
H Y G I E I N E M .

C I R C U I T U S .

Vide C R I S I M . S A T I E T A T E M .

C O L L I Q U A T I O .

HEPATICO colliquatio cum Sent.
raucedine malum portendit , id- 447.

D ij Coac.

que præcipuè si cum quâdam
tussi contingat.

Vide RESPIRATIONEM.

COLLUM.

Aph. 35. IN febre vexato, collum re-
Sect. 4. pentè perversum, ac vix deglu-
tire posse, nullo existente tumo-
re, lethale.

Sent. COLLUM neque converti, ne-
278. que devorare posse, plerumque
Coac. lethale.

COLOR FACIEI.

Sent. FREQUENS coloris cum calore
125. mutatio, bono est.

Coac. QUIBUS juvenibus diù coloris
Præd. 1. fœdatio inest, non tamèn conti-
2. pag. nentèr ad instar Regii morbi, ii
110. & viri & fœminæ capitis dolore
conflictantur, & lapides ac ter-
ram edunt, aut profluvium per
ora venarum sanguinem fundere
solita patiuntur, *hemorrhoidas*
græci dicunt. At colores cum
virore pallidi diuturni, absque
vehementi Regio morbo, cætera
quidèm eadem facere solent:

verum præcordium dolores eos magis vexant quam cæteros, neque tamen lapides aut terram edunt. Qui verò diù pallidi faciem habent tumidam, eos certum est, aut capitis, aut viscerum dolore laborare, aut sedem internam quodam modo malè affectam esse. Magnâ autem ex parte ubi hæc adfuerint, non unum aliquod malum inesse videtur, sed interdum multa, aut etiâ omnia.

CONCUSSIO.

Vide CEREBRUM.

CONSUETUDO.

Qui solitos labores ferre assueverunt, etiam si invalidi sint Aph. 49. Sect. 2. aut senes, eos faciliùs ferunt, quàm qui non assueti, quamvis robusti & juvenes.

Quæ ex longo temporis intervallo assueta sunt, quamvis Aph. 50. Sect. 2. deteriora, insuetis minùs molesta esse solent. Quare ad insolita etiam facienda mutatio.

Sent. 47. Coac. PRÆTER consuetudinem aliquid facere, ut, verbi gratiâ, aliquid propensius curare & magno studio eniti, prius non consuetum, aut contrà, pravum & delirio proximum.

Celf. PERICLITATUR & qui semel 1. I. c. 3. & qui bis die cibum incontenter contrà consuetudinem assumit.

Celf. CUM quis mutare aliquid velit, paulatim debet assuescere. 1. I. c. 3.

Celf. LEVAT lassitudinem etiam laboris mutatio: eumque, quem novum genus cujusdam laboris preffit, id quod in consuetudine est reficit. 1. I. c. 3.

Celf. QUOD contrà consuetudinem 1. I. c. 3. est, nocet, seu molle, seu durum est.

Celf. FACILE securus est aliquis in 1. 2. c. 2. his quæ sæpè sine periculo evasit.

CONVALESCENTES.

Aph. 32. IIS verò qui ex morbis con-
Sect. 4. valescunt, si pars aliqua laboraverit, illic abscessus fiunt.

Vade CIBUM.

CONVULSIO.

CONVULSIO ex veratro, lethalis. Aph. 1. Sect. 5.

Ex copioso sanguinis fluxu convulsio aut singultus continuus, malum denunciat. Aph. 3. Sect. 5.

Ex profusâ purgatione convulsio aut singultus succedens, malum. Aph. 4. Sect. 5.

Qui nervorum distensione corripuntur, intra quatuor dies pereunt, quos si effugerint, sanescunt. Aph. 6. Sect. 5.

CONVULSIO ex repletionem aut vacuatione oritur, ita verò etiâ singultus. Aph. 35. Sect. 6.

Ex vigiliâ convulsio, vel delirium, malum. Aph. 18. Sect. 7.

Ex vehementibus ardoribus convulsio, aut nervorum distensio, malo est. Aph. 13. Sect. 7.

CONVULSIO in febre suborta, eâdemque die desinens, bono est. Sent. 156.

CONVULSIO in febre suborta, febrem primo die, aut postero, aut tertio finit. Quod si horam quâprehendit superet, nec desinat, malo est. Coac. Sent. 157. Coac.

- Sent. 531. **CONVULSIONEM**, muliebriam si circa initia appareant, neque febris accesserit, solvunt.
Coac.
- Sent. 349. **IN** uteri strangulatu non antea expertæ convulsiones, faciles sunt.
Coac.
- Sent. 350. **CUM** convulsionibus & sudore febrienti defluentia sputa minimè mala sunt. His præterea alvi aliquantulum madescunt, ac fortassis aliquid ad articulos abscessurum sperandum est.
Coac.
- Sent. 351. **QU** L B U S in convulsionibus oculi intentè splendent, iis mens non constat, & diutiùs morbum trahunt.
Coac.
- Sent. 352. **QU** Æ convulsionis in morem affligunt, cum alto stupore, quem *Cathocum* vocant, tubercula ad aures attollunt.
Coac.
- Sent. 354. **CONVULSIONES** & nervorum distensiones, succedens febris, tollit.
Coac.
- Sent. 355. **Ex** vulnere convulsio lethalis.
Coac.
- Sent. 356. **CONVULSIO** febri succedens, periculum denuntiat, minimum verò pueris.
Coac.
- Sent. 357. **ADULTIORES** & qui septimum annum excefferunt, convulsione in febre nonprehenduntur.
Coac.

tur; alioqui periculum denun-
tiatur.

CONVULSIONEM solvit febris
sucedens acuta, quæ prius non
aderat, aut si prius adfuit, ingra-
vescens. Confert autem & urinæ
vitreæ copiosus pertransitus &
alvi fluxio, & somnus. Convul-
siones autem derepentè ortas fe-
bris solvit ac alvi fluxus.

Sent.
358.
Coac.

LOQUENDI impotentia in con-
vulsionibus multum perseverans,
malo est, quæ verò parum durat,
aut Linguae syderationem, aut
brachii, aut eorum quæ in dex-
trâ parte sunt, denuntiat. Solvi-
tur autem magnâ urinarum
confertim & derepentè prodeun-
tium abundantia.

Sent.
359.
Coac.

IN nervorum distensionibus &
iis quæ in posteriorem partem
fiunt, dissolutæ maxillæ mortem
afferunt. Quin etiam lethale est,
in posteriorum partium disten-
sione, sudare & corpus dissolvi,
ac in eodem malo, per nares re-
move, aut ubi per initia vox
defecta fuit, clamare aut nuga-
ri; postridiè enim affuturam mor-
tem significat.

Sent.
361.
Coac.

Sent. FEBRES cum posteriorum par-
362. tium distensione, urinæ genitale
Coac. semen referentes, solvunt.

Sent. QUIBUS tempora secantur, iis
498. ex adversâ sectionis parte, con-
Coac. vulsio contingit.

Sent. TURBULENTÆ & valdè confi-
112. l. i. dentes è somno exurrectiones,
Præd. convulsiones minantur, præser-
tim verò si cum sudore contin-
gant.

Sent. CONVULSIO cum tremore,
162. l. i. corporis jactatione, & implaci-
Præd. ditate, ac alto stupore, quem
Catochum vocant, parvulorum
circâ aures obortorum absces-
sum spem facit.

Vide COLICUM DOLO-
REM. DOLOREM LUMBORUM,
FEBRES. PHRENITIDEM.

CONTRARIA CONTRARIIS CURARI.

Aph. 22. MORBOS ex repletionem, ut cu-
Sect. 2. rat evacuatio, sic eos, qui ex eva-
cuatione fiunt, repletio, & in
cæteris contrarietas remedio est.

Aph. 48. Quovis in corporis motu, si-
Sect. 2. mul ac laborare cœperit, quies

confestim lassitudinis est remedium.

PERFRIGERATA excalefacere Aph. 19.
oportet, præter ea, quæ sangui- Sect. 5.
nem effundunt, aut brevi effun-
dent.

QUANDOQUE tamen in nervo- Aph. 21.
rum distensione absque ulcere, Sect. 5.
in juvene quadrati corporis, æta-
te mediâ, frigidæ copiosa perfu-
sio caloris revocationem efficit,
calor autem hæc sanat.

QUI secundis aliquandò fru- Cels.
strâ curatus est, contrariis sæpe Præf. 1.
restituatur. I.

CONCIPERE.

SI nosse velis nùm mulier con- Aph. 41.
ceperit, ei dormituræ aquam Sect. 5.
mulsam propinato, & si ventris
tormina eam corripuerint, con-
cepit, sin minùs, non concepit.

MULIER prægnans, si marem Aph. 42.
gestat, corolator est, si fœmi- Sect. 5.
nam, minùs corolata.

MULIERI prægnanti erysipelas Aph. 43.
in utero, lethale. Sect. 5.

QUÆ præter naturam crassæ, Aph. 46.
non concipiunt, iis omentum Sect. 5.

os uteri comprimit, neque priùs quam extenuentur, prægnantes efficiuntur.

Aph. 48.

Sect. 5.

Præd.

lib. 2. p.

106. ad

108.

M A R E S uteri dextrâ parte, foeminâ sinistrâ, magis gestantur.

A T mulieres quænam magis aut minùs uterum gestare sint idoneæ, hunc in modum æstimare licet. Imprimis quidem in formam intuendo, parvæ namque grandioribus ad conceptum præstant, tenues crassis, candidæ rubris, nigræ viventibus. Præstant item quibus venæ extant, iis, quibus minimè apparent. Quin etiam grandiori natu exuberans carnis moles, malo est: mammæ autem turgidæ & magnæ probantur. Atque ista quidem visui sunt expolita. At sciscitari oportet num menstrua singulis mensibus appareant? Et num satis idoneâ copiâ? Et an boni sint coloris? Æquali copiâ in singulis temporibus, & ratis mensium diebus effluant? quod quidem optimum est. Locus verò conceptui idoneus, quem sanè *uterum* nominamus, sanus esse, & siccus, &

mollis debet, ac nequè contractus, nequè proclivis, nequè ore distorto aut compresso, aut diducto. Etenim quidquid horum contingerit, conceptum fieri impendit. Mulieres igitur quæ concipere nequeunt, & pallidæ videntur, absque febre, nequè aliquâ causâ in visceribus existente, iis caput dolet, & menses malè ac incertè prodeunt, aut certè pauci, nequè ex longo intervallo sic affectis apparent, & uteri purgatione indigent. At quæ, tum benè coloratæ sunt, tum benè carnosæ & pingues, & venas latentes habent, & doloris expertes sunt, hisque menstrua aut nullomodo prodeunt, aut pauca & sincera fluunt: in hujusmodi naturis difficillimè conceptus procuratur. Quod si, liberè apparentibus menstruis, inculpato sit corpore mulier, nequè concipiat, locus in quo uterus continetur in causâ existimandus est, quominus foetus tollatur. Aut enim contractus est, aut diductus. Reliqua enim quæ huc contingere

solent, cum dolore, & decoloratione, ac colliquatione fiunt. Quibus verò ulcus in utero ortum est, five ex partu, five ex tuberculo, aut aliâ quâpiam causâ, iis febres & inguinum tumores obveniunt, illorumque lœcorum dolores. Quod si partus purgamenta simul quoquè restiterint, tum ea mala omninò sunt immoderata & diuturna, acceduntque & præcordiorum & capitis dolores. At verò ubi ulcus sanatum est, locus ille lævior ac durior necessariò efficitur, & minùs conceptui idoneus. Quod si ulcus sinistra tantùm occupet, mulierque concipiat, aut ubi adhuc ulcus habet, aut postea ubi convaluit, eam marem potiùs enixuram spes est. Sed si ulcus dextra teneat, & mulier concipiat, fœtus fœmineus magis expectandus est. At si febrisprehendat eam quæ concipere nequit, & tussicula detineat, quærendum, num uterum ulcus aliquod occupet? Aut ex his malis quæ scripsimus, aliud quidpiam? Etenim ubi nihil mali, eo in loco

subesse constiterit , quod extenuationem aut conceptûs impedimentum afferat , sanguinis vomitione refusi metus impendet. Ei verò mulieri, menstrua ex necessitate disparuerunt. Si verò febris sanguinis eruptione tollatur , & menses appareant , concipiet. Quod si , antè sanguinis eruptionem , alvus effusa fuerit pravum in modum , periculum est, ne mulier antè sanguinis eruptionem intereat. At quæcumque se concepisse existimant , nequè conceperunt , & multis mensibus decipiuntur , quod menstrua non compareant , ac venter turgescere ac moveri videatur , ex capitis ac cervicis præcordiorumque dolore conflictantur , nequè lac in ipsarum mammis innascitur , nisi paucum quoddam & aquosum ; cùm verò ventris tumor dissolutus fuerit , ac molles evaserint , eæ , nisi quid aliud obstet , concipient. Quando quidem affectio ista ad mutationem utero afferendam vallet , adeò ut post hoc tempus concipiant. Eæ verò quæ

conceperunt, doloribus istis non tentantur, nisi consuetæ fuerint. His capitis dolores accedunt, & lac in mammis innascitur. Quas autem longæ fluxiones exercent, de capitis dolore, lumborum, & imi ventris interrogandæ sunt? Suscitari quoquæ oportet, num dentium stuporem sentiant? Aut visus hebetudinem? Aut aurium sonitum? At quæcumque jejunæ multis diebus aliquantulum biliosâ vomitione rejiciunt, si nequæ uterum gerunt, nequæ febre detinentur, interrogabis num lumbricos rotundos una etiam vomitu refundant? Id enim, ni fateantur, ipsis affuturum prædices. Potissimum autem mulieres invadit hic morbus, deinde etiam virgines, reliquos verò homines minùs.

Vide GRAVIDAM. PRÆGNANTEM. PARTUM. ABORTUM.

COXENDICUM MORBI.

Præd. 1. DE COXENDICUM autem doloribus sic existimandum est. Quibus
2. pag. senioribus vehementissimi tor-
112. &
113.

pores adfunt, & lumbi ac crura frigescent, nec pudendum erigere valent, alvusque nonnisi coacta egerit, & mucosum alvicrementum plurimum prodit, his maximè diuturnum fore, ac prædicendum ex quo morbus cœpit, annum ut minimum perseveraturum, juvamentumque nonnisi aut vere aut ætate sperandum. At juvenibus quidem non minores dolores afferunt coxendicum morbi; sunt tamen breviores: etenim quadragesimo die liberantur. Quin nec vehementes torpores, nequè crurum ac lumborum perfrictiones fiunt. Quos autem morbus iste in lumbis & cruribus vexat, nequè tamen adeo ut decumbere cogantur, animadvertere oportet, num aliquid uspiàm, in coxâ concre scat? Percontari que nùm ad inguem dolor perveniat? Et enim si utraque adfuerint, morbus efficitur diuturnus. Percontandum quoquè num femur torpores sentiat? Et ad poplitem pertingant? Quo concessò rursùs petendum nùm per tibiam fe-

rantur ad primam summipedis partem, quæ *Tarfos* dicitur? Qui enim istorum bonam partem fatentur, his ipsis crus modò calidum, modò frigidum fieri rectè prædixeris. At quibus hic morbus, relictis partibus quæ ad lumbos sunt, infra vergit, eos benè sperare jubebo. Quibus verò coxendicem & lumbos occupat, & supra vergit, iis gravem fore prædicito. Quibus autem ad articulos dolores oriuntur & tumores, definuntque sine podagrâ, iis & magna viscera adesse comperies, & in urinâ quod subsidet, album. Ac si cui tempora attollentur, ea sæpè dolere fatebitur, & sibi nocturnos sudores contingere. Quod si nequè tale quidquam in urinâ subsidet, nequè sudores contingunt, metus est ne articuli claudicent, aut in his abscessus fiat, quem *Melicerida* vocant. Iis autem morbus iste contingit, quibus pueris aut juvenibus, ex naribus sanguinis fluor consuetus desit. Ex quibus percontari oportet nùm in juventute san-

guinis fluxus contigerit? Et num
pungentes prurigines ipsis in pe-
ctore aut dorso insint? Aut ea-
dem contingunt, quibus vehē-
mentes alvi dolores absquē per-
turbatione adsunt, aut quibus
per ora venarum quæ sunt in ano
sanguis effunditur. Hinc namque
istorum morborum origo peten-
da est. Quod si viris, hujusmodi
fœdus color appareat, num
etiā capitis dolor adsit? Per-
contandi sunt. Quod fatebuntur.
Ex quibus qui ventris dextrā in
parte dolores sentiunt, iis vehē-
mentes dolores fiunt, idque vel
maximē si in præcordiis ad hepar
dolor restiterit. Quibus malis
confestim levat strepitus, qui in
ventre fit. At ubi dolor conquie-
vit, urina crassa & pallida reddi-
tur. Atque hoc morbi genus neu-
tiquam lethale est, sed valdē
diuturnum. At ubi jam morbus
inveteraverit, homines oculo-
rum caligine vexat. Percontari
igitur oportet, num sanguis in
juventute fluxerit? Aut oculorum
caligatio contigerit? Aut urina
pallida vacuata fuerit? Aut intus

excitati spiritus & supervenientes, juvamentum attulerint? Istamque omnia fatebuntur.

CRASSI.

Aph. 44. NATURA admodum crassi, celerius intereunt, quam graciles.

Cels. OBESI plerumque acutis morbis, & difficultate spirandi strangulantur, subindèque moriuntur.

CREPITUS.

Vide FLATUS.

CRISIS.

Aph. 13. QUIBUS judicatio contingit, Sect. 2. iis nox accessionem præcedens, gravis, quæ verò sequitur, plerumque levior esse solet.

Aph. 24. QUARTUS septenariorum index est. Octavus alterius septimanæ principium. Undecimus etiàm spectandus dies, siquidem alterius septimanæ quartus est. Rursus quoquè spectandus decimus septimus, iis siquidem decimoquarto quartus est, & ab undecimo septimus.

Si quæ, non pro ratione levant, Aph. 27.
 iis non oportet fidere, nequè ad- Sect. 2.
 modum metuere mala quæ præ-
 ter rationem eveniunt. Ex his
 enim multa incerta esse, neque
 multum perdurare, nequè diu-
 tius perseverare consueverunt.

Quæ, cum malignis signis, al- Sent.
 levamentum adferunt, & quæ, 48.
 cum bonis, non remittunt, mo- Coac.
 lesta sunt & difficilia.

In præcipitibus morbis, judi- Sent.
 catio in quatuordecim diebus 147.
 expectanda est. Coac.

MORBI verò præcipientes & Sent.
 acuti, effluente ex naribus san- 150.
 guine, judicatione absolvuntur, Coac.
 idque die judicatorio, ac sudo-
 re copioso exorto, urinæque
 purulentâ ac vitreâ affatim red-
 ditâ, in quâ quod subsidit lau-
 dabile fit, aut abscessu effatu
 digno, & alvo mucosa & san-
 guinea deiciente ac derepentè
 prorumpente, vomitionibusque
 non pravis sub judicationem
 contingentibus.

QUIBUS, ex naribus fluxiones, Sent.
 quæ septimo, nono, aut deci- 152.
 mo-quarto die contingunt, ut Coac.

plurimum à febris vindicant. Eodem verò modo & biliosus alvi fluxus, & qualis in intestinorum difficultate fieri assolet, ac genuum & coxendicum dolor, urinaque sub judicationem concocta; & verò in muliere mensium profluvium.

Sent. QUÆ perniciem minantur, ea
52. si, absque ullâ significatione, alleviant, mortis periculum denuntiant.
lib. I.
Præd.

Ex lib. FEBRIUM judicationes, iisdem
Præn. numerantur diebus, quibus &
p. 43. evadunt & moriuntur homines.
& 44. Nam & mitissimæ febres, & quæ securissimis fulciuntur signis, die quarto, aut ante desinunt. Maximè verò malignæ, & quæ cum gravissimis signis fiunt, quarto, vel prius interficiunt. Primus itaque earum insultus, ad hunc modum desinit, secundus, ad septimum deducitur, tertius, ad undecimum, quartus, ad decimum-quartum, quintus, ad decimum-septimum, sextus, ad vigesimum. Hi igitur circuitus, ex acutissimis morbis, per quatuor factâ accessione, ad

vigesimum terminantur. Nequè
verò horum quicquam integris
diebus exactè numerari potest,
cùm nequè annus etià , ne-
què menses , integris mensibus
numerari soleant. Post hæc au-
tèm , eàdem ratione, juxtà eam-
dem adjectionem , primus cir-
cuitus est , quatuor & triginta
dierum , secundus, quadraginta,
tertius , sexaginta. At inter ho-
rum initia, perquàm difficilè est
dignoscere quinam , longo tem-
poris spatio judicari debeant ,
quod simillima sint eorum prin-
cipia. Verùm à primo die ad-
vertere animum oportet , &
pro singulorum quaternario-
rum additione , considerationem
adhibere , nec latebit quonàm
se vertat morbus. Quartanarum
quoquè conditio , eundem ser-
vat ordinem : qui verò intrà
brevissimum temporis spatium ,
judicationem sunt subituri , fa-
ciliùs dignoscuntur , cùm maxi-
mè inter se ab initio diffideant.
Qui enim ex morbo superfuturi
sunt, facilè spirant, dolore vacant,
noctu dormiunt , aliaque secu-

rissima signa habent. At perituri, difficultate spirandi vexantur, delirant, vigilant cæteraque pessima signa habent. His igitur sic se habentibus, de morbis ad judicationem tendentibus, tum ex tempore, tum ex unâ quâque adjectione, conjectura facienda est. Ad eamdem quoquè rationem, & mulieribus judicationes ex partu contingunt. Capitis dolores vehementes ac continentes cum febre, aliquo quidè ex signis accedente, admodum exitiales. quod si, sinè signis ejusmodi, dolor vigesimum diem superet, & febris detineat, sanguinis ex naribus eruptionem, & alium quemdam abscessum ad inferiores sedes suspectare oportet. Verùm quoad dolor recens fuerit, eodem modo sanguinis ex naribus eruptionem, aut suppurationem expectare convenit, cum aliàs, tum si dolor circa tempora & frontem affuerit. At sanguinis eruptio magis expectanda venit in his, qui nondum quintum & trigessimum annum attigerunt, in senioribus verò suppuratio.

Vide FEBRES.

CRU-

C R U D I T A S.

Vide URINAM.

C U B I T U S.

Vide DOLORES CUBITI.

C U T I S.

CUTIS corporis squallida & plus æquo sicca, malè affectæ alvi index est. In his prærubæ carunculæ purulentæ ferè ex alvo prodeunt.

Senti
625.
Coac.

Vide COLOREM FACIEM.

DELIRIUM, SEU DESIPIENTIA ET DEMENTIA.

Aph. 53. **D**ELIRIA, quæ cum risu
Sect. 6. sunt, tutiora; at, quæ studio adhibito, periculosiora.

Aph. 9. Ex sanguinis profluvio, deliratio, aut etiâ convulsio, malo est.
Sect. 7.

Aph. 14. Ex ictu in capite accepto, stupor aut desipientia, malo est.
Sect. 7.

Sent. 76. **D**EMENTIÆ in quibus ægri sunt tremuli, aut aliquid, investigantium more sensim contractant aut palpant, phrenitidem prænuntiant. Quin & ad furam dolores, in his mentem emoveant.

Sent. 84. **D**ESIPIENTIÆ cum sopore, convulsiones minantur.

Coac. **Q**UÆ sensim feroces fiunt mentis emotiones, in ferinass evadunt. Quin & convulsiones quoquæ prænuntiant.
Sent. 85.
Coac.

Sent. 89. **D**ESIPIENTIA, cum difficultate spirandi & sudore, lethalis est.
Coac. Quin etiâ cum difficultate spirandi & singultu, mortem adfert.

Sent. 94. **V**EHEMENTI insaniâ detenti tremuli, cum crebrâ sputatione.
Coac.

metus est, ne phrenitici evadant.

DESIPIENTIÆ, quæ circa necessaria sunt, pessimæ, & quæ, ex his ingravescent, exitium portendunt. Sent. 98. Coac.

DESIPIENTIÆ, cum voce stridulâ, linguæ revulsione, ac ipsi quoquè tremuli, vehementem mentis alienationem significant. In his, durities aut asperitas, perniciem minatur. Sent. 99. Coac.

QUI statim, sine ratione, perturbantur, pervigilio torquentur, nigra & compacta ex alvo demittunt, interdum sanguinem è naribus profundunt. Sent. 110. Coac.

QUÆ, brevi tempore durant feroces mentis emotiones, malæ sunt & in ferinas evadunt. Sent. 246. Coac.

VEHEMENTES insanix, cum vocis defectione, perniciem intendant. Sent. 254. Coac.

EX insaniâ, in raucedinem cum tussi, fit secessio. Sent. 484. Coac.

INSANIENTIBUS accedens convulsio, oculorum aciem retundit. Sent. 485. Coac.

VEHEMENTES mentis emotiones silentes, absquè quiete, oculi

lis quoquo versum intuentes ,
spiritum efflantes , perniciem
minantur.

Vide PHRENITIDEM. CON-
VULSIONEM. VERTIGINEM. FE-
BRES.

DECUBITUS.

Vide JACERE.

DESTILLATIO.

Aph. 40. RAUCEDINES & gravedines, in
Sect. 2. valdè senibus, non coquantur.

Aph. 38. DESTILLATIONES in superio-
Sect. 7. rem ventrem , intra vigesimum
diem , in pus vertuntur.

Vide RAUCITATEM. SPUTUM.
TUSSIM.

DEJECTIONES.

Cels. DEJECTIO autèm medica-
l. 1. c. 3. mento petenda est , ubi venter
suppressus parùm reddit , ex eo-
que inflammationes , caligines ,
capitis dolores , aliaque supe-
rioris partis mala crescunt.

Cels. VOMITUS sinceræ pituitæ vel
l. 2. c. 4.

bilis, periculosus; pejorque, si viridis aut niger est: at mala urina est, in quâ subsidunt subrubra aut livida; deterior, in quâ quasi fila quædam tenuia atque alba: pessima ex his, si tanquàm ex fufuribus factas nubeculas representat; diluta quoquè atque alba vitiosa est, sed in phreniticis maximè. Alvus autèm mala est, ex toto suppressa; periculosa etiàm quæ inter febres fluens, conquiescere hominem in cubili non patitur; utiquè, si quod descendit, est perliquidum, aut spumans. Item quod excernitur malum est, glutinosum, lividum, biliosum, cruentum, aut peioris odoris quàm consuetudine, malum est & sincerum.

URINA verò rubra & tenuis, Celsi
in magnâ cruditate esse consuevit. l. 2. c. 6.
Pessima tamen est, præcipuè que mortifera, nigra, crassa, mali odoris. Alvus quoquè varia & discreta reddens, pestifera est: sed ægrum in præcipiti jam esse denuntiat, quæ liquida, eademque vel nigra, vel pallida, vel pinguis est, utiquè, si

magna fœditas odoris accedit.
Vide EXCREMENTA. URINAM.
 ALVUM.

D E N T E S.

Sent. DENTIIUM collisio aut stridor , præter consuetudinem à
 235. teneris contractam , insaniam ac
 Coac. mortem denuntiat. Quod si jam deliranti istud accidat , prorsus exitiale est. Quin & dentes reficari , perniciem denotat.

Sent. DENTIS syderatio , abscessum
 236. ad gingivas enatum , solvit.

Coac. AD dentis syderationem , vehementes accedens febris cum delirio , mortem minatur. Quod
 Sent. si serventur ægri , ulcera pus colligent , & ossa abscedent.

Sent. DENTIIUM stridor , quibus
 48. per sanitatem minimè est consuetus , periculum denuntiat ,
 lib. I. suffocatio in his valdè prava.

Præd. *Vide* FEBRES. ÆTATEM.

D E G L U T I R E.

Sent. POTUM agrè deglutienti , cum
 632. spiritu tussiculoso , eructatio
 Coac.

quodammodò revulsa , intro convoluta , ventris dolorem denuntiat. Vitiosæ etiàm sunt prærubræ dejectiones , æruginosæ quarto die apparentes , ac ejusmodi sanguinis profluvia soporem inducunt. In his casibus , ex convulsione moriuntur , nigris antè prodeuntibus.

Vide COLLUM. CIBUM.

DYSENTERIA, SEU DIFFICULTAS IN- TESTINORUM, ET DIARRHÆA.

INTESTINORUM difficultas, si Aph. 24.
ab atrâ bile ortum duxerit, le- Sect. 4.
thalis.

INTESTINORUM difficul- Aph. 26.
tate vexato , si veluti carunculæ Sect. 4.
dejiciantur lethale.

TABE detento, succedens al- Aph. 14.
vi profluvium , lethale. Sect. 5.

IN longis intestinorum diffi- Aph. 3.
cultatibus , cibi fastidia malum Sect. 6.
denuntiant , & cum febre , pejus.

QUIBUS , per alvi profluvia , Aph. 30.
spumosa sunt alvi excrementa , Sect. 7.
his ea ex capite defluunt.

Aph. 77. Ex alvi profluvio , intestino-
Sect. 7. rum difficultas.

Aph. 78. INTESTINORUM difficul-
Sect. 7. tati , levitas intestinorum suc-
cedit.

Sent. INTEMPESTIVE suppressa in-
462. testinorum difficultas , absces-
Coac. sum in costis , aut visceribus ,
aut articulis induit. Ac fortè bi-
liosa quidè articulis , sangui-
nea verò in costis ac visceribus
abscessum facit.

Sent. INTESTINORUM difficul-
463. tate laborantibus , vomitio bi-
Coac. liosa circà initia , malo est.

Sent. IN gravi intestinorum difficul-
464. tate, quibus humor ad pus perve-
Coac. nit , quod summum insidet ex-
albidum erit aut copiosum.

Sent. INTESTINORUM difficul-
446. tate laborantibus , aliquantulum
Coac. rubræ , limosæ & copiosæ de-
jectiones in flammeo colore &
prærubro perfusis solutæ , insa-
niam suspectam faciunt.

Sent. LIENOSIS difficultas inte-
467. stinorum non longa , utilis ; lon-
Coac. ga verò , mala. Ubi enim desinit ,
si aquæ inter cutem , aut intesti-
norum

norum levitates oriuntur , mortem afferunt.

Vide ALVUM. LIENTERIAM.

D Y S U R I A.

Vide URINAM.

D O L O R.

QUIBUS , pars aliqua corporis dolet , nequè ferè dolorem sentiunt , iis mens ægrotat. Aph. 6. Sect. 2.

CUM duo dolores simul minime eundem locum occupant , vehementior , alterum obscurat. Aph. 46. Sect. 2.

DOLORES , qui sinè febre invadunt , ne interficiunt quidè , at plurimùm diuturni sunt , multasque mutationes ac recursus habent. Atque horum genera primùm quidè in capitis doloribus spectantur , quorum quidam leves sunt , quidam etiàm longè graviores. Utrorumque verò ea sic ineunda est ratio. Quibus autem visus caligat , & rubor quidam in ipsis oculis fit , cum quâdam frontis prurigine , eos juvat sanguis suâ sponte , aut

ex necessitate, profluens. Atque hic modus simplex est. At quibus dolores capitis & frontis contingunt, tùm ex ingentibus ventis, tùm ex frigore post vehementem æstum; eos gravedines potissimùm quidèm omninò liberant. Juvant quoquè & sternutamenta, & mucosæ pituitæ in naribus ortæ, præcipuè quidèm spontè fluentes, sin minùs, vi expressæ. Gravedines verò in totum fiunt, adeò ut tusses consequantur. Et sternutamenta ubi succedunt, nequè dolores sedant, iis tubercula & coloris pravitates ex necessitate aderunt. Quos verò, dolores sinè causâ & diuturni, & totum caput occupantes, jam graciles & viribus exhaustos affligunt, in his attendendum, morbum priore multo esse graviores. Quòd si in cervicem & dorsum, relictò capite, dolor descendit, rursusque in caput recurrit, adhuc gravior existimandus est. At omnium maximè terret, si à capite ad cervicem, & dorsum pervenit. Eos verò juvari spes est, si

abscessus aliquis eruperit , aut pus tussi rejectum fuerit , aut sanguinem per ora venarum fundere sint soliti , aut pustulæ toto corpore pullulârint : ex usu etiâ est , caput porrigine tentari.

QUIBUS causâ doloris , nequè Cels. sensus ejus est , his mens laborat. l. 2. c. 7.

DOLOR ARTICULORUM.

QUIBUS articulorum dolor Cels. certis temporibus revertitur , l. 4. c. 25. hos à curioso victu cavere oportet , ne inutilis materia corporis superfit.

DOLOR AURIS.

AURIS intensus dolor cum Sent. febre acutâ , ac cæteris aliquan- 189. tò gravioribus signis , juvenes Coac. quidè intra septimum diem , aut etiâ celerius , cum delirio necat , nisi puris copia ex aure , aut sanguis ex naribus effluat , aut aliud quoddam laudabile signum extiterit. Ætate autem provectiores , tardiùs aut minùs

tollit. Nam & in his aures antè suppurant, & delirium minùs infestat. Sed & in hâc ætate, multis morbus revertitur, ac proindè interficere solet.

DOLOR CAPITIS.

Aph. 68. EI, qui parte capitis posteriore
Sect. 5. dolet, recta in fronte incisa vena, prodest.

Aph. 10. C A P I T E dolenti ac vehemen-
Sect. 6. tèr laboranti, pus, aut aqua, aut sanguis per nares, vel os, vel aures effluens, morbum tollit.

Sent. Q U I capitis doloribus & au-
161. rium tinnitibus, citrà febrem, aut tenebricosâ vertigine, & vocis tarditate, manuumque stupore, tentantur; in iis, aut syderationem, aut morbum comitialem, aut etiâ oblivionem, sperare convenit.

Sent. E x capite dolentes, & alto
162. stupore (quem *Carochum* dicunt) detenti, ac delirantes, cum alvi interceptione & ferociente intuitu, floridi, in scapulas rigescunt, ac posteriorum partium distensione tentantur.

DO L O R capitis cum sedis ac
 pudendorum dolore, torporem ac
 impotentiam adfert, vocemque
 exolvit, nequè ista molestiam
 exhibent. Verùm ex his, somno-
 lenti ac singultuosi, nono mense
 evadunt, & voce liberâ redditâ,
 in integrum restituantur.

Sent.

164.

Coac.

QU I capitis dolore vexantur,
 ac alto stupore (quem *Catochum*
 vocant) cum dolore detinentur,
 oculos habent prærubros, in iis,
 sanguinis profluvium sperandum
 est.

Sent.

166.

Coac.

IN gravibus & acutis capitis
 doloribus, cum torpore & gra-
 vitatis sensu, proclives sunt
 convulsiones.

Sent.

171.

Coac.

Ex capitis dolore liberat pus è
 naribus effluens, aut sputa crassa
 & inodora. Liberat quoquè &
 ulcerum eruptio, interdùm verò
 & somnus, ac alvi fluxus.

Sent.

172.

Coac.

QU I capite dolent, cum levi
 aliquâ furditate, manuum tre-
 more, cervicis dolore, nigri-
 cantes reddentes urinas & den-
 sas, ii si nigra, vomitione, refu-
 derint, perniciosè habere suspi-
 candi sint.

Sent.

176.

Coac.

Sent. 188. Coac. QUIBUS, ex posteriore parte, ossibus fractis, capitis dolor inest, vehemens & crassa è naribus fluxio malo est. Ii, dolore antea ad oculum suborto, rigore corripuntur. Quin etiàm ossium ad tempora effracturæ, convulsiones accersere solent.

Sent. 534. Coac. IN uterum gerentibus capitis dolores cum sopore & gravitate malo sunt: fortèque hujusmodi naturæ, unà etiàm convulsionibus quibusdam sunt obnoxia.

Vide CAPUT. ABSCESSUS. GRAVIDAM. PARTUM.

DOLOR COXÆ.

Aph. 59. Sect. 6. QUIBUS, coxendicis dolore conflictatis, coxendicis articulus suo loco excidit, ac rursus recipitur, iis, mucres innascuntur.

Aph. 60. Sect. 6. QUIBUS, diuturno coxendicis dolore conflictatis, femoris caput suo loco excidit, iis, crus tabescit & claudicant, nisi urantur.

Vide COXENDICUM MORBOS. ANGINAM. DOLORES HUMERI.

DOLOR CUBITI ET CERVICIS.

CUBITI cervicisque dolores, Sent.
114.
lib. 1.
Præd.
convulsionem minantur. Ex facie autem prodeunt ista, fauciumque sonitus crebri, cum salivatione. Iis, sudores in somnis bono sunt. Nempè & ex sudore levare plurimos, consentaneum est. Quibus, si dolores inferiores partes occupent, toleratu faciles evadunt.

CERVICIS dolor, oculi prærubri, sanguinis eruptionem, Sent.
137.
lib. 1.
Præd.
prænuntiant.

Vide CERVICEM. DOLOREM
JUGULI ET CERVICIS.

DOLOR DORSI.

QUÆ, ex dorsi dolore, initia Sent.
309.
Coac.
ducunt ægri tudines, difficiles.

DOLOR FAUCIUM.

CUM fauces ægrotant, aut Aph. 15.
Sect. 2.
tubercula in corpore exoriantur, excretiones in conside-

G iiij

rationem adhibendæ. Si namque biliosæ sint, corpus simul ægrotat; at si sanorum similes extiterint, securè corpus nutrias.

Sent. 265. Coac. VEHEMENTER dolentes fauces, absquè tumore, cum labore & molestiâ, præceps exitium minantur.

Sent. 268. Coac. VEHEMENTES faucium dolores, aurium tubercula & convulsiones excitant, itèmq; cervicis ac colli dolores.

Sent. 11. 1. 1. Præd. UBI fauces in morbis acutis dolent, graciles sunt, parvæ & suffocantur; atquè ubi os hiârit, non promptè adduci ac claudî possit, mentis emotionem portendi oportet. Ex his phrenitis perniciosâ est.

Sent. 104. lib. 1. Præd. FAUCIUM gracilium dolores suffocantes, convulsionem minantur, tum verò præcipuè si ex capite originem ducunt, quale quid *Trasimontis* consobrinæ contigit.

Ex lib. Præn. FAUCES exulceratæ cùm febre, grave aliquid portendunt.

p. 45. Vide FAUCES. ANGINAM. DOLORES JUGULI ET CERVICIS.

DOLORES HUMERI.

HUMERORUM verò dolores, Præd.
qui ad manus tendunt, torpo- lib. 2.
resque & dolores exhibent, ab- P. 112.
fcessus certè non consequuntur,
at, bilis atræ vomitione, sanantur.
Eos autèm, qui in humeris per-
durant, & ad dorsum pertin-
gunt, puris, aut atræ bilis vo-
mitione, effugiunt. Quorum hæc
ineunda est ratio. Facile quidèm
spirantes & extenuatos, vomitio-
ne nigram bilem effusuros, ma-
gis sperare oportet. At difficul-
tate spirandi laborantes, si in
faciem color subruber, aut ni-
ger antea non visus, subori-
tur, pus expuitione potius red-
dituros, spes est. Prætereà etiàm
animadvertendum, nùm pedes tu-
moribus infestentur? Hoc enim
iis indubitatum est signum. Hic
autèm morbus, viris vehemen-
tissimus accidit, à quadragesi-
mo anno ad sexagesimum usquè,
quam ætatem etiàm, coxendi-
cum dolores, præcipuè vexant.

DOLOR JECORIS.

sent. QUIBUS hepar dolet, cum
448. oris ventriculi dolore, sopore,
Coac. rigore, ii, alvo exturbatâ, cum
corporis extenuatione, cibo-
rum fastidio, multis tenuibus
fudoribus diffluunt, & puru-
lenta per alvum demittunt.

sent. QUIBUS jecur derepentè vehe-
449. mentèr dolet, iis, febris succe-
Coac. dens, remedio est.

Vide JECUR.

DOLOR JUGULI ET
CERVICIS.

Sent. DOLOR ES sensim ingravescen-
70. tes, si ad jugulum & supe-
Coac. riores partes transeant, perni-
ciem minantur.

Sent. QUIBUS, capitis & cervicis
170. dolor, ac totius corporis impo-
Coac. tentia quædam cum tremore
adest, ab his, sanguinis eruptio
liberat, fortassisque ista tandem
dissolvuntur. Verùm interim ve-
sicæ intercipiuntur.

Sent. Ex cervicis dolore, cum so-
98. l. i. Præd.

pore & sudore , inflata alvus, si-
quidè, ex Medici industriâ , li-
quida demittat cum aliquâ pro-
lue , deindè , quæ biliosa non
sunt, restitent , hujusmodi asser-
vata diuturniorem morbum effi-
cient. In his animadvertendum
est , nùm proluvia alvi non bi-
liosæ benigniores sint , ac flatuo-
so tumori conducant ?

Vide CERVICEM. DOLOREM
CUBITI ET CERVICIS.

DOLORE LATERIS.

DOLORES , & in lateribus, & Aph. 5.
in pectore , & in cæteris parti- Sect. 6.
bus , nùm multum differant ?
Perdiscendum.

IN dolore lateris , sanguinis è
naribus stillatio , mala est. Sent.
405.

LATERIS dolor, cum biliosis
sputis, temerè ac præter rationem
evanescens , ægros, in vehemen- Sent.
97. l. 1.
tem & furiosam mentis emotio- Præd.
nem , agit.

Vide PLEURITIDEM. FE-
BRES. DOLORES PULMONUM
ET PECTORIS.

DOLOR LUMBORUM.

Sent. LUMBORUM atquè inferiorum partium dolores, quibus febris etià accedit, si relictis inferioribus, septum transversum appetant, tum verò præsertim exitio sunt, si aliquod periculosum signum accesserit. Quòd si reliquorum signorum nullum periculum ostenderit, futuræ suppurationis metus est.

Sent. DIÛTURNI lumborum dolores, qui, cum febre ad tertianæ naturam propius accedente, ingravescent, sanguinis grumosi secessuri, spem faciunt.

Sent. Ex lumborum dolore, liberales sunt & largæ sanguinis fluxiones.

Sent. QUIBUS, lumborum dolor in caput recursat, & manus torpore affectæ, ac oris ventriculi dolorem sentiunt, aut aurium sonitus, ii liberalitè sanguinem profundunt. Sed & his alvus effunditur, & mentis perturbatione, ut plurimùm, tentantur.

IN intenso lumborum dolore Sent.
& alvi subductione , largiore 310.
sumpto veratro , spumoforum Coac.
crebra vomitio prodest.

QUÆ , ex lumbis, in cervicem Sent.
& caput redundantia , levis sy- 313.
derationis more, resolutionis fen- Coac.
sum inducunt , convulsionem
ac mentis emotionem minantur.
Videndumque est , nùm talia
convulsionibus solvantur? Aut
in hujusmodi habentibus , alvi
malè habeant? Atquè eadem
diutius perseverent?

Ex recursatione doloris in Sent.
lumbis , oculorum perversio aut 314.
distorsio, mala est. Coac.

LUMBORUM dolores, ad os Sent.
ventriculi recurstantes , cum fe- 316.
bre , horrore , si tenuia & aquo- Coac.
sa , vomitione rejecerint, vel de-
lirârint , voce defecti sint , ii,
post nigrorum vomitionem, mo-
riuntur.

LUMBORUM ac tenuioris Sent.
intestini diuturni dolores , & 317.
circum præcordia labores , in Coac.
ægris, unâ cùm febre, cibum fasti-
dientibus , eos, dolor intensus ad
caput progressus , non sinè con-

vulsionis specie , celeritèr interficit.

Sent. Qui , lumborum dolore con-
318. ficiantur , ii , malè habent , nùm
Coac. his tremores fiunt , & maculæ
rubentes , quales in tibiis , cum
rigore ?

Sent. CONSIDERANDUM est , in lum-
319. borum dolore conflictatis & an-
Coac. xietate citrà vomitum , & pau-
lispèr ferocitèr desipientibus
ægris , nùm nigra per secessum
proditura sint ?

Sent. LUMBORUM dolor , absquè
322. causâ manifestâ , crebrò inva-
Coac. dens , morbi malignitatem in-
dicat.

Sent. LUMBORUM dolor , cum æstu
323. implacido & anxio , malum si-
Coac. gnificat.

Sent. Qui , lumborum & lateris do-
325. lore , absquè ullâ occasione , ten-
Coac. tantur , ii , in morbum Regium in-
cidunt.

Sent. SI lumborum dolor diù deti-
42. net , cum æstu implacido , tenui
lib. I. sudore circà caput & thoracem
Præd. oborto , perniciës denuntiatur.
Nam plerumquè ii tremuli eva-
dunt , & vox , velut in rigore ,
conspicuè tremula existit.

LUMBORUM & capitis ac oris ventriculi dolor, cum forti excreatione, convulsionem suspectam facit. Sent. 106. lib. I. Præd.

LUMBIS dolentibus, si oris ventriculi dolor accesserit, futura per hæmorrhoides vacuationis, signum est, ac fortè etiàm eam præcessisse significat. Sent. 130. lib. I. Præd.

QUIBUS lumborum dolor, in caput & manus recurſat & torpore affecti, oris ventriculi dolorem sentiunt, tenuibus ac serosis humoribus abundant, ii, liberè sanguinem profundunt. At verò his, cum mentis perturbatione, alvus effunditur. Sent. 139. lib. I. Præd.

DOLOR MAMMARUM.

QUÆCUMQUE, mammarum dolore ex febribus vexantur, eas, sanguinis concreti sputio non feculenta, dolore liberat. Sent. 553. Coac.

DOLOR PECTORIS.

DOLOR in pectore fixus, cum torpore, subortâ febre, malum indicat, iique celeritè mortem oppetunt. Sent. 315. Coac.

Vide DOLORS PULMONUM
ET LATERIS.

DOLORS PRÆCOR-
DIORUM.

Sent. INGRUENTES ad præcordia do-
284. lores, cùm aliàs pravi sunt, tùm
Coac. verò, si alvos profundant. Dete-
rioros autèm, si parvo tempore
fiant. Quin & indè suborta ad au-
res tubercula, aliæque suppurationes,
malignitatem præferunt.

Sent. Ex præcordiorum doloribus,
293. alvus aliquantùm viscida paula-
Coac. tùm transmittens, stercoracea
pauca effundit, ac fortassis san-
guinem profundit.

Sent. Quos, derepentè absquè fe-
294. bre, præcordiorum aut oris ven-
Coac. triculi dolor, aut crurum, & in-
feriorum partium, affligit, al-
vusque intumescit, venæ sectio,
aut alvi fluxus solutionem affert.
iis febricitare noxium est. Nam
& longæ & vehementes febres
subnascuntur, ac tusses, & spi-
randi difficultas atque singultus
fiunt. Quibus, in solutionem spe-
ctantibus, vehemens coxarum
dolor

dolor , aut crurum ; aut purulenta sputatio , aut oculorum orbitas , succedit.

QUI, præcordiorum doloribus, oris ventriculi, jecoris ac earum, quæ sunt circa umbilicum, partium, conflictantur, cruentâ alvi dejectione liberantur, secus autem, moriuntur. Sent. 295. Coac.

PRÆCORDIORUM dolores, in febre, ægro fari nequeunte, si absquè sudore solvantur, malum indicant. His, ad coxendices, dolores decumbunt. Sent. 297. Coac.

DOLORES in febre ad præcordia affilientes, sinè sudore soluti, maligni sunt. In his dolores ad coxendices cum ardente febre, atque alvus affatim erumpens, perniciem ostentant. Sent. 299. Coac.

ANXIETATE vexatis præcordiis, oborta ad aures tubercula, mortem afferunt. Sent. 302. Coac.

Vide HYPOCONDRIA. DOLOREM VENTRICULI. FEBRES.

DOLOR PULMONUM.

QUÆ, ad præcordia, aut pulmonem dolores faciunt, si in H Sent. 216. Coac.

pus vertuntur, malum denotant.

Sent.
394.
Coac.

D O L O R E S in locis hujusmodi (*de pulmonibus loquitur,*) qui nequè ad expuitiones , nequè ad venæ sectionem , aut victûs rationem desinunt , ad suppurationem tendunt.

Celf.
l. 4. c. 7.

PERIPNEUMONIA , plus periculi , quàm doloris , affert.

Vide PULMONES. SPUTUM.
D O L O R E S P E C T O R I S E T L A T E R I S.

D O L O R E S R E N U M.

Aph. 6. **RENUM** & vesicæ vitia , in se-
Sect. 6. nibus , ægrè curantur.

Aph. 36. **QUIBUS** , renum vitio affe-
Sect. 7. ctis , dolores circà spinæ mus-
culos fiunt , siquidem ad loca exteriora ferantur , abcessum extrà fore expecta ; quod si dolores ad loca interna magis vergant , abcessum quoquè interius , potiùs futurum , sperandum.

Sent.
589.
Coac.

D E R E P E N T E abortus renum dolor , cum urinæ suppressione , calculorum , aut urinæ crassæ mictionem , indicat.

Vide URINAM. VESICAM.

DOLOR SEDIS.

IN longis periculis, sedis dolor, mortem affert. Sent. 71.

Vide DOLORES CAPITIS. Coac.

DOLOR VENTRIS.

DOLORES, qui ad ventrem Aph. 7. sunt, sublimes quidèmi, leviores; Sect. 6. non sublimes verò, vehementiores.

EX diuturno partium, quæ ad ventrem attinent, dolore, suppuratio. Aph. 22. Sect. 7.

EX vehementi partium, quæ ad ventrem attinent, dolore, extremorum refrigeratio, mala. Aph. 26. Sect. 7.

ORIS ventriculi dolor ac præcordiorum pulsus cum febre, in quâ totus corporis habitus perfrigeratur, malum denuntiant, idque præsertim, si cum tenuibus sudoribus contingunt. Sent. 283. Coac.

ORIS ventriculi dolores, cum intestinorum cruciatu, interaneorum animalia dejiciunt. Sent. 285. Coac.

ORIS ventriculi dolor, seniori crebrò adveniens, repentinam mortem denuntiat. Sent. 286. Coac.

H ij

- Sent. VENTRIS dolor à partu , in
 520. his, purulenta exurgpat.
 Coac. Vide ALVUM. DOLORES
 LUMBORUM & PRÆCOR-
 DIORUM.

DOLORES UMBILICI.

- Sent. DOLORES circà umbilicum
 300. cum palpitatione , mentis qui-
 Coac. dèm alienatæ significationem
 quamdam præbent. At iis , sub
 judicationem confertà , & cre-
 bra pituita cum dolore prodit.

- Sent. SUPRA umbilicum labor &
 304. lumborum dolor , qui remediis
 Coac. non fedit , in hydropem sic-
 cum desinit.

- Sent. DOLORES circà umbilicum
 36. cum palpitatione , mentis qui-
 Præd. dèm alienatæ , significationem
 lib. I. quamdam præbent. Sub judica-
 tionem verò his plurimus & cre-
 ber flatus, cum singulari conten-
 tione prodit. Quin & ad furam
 dolores, in his, mentis alienatio-
 nem indicant.



DOLORES ET DURITIES UTERI.

UTERINÆ ventris duritates, cum dolore, celerem perniciem denuntiant.

Sent.
528.
Coac.

Vide UTERUM.

DORMIRE.

Vide SOMNUM. JACERE.
HYGIENEM.



ELLEBORUS.

Aph. 16. **V**ERATRUM, iis, qui sano sunt
Sect. 4. corpore periculofum, convul-
fionem enim inducit.

lent. E P O T O veratro, rubra, spu-
570. mantia, pauca, vomitione reji-
Coac. cere juvat. Duritias tamèn facit,
& magnas puris intrò collectio-
nes eximit. Qui verò talia vo-
mitione refundunt, pectoris
præcipuè dolore conflictantur,
& in rigoribus crebrò & tenui-
tèr exudant, testes in tumo-
rem sublatos habent. Quo in ca-
fu subindè rigent, & graciles
evadunt.

Vide CONVULSIONEM. DO-
LOREM LUMBORUM. PURGA-
TIONEM.

E M P Y I.

Aph. 15. **Q**UI, ex morbo laterali suppu-
Sect. 5. rati fiunt, si intrà dies quadra-
ginta, ex quo ruptio facta est,
repurgentur, liberantur; alio-
quì in tabem tranfeunt.

Aph. 44. **S**UPPURATI, cùm uruntur aut
Sect. 7.

fecantur, si pus, purum & album effluat, evadunt. Quod si subcruentum, & cœnosum, & graveolens fuerit, pereunt.

Vide PUS. PLEURITIDEM. PULMONES.

EPILEPSIA.

Ex comitialibus, juvenes, mutatione potissimum ætatis, & regionum, & victuum, liberationem accipiunt. Aph. 45. Sect. 2.

COMITIALES, quibus antè pubertatis annos contingunt, depositionem accipiunt. At quibus quintum & vigesimum annum agentibus fiunt, eos ferè ad mortem usquè, comitantur. Aph. 7. Sect. 5.

Ex morbo sacro, quem comitiales dicunt, ægerrimè emergunt, quibuscùm unà à puero increscit morbus, & in virilem ætatem simul adolescit; deindè quibus, ætate florente, ortus est, nempe post annum quintum & vigesimum, ad quadagesimum quintum usquè. Quos deinceps consequuntur, quibus morbus accidit, nequè antè in corporis Præd. lib. 2. p. 92. & 93.

partibus , aliquis venientis malī
 sensus est ; quibus nequē ex ca-
 pite initium ducere videtur , aut
 latere , aut manu , aut pede , ii
 facilius sanantur. Hæc tamēn
 etiām inter se differunt. Ex his
 namquē molestissimi sunt , qui à
 capite originem trahunt , deindē
 ex latere , qui verò à manibus ac
 pedibus , præcipuē sanitatem re-
 cuperant. His autēm manum ad-
 movere Medicum oportet , qui
 rectē curationis rationem te-
 nuerit , ubi juvenes fuerint , &
 laboribus dediti , nisi cui mens
 malē sit affecta , aut quis atto-
 nitus fuerit. Ejusmodi namquē
 vehementes mentis emotiones ,
 nihil conducunt. Reliquæ verò
 omnes naturæ emotiones quæ ad
 inferna tendunt , probantur ,
 longēque optimæ hoc loco cen-
 sendæ sunt , quæ maximē cruen-
 tæ. At senes qui corripī cœpe-
 runt , præcipuē moriuntur , ac nisi
 pereant celerrimē , suâ sponte
 servantur , minimūque à Me-
 dicis juvantur.

Cels. COMITIALIS morbus , sæpius
 l.3.c.23. viros , quàm fœminas occupat.
 ERYSIPELAS

E R Y S I P E L A S.

ERYSIPELAS, foràs effusum, Aph.25.
intrò verti, minimè bonum, at Sect. 6.
ab interioribus foràs, bonum.

Ex ossis nudatione, Erysipe- Aph.19.
las, (malum.) Sect. 7.

Ex Erysipelate, putredo aut Aph.20.
suppuratio (malum.) Sect 7.

ERYSIPELAS verò foris qui- Sent.
dèm extare, utile; intrò autèm 366.
vergere lethale. Cujus quidèm Coac.
rei indicium est, cum rubore
evanescente, pectus gravatur, &
ægrius spiritum trahit æger.

Vide ANGINAM. CONCIPERE.

E U N U C H I.

EUNUCHI, nequè podagrâ Aph.28.
laborant, nequè calvescunt. Sect. 6.

E V A C U A T I O.

IN alvi perturbationibus, & Aph. 2.
vomitionibus, quæ spontè eve- Sect. 1.
niunt, si, qualia oportet, pur-
gentur, conducit & facilè tole-
rant, sin minùs, contrà evenit.

Itidè & vasorum evacuatio, si, qualis debet, fiat, conducit, & facilè tolerant, sin minùs, contrà fit. Adhibenda igitùr consideratio, & loci, & tempestatis anni, & ætatis, & morborum in quibus hæc fieri debent, nèc ne.

Aph. 3. **BENE** habita Athletarum va-
 Sect. 1. letudo ad summum progressa, ubi ad plenitudinis extremum pervenerit, lubrica est, cum non possit eodem statu permanere, nequè quiescere. Quandoquidè verò non quiescit, nequè jam potest in meliùs progredi, reliquum est ut in deterius labatur. His igitùr de causis pleniorè illum corporis habitum haud cunctantèr solvere expedit, quo corpus alterius nutritionis initium sumat. Nequè tamèn eò deveniendum ut vasa extremè concidant (periculosum enim) sed qualis fuerit ejus, qui sustinere debet, natura, eò usquè progrediendum. Eàdem verò ratione evacuationes ad extremum deductæ, periculosæ, contraquè refectiones ad sum-

num progressæ, periculosa.

QUÆ educere oportet, quò Aph. 21.
maximè vergunt, eò ducito, Sect. 1.
per loca convenientia.

QUÆ prodeunt, copiâ minimè Aph. 23.
existimanda, sed ut qualia expe- Sect. 1.
dit, prodeant, & æger facile
ferat. Atque ubi ad animi de-
fectionem usquè educere oportet,
id etiâ faciendum, si æger
sufficere queat.

PER morborum initia, si quid Aph. 29.
movendum videtur, moveto. Sect. 2.
Cum verò vigent, quiescere
præstat.

CONFERTIM & repentè Aph. 51.
vacuare, vèl implere, vèl ca- Sect. 2.
lesfacere, vèl refrigerare, vel ut-
cumquè aliter corpus movere,
periculosum. Quòd si quidèmi-
niûm naturæ inimicum. Verûm
quod paulatim fit, securum est,
tùm vèl maximè, si quis ab uno
ad alterum transferit.

QUIBUS, venæ sectio & me- Aph. 47.
dicamentum purgans, confert, Sect. 6.
his, vere, venam secare, aut medi-
camentum purgans exhibere
convenit.

QUÆ cruda deorsùm fece- Aph. 70.
Iij Sect. 7.

dunt, ab atrâ bile sunt; si plura,
major, si pauciora, minor est
morbus.

Cels. Id quoquè videndum est, quod
1.3.c.46. quidam solùm præcipiunt, astri-
ctum corpus sit? an profluat?
Quorum alterum strangulat,
alterum digerit. Nàm si astri-
ctum est, ducenda alvus est,
movenda urina, ejiciendus omni
modo sudor: contrâ si profluat,
sudor coërcendus, quies adhi-
benda erit, tenebris somnoquè
quandocumquè volet, utendum,
non nisi levi gestatione corpus
agitandum, & pro genere mali
subveniendum.

*Vide PURGATIONEM. PHLE-
BOTOMIAM. REMEDIUM.*

EXCREMENTA ALVI.

Aph.21. NIGRÆ dejectiones, qualiss
Sect. 4. sanguis niger, spontè proceden-
tes, & cum febre, & citrà fe-
brem, pessimæ, eoquè peiores
quò plures earum colores dete-
riorés fuerint; à medicamentis
autèm, meliùs, quoquè plures
colores fuerint, non pravi.

Sent. QUIBUS, prodeunte egestionem

alvi biliosa , ad pectus morsus
ac amaritudo sentitur , ii, malè
habere, judicantur. Coac.

In plurimis graveolentibus de-
jectionibus , cùm febre acutâ ,
præcordiorum contentione , ex
longo intervallo oborta ad aures
tubercula , mortem adferunt. Sent.
201.
Coac.

A sanguinis eruptione, nigro-
rum per alvum egestio, malo est.
Quin & prærubræ ac æruginosæ
dejectiones , damno sunt. Qui-
bus, ejusmodi sanguinis eruptio-
nes quarto die contingunt , tan-
dèm sopore & convulsione con-
flictati moriuntur , prægressis
nigris dejectionibus & ventre
in tumorem sublatò. Sent.
330.
Coac.

ALVI recrementum optimum
est molle , constans, aliquatenùs
fulvum , nec admodùm graveo-
lens , eoque tempore , quo per
secundam valetudinem dejici so-
let , excretum , copia verò in-
gestis cibis respondens. Crassum
autèm fieri oportet in judicatio-
nem cunte morbo. Utile quoquè
quod lumbricos teretes ad judi-
cationem exire cogit. Sent.
601.
Coac.

In præcipitibus malis , spu-
I iij Sent.
602.

Coac. mans & circumbiliosum alvi recrementum, malo est. Malum quoque & exactè candicans. Adhuc verò deterius farinae molitiæ instar, & stercoreosum. Præter hæc, sopor malo est, & cruenta alvi dejectio, ac immoderata vasorum inanitio.

Sent. ALVI recrementum glutinosum, sincerum, aut album, in
604. vitio est. Vitiosum quoque quod
Coac. abundè fermentatum est, & aliquantulum pituitosum. Pravum etià cum ex his quæ densata feruntur, quod subsidet aliquantulum livescit, purulentum ac biliosum est.

Sent. SANGUIS splendidus alvo per
605. secessum rejectus, malo est,
Coac. præsertimque si dolor aliquis adsit.

Sent. SPUMANS & bile obductum
606. alvi recrementum, vitio est.
Coac. Quin & indè morbus regius contrahitur.

Sent. IN biliosis dejectionibus spumosa efflorescentia, malo est, iis
607. verò præcipuè quos antea lumborum dolor aut desipientia vexarit, fortèque etià dolores
Coac. iis adsunt.

TENU E alvi excrementum & Sent.
 spumans in quo quod subfidet 608.
 aqueum est, & ex pallido vi- Coac.
 rescens, malo est, malum quo-
 què purulentum. Nigrum etiàm
 cruentum malum, cùm febre,
 atque aliàs. Vitiosum quoquè
 varium abundè coloratum alvi
 excrementum, eoquè deterius
 quo colore formidandum magis,
 præter quam in medicamenti po-
 tione. Tunc namquè periculo
 vacat, copia non exuperans.
 Friabilis quoquè mollis in febre
 alvi secessus, vitio est. Vitiosus
 quoquè siccus, qui facilè dissol-
 vitur, nec cohæret, decolor,
 idque præcipuè si alvum hu-
 medet, lethalis verò si nigra
 antea prodierint.

LIQUIDUM alvi recremen- Sent.
 tum, & brevibus intervallis cu- 609.
 mulatum, malo est. Partim Coac.
 namquè vitium & insomniam,
 partim verò exolutionem pariet.

PERLIQUIDUM & aliquantu- Sent.
 lum perfriabile alvi recremen- 610.
 tum, cùm summi totius corpo- Coac.
 ris perfriktione, non sinè febre,
 vitiosum est. Rigores prætereà
 I iij

vesicam & alvum corripunt. Valdè verò aquosa dejectio in præcipitibus malis non desinens, malo est, atquè eò magis si sitis vacuitatem fecerit.

Sent. PRÆRUBRUM in alvi proluvie
611. excrementum, vitio est. Vitio-
Coac. sum etiàm admodùm ex viridi
palescens, aut albicans, aut
spumans, aut aquosum. Itèm
malum est quod exiguum, glu-
tinofum, leve & ex viridi sub-
pallidum. Pessima quoquè de-
jectio liquida, in sopore &
torpore detentis. Lethale verò
est etiàm multum sanguinem
grumosum ex alvo effluere,
itemquè candidum & liquidum
excrementum cùm alvi tumo-
re.

Sent. ALVI excrementum nigrum
612. velut sanguis, & cùm febre,
Coac. & sinè febre, malo est. Mala
itèm quæcumque varia, & quæ
bile abundè sunt saturata.

Sent. ALVI recrementa, quæ in
613. spumosa & sincera desinunt,
Coac. omnibus quidèm ingravescentis
mali significationem præbent,
convulsione verò tentatis, vel

maxime. In hujusmodi casibus ad aures tubercula oriri solent. At quæ perliquida, ac rursus consistentia, sincera, stercoracea, morbi longitudinem denuntiant. Prærubrum verò in febre, delirium. Candicans autem stercorosum, in regio morbo molestiam exhibet, ac liquidum etià, ubi resederit ruborem adeptum.

SANGUINEM effudentibus, Sent.
glutinosum alvi recrementum, 614.
maculis nigris distinctum, Coac.
lignitatem denotat, præcipue-
què in exalbidis.

EXACTE candicans alvi re- Sent.
crementum in febre, nullam bo- 615.
nam judicationem denuntiat. Coac.

ALVUS perturbata cum fre- Sent.
quenti desidendi labore, maxil- 616.
las intendit, rubores etià fa- Coac.
ciei solvit.

STERCORACEA alvi ejectio Sent.
cum tensione, alvum malè af- 617.
fectam denuntiat. Pituitosa verò Coac.
repentè cum oris ventriculi
dolore, intestinorum difficulta-
tem, & fortassè etià lumbor-
um dolorem. In talibus alvus

circumtenſa , ex neceſſitate li-
quida demittens , celeritèr intum-
eſcens , quamdam convulſio-
nis ſignificationem præ ſe fert ,
in his novus ſubindè rigor pe-
riculum creat.

Sent. QUIBUS nigra per alvum ſe-
618. cedunt , ii, tenuibus & frigidis
Coac. ſudoribus , diffluunt.

Sent. QUIBUS circà initia alvus tur-
619. batur, urinæ autem paucæ ſunt,
Coac. temporis progreſſu alvus qui-
dèſem reſiccatur , urina verò te-
nuis abundat , his abſceſſus ad
articulos fiunt.

Sent. FREQUENTES deſidendi labo-
620. res rigorem adferunt , & quibus
Coac. alvi recrementum vitioſum eſt,
id maximam moleſtiam exhibet,
ſi quarto die initium fecerit.

Sent. FREQUENTES & ex parvis in-
621. tervallis deſidendi labores , ali-
Coac. quantulùm glutinoſa excernen-
tes , cum paucis ſtercoraceis ,
præcordiorum & lateris dolore ,
morbum regium prænuntiant.
Animadvertendum autèm nùm
ex iſtorum ſuppreſſione, ii cùm
viore pallescant ? eos verò
etiàm exiſtimo ſanguinem pro-

fundere. Hos quoquè lumborum dolores affligunt , & his sanguinem profundentibus , sanguis splendidus prodit. Cùm sopore & capitis dolore subindè incalescere , perniciem denuntiat.

GLUTINOSÆ , biliosæ dejectiones magis quodammodò abscessus juxtà aures excitant. Sent. 622. Coac.

QUIBUS faciei incendium & intensus rubor solvitur , & graueolens est alvi ejectio , redundans & subrubra, in his insanix metus est. Sent. 624. Coac.

IN biliosâ alvo , molli , stercoreacea egerente , apparentes æstus tumorem ad aures excitant. Sent. 626. Coac.

BILIOSAS alvi dejectiones surditas , & surditatem biliosa alvi dejectio, sedat. Sent. 627. Coac.

QUÆ circà sedem cùm dolore suppurant , alvum conturbant. Sent. 630. Coac.

EXITIALIS est dejectio pinguis & nigra , ac livida cùm odoris gravitate , itemquè biliosa simile quiddam *lentium* aut *cicerum* lomento continens aut veluti benè florulentos sanguinis gru-

mos , & infantium egestionem odore referens , ac varia , eademquè diù perseverans. Talis etiam fuerit cruenta , strigmentosa , biliosa , nigra , viridis , & simul ; & per vices excreta. Exitialis quoquè , quæcumque prodeundo sensum ægri fallit.

Sent. QUIBUS nigra per alvum sece-
633. dunt , ii , tenuibus & frigidis su-
Coac. doribus diffluunt.

Sent. IN iis, qui longo tempore con-
634. sumpti sunt , temerariæ & quæ
Coac. præter rationem finiunt alvi exo-
lusiones, unà cùm vocis defectio-
ne tremulâ , perniciem denun-
tiant.

Sent. TENUES nigrorum dejectiones
635. horrorem inducentes in talibus
Coac. meliores. Tales præcipuè juvant
ætatem quæ vigorem antecedit.

Sent. QUIBUS autèm, cum alvi per-
637. turbatione, subjudicationem mor-
Coac. bus ingravescit , iis, nigra per
alvum prodeunt.

Sent. Ex diuturno ventris affectu ,
638. vomentibus, biliosis, cibum aver-
Coac. santibus , copiosus sudor obortus,
cùm repentinâ virium impoten-
tiâ, lethalis.

UBI alvus humecta est, ægri Sent.
lassitudine, capitis dolore, siti, 642.
insomniâ torquentur, in præru- Coac.
bro colore liberatis insaniam me-
tuere oportet, si spirandi diffi-
cultas adfuerit. Quos etiam ex
virore pallescentes facilis spira-
tio juvat, alvo subindè prorum-
pente.

ÆSTUOSÆ dejectiones & cùm Sent.
contentione procedentes, malè 643.
affectam alvum prænuntiant. Coac.

IN biliosis perturbata alvus, Sent.
pauca crebrò reddens, & cùm 644.
paucis mucosis distensionem fa- Coac.
cientia, oborto circà tenue inte-
stinum dolore, nec facilè pro-
deunte urinâ, ex his casibus, in
aquam inter cutem tendit.

QUI æstum sentiunt, & pro- Sent.
gressis dejectionibus, tenuibus 646.
sudoribus diffluunt, iis, febris Coac.
ingravescit.

IN humectâ alvo, perfrictio Sent.
cùm sudore, vitiosa. 647.

HUMESCENTE alvo sanguis ex Coac.
gingivis effluens, lethalis. Sent.

ALVI recrementum purum suc- 648.
cedens, febrem acutam solvit Coac.
cùm sudore. Sent.

649.
Coac.

Sent. TENUES ex alvo absquè mor-
 78. l. I. dacitatis sensu prodeunt deje-
 Præd. ctiones, ei, qui sibi benè constat,
 malum portendunt, velut non-
 nunquàm jecinoroso contingit.

Sent. Ex ventre, quæ prodeunt sub-
 108. l. I. livescentia & turbulenta, uri-
 Præd. næ etiàm tenues ac dilutæ sus-
 pectæ sunt.

Sent. QUÆ, inter se non cohærent,
 116. l. I. sed facilè dissolvuntur, & ali-
 Præd. quantulùm friabilia sunt alvi re-
 crementa, liquida, cùm summi
 totius corporis perfrictione, non
 sine febre, improbanda sunt. Ac
 præter hæc, si rigores vesicam
 & ventrem cùm dolore invadant.
 Proindè in his, ex sopore aliquod
 convulsionis periculum impen-
 dere, nemini mirum videri de-
 bet.

Sent. FREQUENTES desidendi labo-
 146. l. I. res, pauca aliquantulùm flava,
 Præd. glutinosa excernentes, cùm pau-
 cis alvi recrementis, præcordio-
 rum & lateris dolore, morbum
 regium prænuntiant. Animad-
 vertendum verò nùm ex istorum
 suppressione, ii exolvantur? aut
 fortassè sanguinem profundant?

In his lumborum tensio & dolores, sanguinis erupturi fidem faciunt.

IN alvi recrementis, quæ cum torminibus dejiciuntur, sedimentum limosum, sublividum, malo est. Ac fortassè quidè ad præcordia dextra, dolor adest, & in his vires exolvuntur. Videndum num abscessus ad aures paulò post cum dolore excitentur? in his omnibus alvus affatim prorumpens periculum intentat.

ALVO stercora nigra demittente, si sopor appareat, tubercula ad aures excitat.

SECESSUS verò necesse est his qui defatigantur, dum parvo cibo aut potu contenti sunt, exiguos & duros procedere, sive quotidie, sive tertio quoque aut quarto die, aut longiore ex intervallo prodeant, tuncquè metus est ne febris aut alvi profluvium ipsosprehendat. Quibus tamèn peiores sunt dejectiones omnes, quæ tam sunt liquidæ ut in exitu figuratæ esse nequeant. Frequentem verò cibum fumen-

Sent.
156. l. 1.
Præd.

Sent.
166. l. 1.
Præd.

Lib. 2.
Præd.
pag. 87.

tibus ac multum defatigatis ; mollem in transitu dejectionem siccam esse oportet , ciborumquè ingestorum copiam pro defatigationis ratione respondere. Sumptâ autem æquali ciborum copiâ , his quidem qui minimum defatigantur , plurimæ ; his verò qui plurimum defatigantur , paucae dejectiones prodeunt , si sani sint & probâ victûs ratione utantur. (Ea namquè ad hæc conferre existimandum est.) At liquidiores dejectiones , quæ citrà febrem & die septimo aut citius iudicio terminantur , utiles , si semel universæ effluant , nequè repetant. Quòd si febris accesserit alvi que profluvia repetant , si diù perseverent omninò vitiosa , sive biliosa fuerint , sive pituitosa , sive cruda , egentquè singula cùm propriâ victûs ratione , tum meditatione.

Præn. ALVI dejectio optima est , si
 pag. 39. mollis est & consistat , eoque
 & 40. tempore , quo per sanitatem , de-
 jici solet , copia verò ciborum
 ingestorum rationi responderit.
 Talis enim exitus , inferiorem
 alvum

alvum benè valere, declarat. At
liquida alvi egestio ex usu est,
si nequè stridet, nequè crebrò,
nequè ex brevibus intervallis ex-
cernitur. Frequens enim desiden-
di labor ægrum fatigat, eiquè
insomniam adfert. Quòd si affa-
tüm & sæpè dejicit, pericu-
lum est ne animus deficiat. Ve-
rùm pro ingestorum ciborum
copiâ bis aut tèt interdiù, &
noctù semèl, dejici debet, plus
tamèn primâ luce, pro hominis
consuetudine. Crassiorè autèm
fieri dejectionem oportet, mor-
bo ad judicationem procedente.
Sit etiàm subfulva, nequè admo-
dùm graveolens. Lumbricos quo-
què rotundos cum alvi excretio-
ne prodire, morbo in judicatio-
nem tendente expedit. In omni
verò morbo ventrem mollem
esse, & mediocritèr extumesce-
re convenit. At valdè aquosum,
aut album, aut ex viridi palli-
dum, aut vehementèr rubrum,
aut spumans dejici, hæc omnia
mala sunt: præter hæc quoquè
malum est, quod exiguum, glu-
tinosum, candidum, ex viridi

subpallidum & leve existit. His verò magis lethalia sunt nigra, aut pingua, aut livida, aut æruginosa, aut fœtida. Varia autem his quidè m sunt diuturniora, nihilò tamèn minù s exitialia. Hujusmodi sunt strigmentosa, biliosa, cruenta, porracea & nigra, modò simù l intè r se mixta, modò per vices prodeuntia. Flatum autèm, sinè sonitu quidè m à c crepitu exire, optimum. Præstat tamen cù m strepitu prodire, quàm istic revolvì. At qui eo modo prodit ægrum aliquo dolore vexari, aut delirare indicat, nisi æger suâ sponte hoc modo flatum emiseric. Ac præcordiorum dolores & tumores, recentes quidè m & sinè inflammatione, murmur solvit circà præcordia exortum, idquè potissimùm si cù m stercore, urinâ & flatu prodierit, alioquì ubi ipsum per se transmissum fuerit, juvat, idque magis si ad inferiores sedes descenderit.

Vide ALVUM. DYSENTERIAM. LIENTERIAM.

EXCREATIONES.

IN febris non intermitten- Aph.47.
tibus, excreationes lividæ, fan- Sect. 4.
guineæ, graveolentes, & bilio-
sæ, omnes malæ, benè autèm si
prodeant, bonæ, tùm per alvi
excretiones, tùm per urinas. At
si quid eorum quæ non juvant
per hæc loca excernantur, ma-
lum.

Vide SPUTUM.

EXTENUATIO.

Quovis in morbo, partes quæ Aph.35.
sunt ad umbilicum & imum ven- Sect. 2.
trem, crassitudinem habere præ-
stat, valdè autèm tenues esse,
& tabefactas, pravum. Ad in-
feriores autèm purgationes, hoc
etiàm parùm tutum.

Vide TABEM. BILEM ATRAM.



F A C I E S.

Sent. **F**ACIES ex tumidâ depressâ
211. àc vox levior , àc remissior
Coac. evadens , spiritus quoquè rarior
àc lenior , posterâ die remissionem fore denuntiat.

Sent. FACIEI corruptela lethalis est,
212. minùs tamèn si ob pervigilium ,
Coac. aut inædiam , aut alvi perturbationem contingat. Nàm quæ ex his causis orta corruptelæ species , unâ die aut nocte in integrum restituitur. Hujusmodi autèm faciei hæ sunt notæ , oculi concavi , nares acutæ , collapsa tempora , frigida aures contractæquè , cutis dura , color pallidus aut niger. Ad hæc quoquè livescens palpebra , aut labrum , aut nasus , mortem in propinquo esse significat.

Sent. BENE colorata facies cùm sudoribus diffluentibus absquè febre , vetusta stercora subesse aut inordinatam victûs rationem præ se fert.

Sent. BENE colorata facies & valdè
49.Præ. tetrica àc superciliosa perniciem
lib. I. intentat.

IN morbis autem acutis, im- Præm.
primis quidem ægroti facies sic pag. 36.
in considerationem adhibenda, & 37.
fit-ne benevalentium, præcipue-
quæ sui ipsius similis. Ita enim
optima existimanda, quæ verò
ab eo plurimum recedit gravissi-
mum periculum portendit. Qua-
lis fuerit nasus acutus, oculi con-
cavi, collapsa tempora, aures fri-
gidæ & contractæ, imisque suis
fibris inversæ, cutis circa fron-
tem dura, intenta & resiccata,
& totius faciei color ex viridi
pallescens, aut etiam niger,
aut lividus, aut plumbeus. Itaque
si per initia morbi ejusmodi fa-
cies fuerit, nequæ adhuc ex aliis
signis conjicere potueris, inter-
rogare convenit, num æger vi-
gilaverit? aut alvus admodum
liquida fuerit? aut cum inædia
aliqua oppresserit? Quod, si quid
horum fateatur, minus formi-
dandum esse, existimandum. Di-
judicantur autem ista, die ac no-
cte, si ex his causis ejusmodi
facies fuerit. At si nihil horum
præcessisse dixerit, nequæ intra
dictum tempus ad pristinum

statum redierit, in propinquo mortem esse sciendum est. Si verò vetustiore jam morbo, aut triduo aut quatrduo, talis facies extiterit, inquirenda ea sunt de quibus antea præcepi, & reliqua signa, tum ex universâ facie, tum ex corpore, & oculis, in considerationem adhibenda.

Vide COLOREM FACIEM.

F A U C E S.

Sent. 264. **QUIBUS**, ad fauces irritamenta fiunt, iis, moderata aurium tubercula excitantur.

Sent 267. **FAUCES** levitè exasperatæ & alvus inanibus exsurrectionibus fatigata, frontis dolores in ægris palpitantibus & more investigantium sensim contrectantibus, aut dolore affectis, si quæ ex his increscunt, molestiam exhibent.

Vide DOLOREM FAUCIUM.

F A M E S.

Aph. 16. **CUM** inedia premit, laborare Sect. 2. minimè convenit.

Aph. 21. **FAMEM** vini potio solvit.

Sect. 2. *Vide* CIBUM. HYGIENEM.

F E B R E S.

QUARTANÆ æstivæ ferè bre- Aph.25.
ves existunt, autumnales verò Sect. 2.
longæ, præsertim quæ ad hye-
mem pertingunt.

CONVULSIONI febrem adve- Aph.26.
nire præstat, quàm convulsio- Sect. 2.
nem feбри.

CORPUS eorum qui non om- Aph.28.
ninò levitèr febricitant in eodem Sect. 2.
consistere & nihil concidere,
vèl etiàm magis quàm ratio po-
stulat extenuari, malum, illud
si quidè m morbi diuturnitatem,
hoc verò imbecillitatem signifi-
cat.

IN febribus, si rigores contin- Aph.29.
gant sexto die, difficilem ha- Sect. 4.
bent dijudicationem.

QUIBUS, accessiones fiunt, Aph.30.
quânamcumquè horâ febris de- Sect. 4.
miserit, si postero die eâdem
quâ antea horâ prehenderit, ju-
dicatio difficilis esse solet.

QUIBUS, per febres lassitudi- Aph.31.
nis sensus inest, iis, ad articulos Sect. 4.
potissimumquè circà maxillas
abscessus oriuntur.

Aph. 43. FEBRES, quæ tertio quoque
Sect. 4. die vehementiùs affligunt, ne-
què intermittunt, periculosio-
res. Quocumque autèm modo
intermiserint, extrà periculum
esse significant.

Aph. 48. IN febribus non intermitten-
Sect. 4. tibus, si partes externæ sint fri-
gidæ, internæ verò urantur &
siti vexentur, lethale est.

Aph. 49. IN febre non intermittente, si
Sect. 4. labrum, aut supercilium, aut
oculus, aut nasus pervertatur,
si non videat, si non audiat, im-
becillo jam corpore, quicquid
ex his evenerit, in propinquo
mors est.

Aph. 53. QUIBUS, per febres ad dentes
Sect. 4. glutinosus humor obnascitur,
iis, vehementiores sunt febres.

Aph. 58. FEBRE ardente detento, si
Sect. 4. rigor successerit, solutio con-
tingit.

Aph. 59. TERTIANA exquisita septem
Sect. 4. circuitibus, ut longissimè judi-
catur.

Aph. 60. QUIBUS, per febres aures ob-
Sect. 4. surduerunt, sanguis ex naribus
profluens aut alvus exturbata,
morbum solvit.

FEBRICITANTI.

FEBRICITANTI, nisi diebus Aph.61.
 imparibus febris demiserit, re- Sect. 4.
 verti solet.

IN febribus, circa ventriculum Aph.64.
 æstus vehemens, & oris ventri- Sect. 4.
 culi morsus, malo est.

IN febribus acutis, convulsio- Aph.65.
 nes, & circa viscera dolores ve- Sect. 4.
 hementes, malum.

IN febribus, per somnos pavo- Aph.66.
 res, aut convulsiones, malo sunt. Sect. 4.

QUI, quartanis corripuntur, Aph.70.
 ferè convulsione non tentantur. Sect. 5.

Quòd si priùs corripiantur, dein-
 de quartana succedat, liberan-
 tur.

QUIBUS, in febribus ardenti- Aph.26.
 bus tremores contingunt, deli- Sect. 6.
 cium solvit.

SI febris, non ex bile orta, pre- Aph.42.
 tenderit, aquâ calidâ & copio- Sect. 7.
 â capiti affusâ, fit febris solutio.

FEBRES non intermittentes, Aph.64.
 si tertio die vehementiores eva- Sect. 7.
 dunt, periculo obnoxia, quoquo
 autem modo intermiserint, pe-
 riculum abesse indicat.

Quos, febres longæ exercent, Aph.65.
 is, tubercula, vèl in articulis Sect. 7.
 dolores, innascuntur.

Sent. IN febre, convulsio, manuum-
 30. què àc pedum dolores, malignum
 Coac. quiddam prænuntiant. Malignus
 quoquè ex femore doloris im-
 petus, si & nequè genuum do-
 lor probari potest. Quin & su-
 rarum quoquè dolores maligni
 sunt, àc mentis emorio, tum
 verò præcipuè si sublime quid
 in urinã innatet.

Sent. E x præcordiorum dolore ob-
 31. ortæ febres, malignæ sunt. In
 Coac. his profundus àc altus sopor
 pessimus.

Sent. QUI, in febre non intermit-
 32. tente tenuitèr & crebrò exudant,
 Coac. cùm præcordiorum distensione,
 ii, ut plurimùm malignè habent,
 atquè in his dolores in humeri
 caput àc jugulum affixi, pravi
 sunt.

Sent. FEBRES, quæ proximè ad ter-
 33. tianarum naturam accedunt cùm
 Coac. incontinenti corporis jactatio-
 ne, malignæ sunt.

Sent. IN febre, mutum esse, malo
 34. est.

Coac. FEBRES, ad tertianarum na-
 Sent. turam accedentes, vagæ & er-
 37. rantes, ubi in dies pares transie-
 Coac.

int, molestiam exhibent.

IN febribus, alvo à flatibus distentâ, flatum non erumpere, malum. Sent. 40. Coac.

QUIBUS, in febre ardente, tumores cum somnolentiâ & torpore obveniunt, eos, lateris dolor accedens, cum levi partis alicujus syderatione necat. Sent. 60. Coac.

QUIBUS, cum febre, lateris dolore accedente, alvus aquosa multa bile permixta transmittens allevationem adfert, deindè verò cibos averfantur & sudoribus diffluunt, cum benè coloratâ facie ac humescente alvo, & dolor aliquis oris ventriculi succedit, ii, diutiùs morbum trahentes, pulmonum vitiis laborantium more, intereunt. Sent. 67. Coac.

IN febribus, ex glandularum tumoribus, dolores, morbi diuturnitatem prænuntiant. Sent. 73. Coac.

JUDICATIONIS cessationes in febribus, temporis quidè longinquitatem, non tamèn perniciem inducunt. Sent. 74. Coac.

Ex vehementibus doloribus, abortæ febres, diuturnæ. Sent. 75. Coac.

QUI, accessione correpti, po- Sent. 78. Coac.

stero die, graviùs habent, iis, malum denuntiatur.

Sent. **Q**U I B U S, tertio die subsistit
79. accessio, & quarto ingravescit,
Coac. malum denuntiatur. Ac metus
est, ne hujus modi accessiones,
phrenisim inducant.

Sent. **F**EBRES, si alio die, quàm judi-
80. catorio desierint, recidivam me-
Coac. tuere oportet.

Sent. **Q**U I, circa initia tenuitèr fe-
81. bricitantes, ad judicationem
Coac. cum capitis pulsatione & urinâ
tenui ingravescent, eos mentis
emotione ac insuper pervigilio
corripì, nihil mirandum est.

Sent. **I**N anhelatoribus & suspiriosis
107. febris postea acuta, cum præ-
Coac. cordiorum contentione, perfrige-
ratis, magnum circa aures tu-
morem, expectare oportet.

Sent. **I**N pueris, febris acuta cum al-
109. vi suppressione & pervigilio,
Coac. calces velut jactare, ac colorem
mutare & ruborem contrahere,
convulsionem minatur.

Sent. **A**T verò qui per accessiones
112. tussunt & tenuitèr exsudent, ii,
Coac. malignè habere judicandi sunt.

FEBRES assiduæ, quæ tertio quoque die intenduntur, in periculum ducunt.

Sent.
116.
Coac.

Si, quibus aliquandò, febris intermiserit, periculum abesse significat.

Sent.
117.
Coac.

IN febribus longis, aut tubercula, aut ad articulos dolores proveniunt, nequè tamèn temerè fieri existimandum est.

Sent.
118.
Coac.

FEBRES Lipyriæ, nonnisi per *cholera*m effusâ bile, solvuntur.

Sent.
120.
Coac.

QUI, in febribus tertianis ingravescent dolores, tertianarum naturam assumunt, & sanguinis grumos per secessum egerunt.

Sent.
123.
Coac.

IN febribus, venæ, quæ est in cervice pulsatio & dolor, rem ad intestinorum difficultatem deducet.

Sent.
124.
Coac.

SI venæ temporum in febribus pulset, & facies benè habitata fuerit, absquè præcordiorum mollitie, longum fore morbum sperare oportet, qui, nec finè liberali sanguinis ex naribus profusione, aut singultu, aut convulsione, aut coxendicum dolore, desinet.

Sent.
128.
Coac.

ALVUS, in febre ardente affa-

Sent.
129.
Coac.

tum prorumpens, mortis periculum adfert.

Sent. FEBRIS ardens, ex laborioso
130. ventris dolore, perniciem minatur.
Coac.

Sent. IN febre ardente laborantibus,
131. si aurium sonitus cum visus hebetudine & ad nares gravitate, accedant, nisi sanguis ex naribus profluat, furiosa & vehemens mentis emotio, metuenda est.
Coac.

Sent. IN febribus ardentibus, tremores, delirio solvuntur.
132. Coac.

Sent. IN febre ardente laborantibus
134. cum aliquâ summi corporis perfrictione, egestionibus aquæ
Coac. similibus & crebris oculis, periculum intenditur, tum verò præcipuè, si alto stupore (quem *Catochum* vocant) detineantur.

Sent. FEBREM ardentem, succedens
135. rigor, solvit.

Coac. FEBRES ardentes, quæ recurrere solent, quatuor diebus de se significationem exhibent, deinde exsudant. Sin minùs, die septimo & undecimo.

Sent. DE febre ardente laborantibus,
137. dies quatuor-decim, aut allevando, aut perimendo, decernunt.
Coac.

Ex febre ardente, nisi, qui circa aurem fit, abscessus suppuret, non admodum liberantur.

Sent.
138.
Coac.

Quos febris detinet, cum faciei rubore & capitis vehementi dolore, in iis, si venæ pulsent, sanguinis fluxus plerumque expectandus est. Quos verò stomachi fastidia vexant, cum oris ventriculi morfu, & crebrâ sputatione, iis, vomitio ad futura est. Quibus autem ructus adfunt, flatus, ventris sonitus cum inflatione, iis, alvus exturbatur.

Sent.
142.
Coac.

Quibus, febris assidua diutius cum securitate trahitur, si nequè ex dolore, nequè ex inflammatione, nequè ex aliâ ullâ manifestâ causâ contingat, in iis, abscessum cum dolore & tumore, præcipuèque ad inferiores partes, sperare oportet. Maximè autem in his, expectare abscessus oportet, qui trigessimum annum superârunt. Tum verò in his, considerandi sunt abscessus, ubi febris vigesimum diem præterierit. Majoribus autem natu, minùs accidunt, etsi febres longo tempore detinent. Quæ verò febres inter-

Sent.
143.
Coac.

mittunt, incertoque ac vago ordineprehendunt, eæ, autumnopræcipuè, in quartanam ferè transeunt, idquè in his maximè, qui trigesimum annum superârunt. Per hyemem verò, abscessus potius accidunt, & tardiùs cessant, minusquè recurrunt.

Sent. QUÆCUMQUE febres ex adverso respondēt, nisi abcessum faciant, malignitatem denuntiant.
145.
Coac.

Sent. FEBRES, quæ nequè diebus criticis, nequè post apparentes solutionis notas dimittunt, repetere solent.
146.
Coac.

Sent. FEBRICITARE incipientibus, sanguinis stillationes cùm sternutatione accedentes, & quod in urinam desidet album quotidie visum, septimo solutionem afferre, denuntiant.
149.
Coac.

Sent. QUI, per febres tenuitèr exsulant cùm capitis dolore, & alvo interceptâ, ad convulsiones proni sunt.
154.
Coac.

Sent. QUI, per febres intermittentes, inæqualitèr incalescentes, alvum habent flatibus distentam, pauca transmittentem, iis, post judicationem, lumborum dolore subor-

to, alvi prorumpunt. Qui autem, ad manus contactum, exardescunt, torpore, siti ac corporis incontinenti jactatione vexantur, ii, alvo interceptâ, gravati exolvuntur, interdum verò etiâ prærubra in pedibus ambusta eadem denuntiant.

HYBERNÆ quartanæ, ferè in morbos acutos transeunt.

IN febre acutâ, continens capitis dolor, cum gravibus aliis signis, mortem minatur. Quod si, nequè alia prætereà signa mala sunt, & viginti dies superat, aut sanguinis ex naribus, aut puris effluxum, aut abscessus ad inferiores corporis partes denuntiat; præcipuè quidè in his, qui nondum trigesimum quintum annum attigerunt, fluxiones; in senioribus autem abscessus sperare convenit. Si verò, dolor vehemens circa frontem ac tempora affligat, fluxiones expectandæ sunt.

Ex præcipitibus morbis, in febribus ardentibus maximè, tubercula ad aures exoriuntur, ac nisi judicatoriè solvantur & maturefcant, aut sanguis ex naribus pro-

Sent.

159.

Coac.

Sent.

160.

Coac.

Sent.

207.

Coac.

fluxerit, aut crassum sedimentum urina acceperit, ægros interimunt. Priùs verò, hujusmodi tumores subsidunt ac conquiescunt. Sed & insupèr febres ipsas in considerationem adhibere convenit, nùm intendantur? aut remittant? atquè ità de totà re, sententiam ferre.

Sent. Qui, in febribus ad tactum nullum ardoris sensum præ se ferunt, 228. phrenitici fiunt, idquè magis, si Coac. sanguis fluxerit.

Sent. IN febre, cum sudore, vocis ex 253. capitis dolore defectiones, si per Coac. se resolvuntur ægri, ac præter voluntatem excrementa demittantur, malumque remitti videatur; diuturni morbi metus est. In his, subindè obortus rigor, damnari non debet.

Sent. FEBRES acutas, cum mentis 550. perturbatione, in oris ventriculi Coac. dolore non bilioso, insania solvit.

Sent. QUIBUS, ex rigore febris cum 555. lassitudinis sensu adest, in his, Coac. muliebrium profluvium expectare oportet. Quod si cervicis dolor prehenderit, sanguinis è na-

F **III**

ribus eruptionem fore, spes est.

FEBRES, quæ soporem lassitudi- Sent.
nemve inducunt, aut in quibus 74.
caligant ægri, insomniâ ac tenui- Præd.
bus sudoribus vexantur, mali- lib. I.
gnæ sunt.

IN febribus ardentibus, cùm Sent.
aliquâ summi corporis perfri- 81.
ctione, ac egestionibus, aquæ si- Præd.
milibus, & crebris, oculorum lib. I.
perversio & distortio, malum si-
gnificat, tum verò præcipuè, si
alto quodam stupore (quem *Cato-
rchum* vocant) deprehensi deti-
neantur.

FEBRIBUS & lassitudinis sensu Sent.
detento, cùm oculorum perversi- 89.
sione, rigor perniciem minatur. Præd.
Atque in hujusmodi casibus sopori- lib. I.
rati, malum denuntiant.

QUIBUS, cùm febribus voces Sent.
post judicationem deficiunt, ii, 91.
tremore & sopore correpti, inte- lib. I.
reunt. Præd.

FEBRICITANTI, cùm sudore Sent.
sputa defluentia levia sunt & mi- 122.
nimè maligna. In quibus viden- lib. I.
dum, nùm ad aliquot dies alvi Præd.
madescant? quod equidè reor.
Animadvertendum quoquè est,

nùm his, ad articulos aliquid abscessurum speres?

Præn. QUIBUS, febres cessant, nequẽ
p. 45. apparentibus solutionis signis,
& 46. neque diebus judicatoriis, iis,
recidiva expectanda est. In longã
febre, salutaritèr tamèn, affecto
ægro, si, nequẽ ob inflammatio-
nem aliquam, nequẽ ob ullam
aliam evidentem occasionem, do-
lor detinet, in hoc, abscessus cum
tumore aut dolore, ad articulum
expectandus, maximèque in in-
ferioribus locis. Magis tamen &
breviori tempore hujusmodi abs-
cessus contingere solent iis, qui
trigesimum annum attigerunt. At
statim in considerationem adhi-
benda sunt, quæ ad abscessum spe-
ctant, si ultrà vigesimum diem
febris detinet, quæ tamèn per
longiores febres, senioribus mi-
nùs contingunt. Hujusmodi au-
tèm abscessum expectare conve-
nit, si febris continua fuerit, in
quartanam verò firmari debere;
ubi intermiserit, & errabundum
in modum prehenderit, & ità ad
autumnum deducatur. Ut verò
abscessus oriuntur in his, qui tri-

ginta annis minores sunt , ita quartanæ potius annum agentibus trigefimum , aut senioribus. Scire autem convenit abscessus hyeme magis contingere , & tardius desinere & minus intrò recurrere. Si quis, in febre non lethali dixerit caput dolere, aut tenebricosum quiddam antè oculos observari , si etiàm oris ventriculi morsus accesserit , biliosa vomitio, aderit. Quod si quoquè rigor subortus fuerit & inferiores præcordiorum partes frigidas habuerit, adhuc citius vomitio aderit. Si verò, sub id tempus biberit quidpiam aut ederit, id quam celerrimè evomitur. Inter hos autem , quibus primo die dolor cœpit , ii, quarto & quinto die potissimùm affliguntur , at septimo liberantur. Quin etiàm, eorum plerique tertio die dolore vexari incipiunt , conflictantur autem maxime quinto, verùm nono aut undecimo periculo defunguntur. Qui verò quinto die dolore affligi cœperint , & reliqua pro ratione prioribus respondeant , ad decimum-quartum diem judica-

itur morbus. Ista autem viris quidem & mulieribus, in tertianis præcipuè contingunt. Junioribus verò, cum in iis ipsis, tum etiam magis in febribus per assiduis & legitimis tertianis. At quibus per huiusmodi febrem caput dolet, & pro tenebris antè oculos apparentibus visus hebetudo contingit, vibrantesque splendores observati videntur, & pro oris ventriculi morfu, in præcordiis dextrâ, aut sinistrâ parte contentio quædam, nequè cum dolore, nequè inflammatione suboritur, iis, pro vomitu sanguinem è naribus profluxurum, expectandum est. Potius tamen & eo casu in juvenibus, sanguinis fluorem expectato. Iis verò, qui trigesimum annum attingunt, & senioribus minùs, sed in his vomitiones expectabis. Pueris convulsiones accidunt. Si febris acuta fuerit venter non dejiciat, si vigilant, perterreantur, plorent assiduè, & color immutetur, & ex viridi pallidi, aut lividi, aut rubor contrahatur; hæc autem pueris quidè recens natis ad septimum

usquè annum promptissimè eveniunt. At grandiores pueri & viri non adeò per febres convulsionibusprehenduntur, nisi vehementissimum & pessimum quoddam signum, ex his quæ in phrenitide fieri solent, affuerit. Morituros autèm & superfuturos tum pueros tum alios, ex omnibus signis conjicies, velut in singulis singula descripta sunt. Atquè hæc à me & de morbis acutis, & de his qui ab iis oriuntur dicuntur. Qui verò, superfuturos ex morbo, & morituros, eosque quibus pluribus diebus, & quibus paucioribus perseverabit morbus, rectè prægnosceret vellet. Is intelligentia comprehensam omnium signorum doctrinam æstimare debet, & eorum vires inter se collatas ratione expendere, velut scriptum est, cum in aliis, tum in urinis & sputis, ubi unà & pus & bilis tussirejecta fuerint. Quin etiàm morborum semper vulgaritèr grassantium impetum, & tempestatis conditionem, citò animo concipere oportet.

Cels. N U L L A acuta febris, levitèr
l. 2. c. 4. terrere nos debet.

Cels. Q U A R T A N A, æstiva brevis; au-
l. 2. c. 8. tumnalis ferè longa est, maximè
quæ cœpit, hyeme appropin-
quante.

Cels. F E R E' graviolem accessionem
l. 3. c. 5. levior nox sequitur, quò fit, ut
graviolem accessionem nox quo-
que tristior antecedit.

Cels. C I B U S febricitantibus humidus
l. 3. c. 6. est aptissimus, aut humori certè
quàm proximus: utique ex ma-
teriâ quam levissimâ; maximè-
que sorbitio, eaque si magnæ fe-
bres fuerunt, quam tenuissima
esse debet.

Cels. I N febre pestilente minimè
l. 3. c. 7. utile est aut fame aut medica-
mentis uti aut ducere alvum. Si
vires sinunt, sanguinem mittere
optimum est, præcipuèque si
cum dolore febris est.

Cels. Q U A R T A N A neminem jugu-
l. 3. c. 15. lat; sed si ex eâ, facta quotidiana
est, in malis æger est. Quod ta-
mèn nisi culpâ, vel ægri vel curan-
tis, nunquam fit.

Cels. V E T U S quartana, rarè nisi verè,
l. 3. c. 16. solvitur.

Si quartana quievit, diu meminisse ejus diei convenit, eo-
 què vitare frigus, calorem, cru-
 ditatem, lassitudinem, facile
 enim revertitur nisi à sano quo-
 què aliquandiù timetur.

PERNICIOSA febris est quæ, vel
 levi vulnere supervenit; vel ultra
 tempus inflammationis durat,
 vel delirium movet, vel si ner-
 vorum rigorem aut distentio-
 nem, quæ ex vulnere orta est,
 ea non finit.

Vide CRISIM. CONVULSIONEM. LUMBORUM DOLORES ET PRÆCORDIORUM. EXCREMENTA. HÆMORRAGIAM. HYPOCONDRIA. TUBERCULA.

FISTULA.

Ex fistulis, maximè molestiam
 adferunt, quæ in cartilaginosis
 aut carne vacuis locis fieri solent,
 cavæ sunt & longiùs excurrunt,
 assiduèque sanie manant, & in
 quarum osculo, caruncula inest.
 Faciliùs autèm curantur, quæ in
 mollibus & carnosus locis, &
 non nervosis oriuntur.

Senta
 §II.
 Coac.

M.

F L A T U S.

Sent. FLATUM verò absquè crepitûs
 495. sono emitti, inter optima signa
 Coac. est. Præstat tamèn cùm strepitu
 prodire, quàm illic resolvi:
 quamquàm hoc pacto prodiens,
 dolorem & delirium denuntiat,
 nisi suâ sponte id æger fecerit &
 flatum emisericit.

Vide EXCREMENYA.

F L U X I O.

Sent. IN uterum gerentibus falsugi-
 537. nosæ ad fauces fluxiones, malum
 Coac. denuntiant.

F R I G I D U M.

Sent. CAPUT, pedes & manus fri-
 492. gidas esse, ventre & lateribus
 Coac. calentibus, mali morbi signum
 est. Optimum verò totum cor-
 pus æquè calidum & molle esse.

Sent. SI per sanitatem, hyemis tem-
 487. pore, lumborum frigiditas & gra-
 Coac. vitas levi occasione orta sit, & al-
 vi suppressio, superiore ventre

probè officio suo fungente , co-
xendicum , vel renum dolor , aut
urinæ stillatio fortè expectanda.

IN acutis morbis extremorum Aph. 1.
refrigeratio , mala. Sect. 7.

FRIGIDUM verò convulsiones , Aph. 17.
nervorum distentiones , denigra- Sect. 5.
tiones , & rigores febriles , affert.

FRIGIDUM ossibus adversum , Aph. 18.
dentibus , nervis , cerebro , dor- Sect. 5.
sali medullæ. Calidum verò uti-
le.

PERFRIGERATA excalefacere Aph. 19.
oportet , præter ea quæ sangui- Sect. 5.
nem effundunt , aut brevi effun-
dent.

FRIGIDUM ulcera mordet , cu- Aph. 20.
tem obdurat , dolorem insupera- Sect. 5.
bilem facit , denigrationes , ri-
gores febriles , convulsiones ,
nervorum distentiones.

FRIGIDA veluti nix & glacies Aph. 24.
pectori sunt adversa , tussis mo- Sect. 5.
vent , sanguinis eruptiones & de-
stillationes efficiunt.

Vide CALOREM. CALIDUM
ET FRIGIDUM. AQUAM.



G E N E R A N D I I M P O T E N T I A .

Aph. 61. **Q**UÆ frigidos & densos ha-
Sect. 5. bent uteros non concipiunt;
nequè quæ præhumidos habent;
si quidem in ipsis genitura extin-
guitur. Et quæ plus æquo siccas
& adurentes, alimenti namquè
inopiâ semen corrumpitur. At
quæ ex utrisque moderatam na-
ctæ sunt temperiem, ex fecun-
dæ evadunt.

Aph. 63. **E**ADEM verò ratio est in ma-
Sect. 5. ribus, aut enim proptèr corporis
raritatem spiritus foràs dissipat-
tur, ità ut ne semen transmittat,
aut proptèr densitatem humor
foràs non excernitur, aut ob
frigidityatem non accenditur, ut
ad eum locum cogatur, aut ob
caliditatem hoc idem contingit.

G I B B I .

Aph. 46. **Q**UI gibbosi ex anhelatione
Sect. 6. & tussi fiunt, antè pubertatem
moriuntur.

GINGIVÆ.

SANGUIS ex gingivis cùm humectâ alvo profluens, perniciem minatur. Sent.
241.
Coac.

Vide EXCREMENTUM.

GRAVIDA.

UTERUM gerentibus, præcordiorum dolor, malum denuntiat, hîc etiâ alvi euntes & rigore subindè corripî, malo est. Sent.
523.
Coac.
Ventris dolor, si limosa expurget, in hujusmodi levius malum indicat. Quæ ex his faciles partus habent, eæ, postea vehementer anguntur.

QUIBUS prægnantibus, tabi opportunis, faciei rubor exoritur, hunc stillationes è naribus averunt. Sent.
524.
Coac.

PRÆGNANTIBUS, fluxiones eum serpentibus oris ulceribus, malo sunt. Hæ, convulsionibus, exolutionibus, postea perfrictionibus tentatæ, celeriter calefunt. Quin etiâ prægnantibus molestiam exhibent, qui circa tenues

intestinum contingunt tumores, quales circa extremas uteri osculorum, in erectæ cervicis spirationis difficultate detentis, eveniunt. Quin etiâ fortassis hujusmodi tumores gemellorum partum prænuntiant, aut fortè convulsiones, tumores hujusmodi indicant.

Vide CONCIPERE. PRÆGNANTEM. DOLORES CAPITIS. FLUXIONES.

GRAVITAS.

Sent.
493.
Coac.

ÆGRUM, quoquè facile converti oportet. & dùm surgit levem esse. At gravitas quæ totum corpus, vel manus ac pedes premit, vitiosa est. Quòd si, cùm gravitate digiti quoquè ac ungues lividi fiant, in propinquo mors est. At si omninò nigrescant, minùs quàm liventes periculum portendunt. Verùm tunc reliqua consideranda sunt. Etenim si facilè morbum sustinet æger, & aliud quiddam ex

iis quæ securitatem pollicentur ,
se prodit , morbus in abscessum
vergit , & denigratæ corporis
partes decidunt.

Vide. JACERE,



HÆMORRAGIA.

Aph. 25. **S**ANGUIS, suprà quidem,
Sect. 4. qualiscumque fuerit emissus,
malus, infrà autem, si niger de-
jiciatur, bonus.

Aph. 27. **Q**UIBUS, per febres sanguinis
Sect. 4. copia undècumque profluxerit,
iis, cùm reficiuntur alvi humi-
diores evadunt.

Aph. 33. **M**ULIERI, menstruis deficien-
Sect. 5. tibus, sanguis ex naribus pro-
fluens, bono est.

Aph. 21. **E**x vehementi & conspicuo
Sect. 7. in ulceribus arteriarum percussu,
sanguinis eruptio.

Sent. **Q**UI, statim sine ratione pertur-
87. bantur, pervigiles sunt, sangui-
Coac. nem è naribus stillantes, sexto-
die noctû allevantur, postridie
verò laborantes tenui sudore cor-
repti, & in somnum delati deli-
rant, iis, larga sanguinis è nari-
bus profusio, morbum solvit.
Cujus rei indicio est, diluta urina.

Sent. **Q**UI, insomniâ vexantur cùm
III. subitâ corporis jactatione & in-
Coac. quietudine, iis, sanguinem è na-
ribus erupturum sperare oportet,
idquè

idquè præsertim, si quid antea profluxerit. Animadvertendum verò, nùm in modicè perfrigeratis, id pòst horroris sensum contingat?

SANGUINIS ex naribus fluxus, in febre ardente, quarto die obveniens, malo est, nisi aliud quidpiàm benè ceciderit. Quod si die quinto contingat, minùs affert periculi. Sent. 133. Coac.

QUIBUS, per febres alicundè sanguis largitèr effluxerit, iis, dum sese recolligunt, alvi humescentes effunduntur. Sent. 153. Coac.

Ex sanguinis eruptionibus, vehementes, die judicatorio, obvenientes perfrictiones, pessimæ. Sent. 326. Coac.

QUI, ex vulnere subindè rigentes, sanguinem profundunt, ii malignè habent, àc interloquendum derepentè moriuntur. Sent. 328. Coac.

QUIBUS, quinto die, liberales sanguinis profusiones contingunt, & sexto, novo oborto rigore corripuntur, septimo perfrictionibus tentati celeritèr recalescunt, iis, alvi malè afficiuntur. Sent. 329. Coac.

IN præcipiti malo, quæ, pòst N Sent. 331. Coac.

sanguinis eruptiones & nigro-
rum per alvum refusiones, surdi-
tas obvenit, malum denunciat. In
his sanguinis egestio perniciem
affert, surditas autem solvit.

Sent. QUIBUS, sanguinis eruptiones,
332.
Coac. diù perseverant, in iis, temporis
progressu, alvus malè afficitur,
nisi urina concocta prodierit. Ac-
fortassis talè aliquid diluta urina
denunciat.

Sent. QUIBUS, cum surditate & tor-
334.
Coac. pore, paucus è naribus sanguis
stillat, nonnihil molestiæ exhi-
bet, iis, vomitus & alvi perturba-
tio confert.

Sent. QUÆ magnæ sunt, in principiis,
335.
Coac. sanguinis eruptiones, dùm agri
vires recolligunt, alvos effun-
dunt.

Sent. LARGÆ sanguinis ex naribus
336.
Coac. eruptiones per vim suppressæ,
interdum convulsiones accer-
sunt, undè liberat venæ sectio.

Sent. SANGUINIS ex naribus stilla-
337.
Coac. tiones, quæ undecimo die contin-
gunt, molestiam afferunt, tùm
verò præsertim si bis sanguis stil-
lârit, aut rursus nares stillare cœ-
perint.

IN copiosâ sanguinis fluxione, Sent.
aut singultus, aut convulsio, ma- 338.
lum denunciant. Coac.

DIUTURNIS in morbis, parvæ Sent.
apparentes sanguinis ex naribus 340.
fluxiones, perniciem ostentant. Coac.

UBI sanguis ex naribus effluit, Sent.
totius corporis perfriectio cum te- 342.
nuibus sudoribus, morbi mali- Coac.
gnitatem denunciat.

QUI, suppressâ alvo, sanguinem Sent.
ex naribus fundunt, & unâ cum 344.
sanguinis profluvio subindè ri- Coac.
gent, iis alvus, intestinorum læ-
vitate, laborat & obdurefcit, aut
tenuēs lumbrici (*Ascarides* dicti)
infestant, aut utrumque.

QUÆ, ex parte adversâ & præ- Sent.
posterè, fiunt sanguinis eruptio- 125.
nes, malo sunt, velût in lienis lib. 1.
tumore, si ex nare dextrâ effluat. Præd.
Quod & circa præcordia eodem
modo se habere, expectandum est.
Majus autem malum denuncia-
tur, si cum tenui circâ frontem
& thoracem sudore istud con-
tingat.

UBI sanguis ex naribus effluit, Sent.
cum tenuibus sudoribus & cor- 126.
poris totiûs perfriectio, morbi lib. 1.
Præd.

132. **H**
malignitas & pernicies denun-
ciatur.

Sent. A sanguinis eruptione, nigra-
127. rum dejectionum pertransitus,
lib. 1. malo est. Quin & prærubra dam-
Præd. no sunt, præcipuè verò si sangui-
nis ista eruptio quarto die con-
tingat, quod animadvertendum
est. Quibus ista contingunt, iiii
tandem sopore & convulsione
tentati moriuntur, ac fortè præ-
gressis nigris dejectionibus &
ventre in tumorem sublato.

Sent. In præcipitibus malis, quæ
129. post paucam sanguinis eruptio-
lib. 1. nem, aut nigrorum per alvum
Præd. refusionem surditas obvenit, ma-
lum denunciat. In his sanguinis
egestio perniciem affert, surdi-
tatem tamèn discutit.

Sent. Qui, statis temporibus, sangui-
131. nem fundunt, si siticulosi sint,
lib. 1. molestiam ac virium exolutio-
Præd. nem sentiant, nec sanguinem ef-
fuderint, in morbum comitiale
transeunt.

Sent. Qui statim, sine ratione, pertur-
132. bantur, pervigiles sunt, sangui-
lib. 1. nem è naribus stillant, sexto die
Præd. allevantur, noctu laborant, ac

postridiè tenui sudore correpti
& in somnum delati delirant, iis,
largam sanguinis è naribus flu-
xionem affore, spes est. Ac fortè
etiàm tale quid diluta urina signi-
ficat.

QUIBUS, sanguinis fluxus diu Sent.
perseveravit, in his, temporis 133.
processu, alvus malè habet, nisi lib. 1.
urinæ concoctionem præ se fe- Præd.
rant.

SANGUINIS eruptiones vehe- Sent.
mentes cum totiùs corporis per- 134.
frictionibus judicatoriis, pessimæ lib. 1.
sunt. Præd.

QUI, capite gravati, ad synci- Sent.
put dolorem sentiunt, pervigilio 235.
torquentur, iis, sanguinis eru- lib. 1.
ptionem fore, spes est, tum verò Præd.
præsertim, si aliquid tensionis sen-
sus in cervice apparet.

QUI, suppressâ alvo sanguinem Sent.
ex naribus fundunt, aut novo 138.
subindè oborto rigore corripium- lib. 1.
tur, iis fortassè alvus, intestino- Præd.
rum lævitate laborat & obdure-
cit, aut tenues lumbrici (*Ascari-*
des dicti) infestant, aut utrum- Sent.
què. 140.

QUIBUS, ex frequentî & largâ lib. 1.
N iij Præd.

sanguinis eruptione, nigrorum
recrementorum copiosa fit de-
jectio, cum alvi contentione, aut
suppressione & dolore, ii sangui-
nem profundunt, cum aliquâ
verò fluxione benè habent. Ac
fortè his frigidos, crebros, te-
nues sudores emittunt. In his, re-
turbida urina, mala non est, ne-
que quod in eâ subsidet genitali
semini simile. Crebrò autèm di-
lutas urinas reddunt.

Sent. QUIBUS, pauca sanguinis è na-
141. ribus stillatio, cum surditate &
lib. I. torpore obveniens, molestiam
Præd. quamdam exhibet, iis, vomitio
& alvi perturbatio, confert.

Sent. QUIN etiâ sanguinis ex nari-
143. bus eruptionem sperare oportet
lib. I. in his, quæ caput concutiunt, &
Præd. aurium sonitus excitant, aut mu-
liebria deturbatum iri spes est,
idquè præsertim, si ad spinam ar-
dor sentiatur. Fortassis autèm &
intestinorum difficultas expe-
ctanda est.

Sent. LARGA, vehemens & multa
145. sanguinis è naribus eruptio, in-
lib. I. terdum ad convulsiones dedu-
Præd. cit, ex quo venæ sectio liberat.

SANGUINIS è naribus stillationes, quæ undecimo die contingunt, molestiam exhibent, tum verò præcipuè, si denuo nares stillare cœperint.

Sent.

148.

lib. 1.

Præd.

LIBERALIUM ab initio sanguinis eruptionum cursum, rigor sistit.

Sent.

150.

lib. 1.

Præd.

QUIBUS, fauces sanguine frequentè & noctu & interdiu replentur, dum nequè capitis dolor prægressus fuerit, nequè tussis, nequè vomitus, nequè febris prehenderit, nequè pectoris aut dorsi dolor tenuerit, in his nares & fauces inspiciendæ, num quod ulcus eo in loco, aut hirudo compareat?

Præd.

lib. 2.

p. 101.

Vide ALVUM. CRISIM. DESIPIENTIAM. DOLOREM CAPITIS & LUMBORUM. EXCREMENTA. FEBRES.

HÆMORRHOIDES.

MELANCHOLICIS affectibus Aph. 11. & renum vitiis, succedentes hæmorrhoides, bono sunt.

Sect. 6.

DIUTURNUM sanguinis profluvium per ora venarum, quæ in

Aph. 12.

Sect. 6.

ano sunt, curanti, nisi una fervetur, periculum est nè aqua inter cutem, aut tabes succedat.

Cels. 1. In quibusdam, hæmorrhoides
6. c. 18. parùm tutò supprimuntur, qui sanguinis profluvio imbecilliores non fiunt; habent enim purgationem hanc, non morbum.

Vide COLOREM. HYDROPEM. MELANCHOLIAM. SOPOREM.

HERPES.

Vide ÆTATEM.

HORROR.

Aph. 4. Ex sudore horror, minimè bonus.
Sect. 7.

Aph. 56. ANXIETUDINEM, oscitationem, horrorem, vinum æquali aquâ temperatum epotum, solvit.
Sect. 7.

Sent. 8. CREBRI ex dorso horrores,
Coac. subindè locum commutantes, graves sunt & difficiles. Laboriosam quippè urinæ suppressionem minantur. Iis tenuitèr exudare pessimum.

Sent. 12. QUI subindè inhorrescunt, ex
Coac.

capite laborantes, tenuitèr exudantes, ii malignè habent.

QUI subindè inhorrescunt, sæpè tenui sudore corripuntur, difficili morbo laborant. Sent. 13. Coac.

QUI, per sanitatem, crebrò inhorrescunt, ii, ex sanguinis fluxu, purulenti evadunt. Sent. 16. Coac.

UBI horror in malis subindè incidit, cum difficultate spirandi, tabes denūciatur. Sent. 17. Coac.

QUI subindè inhorrescunt, ac incontinenti corporis jactatione, cum lassitudinis sensu & lumborum dolore conflictantur, iis alvi effunduntur. Sent. 19. Coac.

QUIBUS ubi inhorruerint, iudicatorii simul sudores, contingunt, postridiè verò si horror repetierit & temerè pervigilent, iis, fortè sanguinem erupturum sperare oportet. Sent. 24. Coac.

IN crebris & tenuibus ex dorso horroribus, tenuitèr exudantes ægri, molestè habent. Laboriosa quippè urinæ interceptio significatur. In his tenuitèr exudare, malo est. Sent. 46. Coac.

HORRORIS & lassitudinis sensus, capitis gravitas cum cervicis Sent. 548. Coac.

dolore, muliebres purgationes deji-
ciant. Quòd si quid hujusmo-
di circà judicationem cum tussi-
culâ contingat, subindè rigo-
rem adfert.

Vide FEBRES. LASSITUDINEM.

H U M E R I.

Vide DOLORES HUMERORUM.

H U M I D A C O R P O R A.

Aph. 59. C O R P O R I B U S humidâ carne
Sect. 7. præditis, famem inducere conve-
nit, fames siquidè corpora ex-
siccat.

H Y D R O P S.

Aph. 14. A Q U A intèr cutem detento,
Sect. 6. ubi aqua ex venis, in ventrem
confluxerit, morbus solvitur.

Aph. 27. Q U I, pus thorace colligunt,
Sect. 6. aut aquâ intèr cutem laborant,
si uruntur aut secantur, & pus
aut aqua confertim effluxerit,
omninò intereunt.

Aph. 29. L E U C O P H L E G M A T I A vexato,
Sect. 7. si vehemens alvi profluvium suc-
cedat, morbum solvit.

AQUA inter cutem laborantem Aph.4,
 si tuſſis detineat, deſperatus eſt. Sect. 7.

QUIBUS jecur aquâ plenum in Aph.55.
 omentum erupuerit, iis venter Sect.7.
 aquâ impletur, & moriuntur.

ALBÆ pituitæ, aqua inter cu- Aph.76.
 tem ſuccedit. Sect. 7.

AQUA inter cutem quæ ex acu- Sent.
 to morbo cœpit, moleſtiam ac 452.
 perniciem affert. Oritur verò fe- Coac.
 rè & à laterum inanitate, vel à
 jecore. Sed ubi à laterum inanita-
 te ortum contraxit, pedum tu-
 mor, & alvi diuturnus fluor con-
 ſequitur, qui nequè lumborum
 aut ileorum tumorem ſolvit. At
 quibus è jecore intèr cutem
 proficiſcitur, ii prompte etiàm
 tuſſi vexantur, pedes intumeſ-
 cunt, & alvus nonniſi dura &
 ægrè reddit, tumoresquè modò
 dextrâ, modò ſiniſtrâ parte ven-
 tris oriuntur, ac rursùs deſinunt.

IN hydrope ſicco urina ſtilla- Sent.
 tim effluens, malum denuntiat. 453.
 Mala quoquè eſt, quæ exigua ha- Coac.
 bet ſedimenta.

HYDROPICIS, ſuccedentes Sent.
 morbi comitalis offenſiones, per- 454.
 niciem afferunt, pravis invicem Coac.

succedentibus signis , & alvos humectant.

Sent. 456. AQUA intèr cutem laboranti, cum febre , urina pauca & conturbata , perniciem denotat.

Sent. 457. AQUÆ intèr cutem initio aquosum alvi profluvium absquè crudelitate exortum , morbum solvit.

Sent. 458. Ubi hydrops ficcus, de se significationem præbet ; tormina ad tenue intestinum incumbencia , malum denunciant.

Sent. 460. AQUA intèr cutem, quæ curationi cessit , ubi recurrit , spem tollit.

Sent. 461. AQUA intèr cutem laboranti, aquâ, quæ in venis est, ad alvum erumpente , solvitur morbus.

Sent. 481. Quos , ex aliquâ ægritudine , hydrops circumvenit , iis alvi reficcata caprinis stercoreibus similia dejectiunt , cum mucosâ eliquatione, nequè laudabili urinâ , præcordiorum autem distensiones , ventris dolores ac tumores, & circa laterum inanitates ac spinæ musculos dolores incidunt. Febres quoquè , sitis & tusses siccae comitantur & ad motio-

nes spirandi molestia & crurum gravitas. Cibos etiàm averfantur, paucisque sumptis explentur.

AQUÆ inter cutem vitio (cui *leucophlegmatia* nomen est) laborantes, alvi profluvium sedat. Animi abjectiones cum silentio, & ab hominibus solitudines, ferè eos interficiunt.

Sent.
482.
Coac.

QUI, aquâ inter cutem detentus est, & servari volet, cum robustis visceribus & contentis viribus esse convenit, simulque suaptè naturâ facilè concoquere, ac benè spirare, sinè dolore esse, totumque corpus æqualiter calere, nequè extremis partibus esse colliquefactum. Præstat namquè potius extrema tumefacta esse, & si optimum est, nihil horum adesse. Verùm tùm mollia, tùm gracilia extrema esse oportet, ventrem contactu mollem. At nequè tussim nequè sitim esse convenit, nequè linguam cum aliàs, tùm ne à somno quidèm, quod admodum fieri assolet, inarescere. Cibos autèm suaviter assumere, ac ubi

Præd. I.
2. p. 89.

quis abundè comederit, nihil affligi; ventrem quoquè medicamentis quidè celeritè moveri, aliàs verò mollia & figurata excernere. Urinam in transitu, pro institutâ victûs ratione & vinorum mutatione, mutationem sentire. Atque sic quidè in totum hominem se gerere optimum, ut quam securissimè convalescat. Sin minùs, horum ut plurima habeat. Sic enim spem fore ut evadat. In quo verò, nihil horum inest, sed contraria subsequuntur, in eo, spem tolli animadvertendum est. Et cui ex his quæ in aquâ inter cutem laborante probavimus, pauca affuerint, parùm relictum esse spei. At ne is cui multus sanguis suprà infrâque perripuerit, prætereâque febris accesserit, aquâ impleatur magnus metus est. Et hujus generis aqua intercûs brevissimi est temporis & inter inevitabiles numeranda, idque alteri denunciari oportet. Quibus autèm tumores magni suborti desinunt, rursûsque assurgunt, hi potiùs supersunt quam qui ex sanguinis

eruptione complentur. Fallunt
tamen agros huiusmodi hydro-
pes, cum eos relictis Medicis in
exitium præcipitent.

AQUA inter cutem quæ ex acu- Præn.
pag. 39.
tis morbis oritur, mala. Nam
nequè febre liberat, vehemen-
tesque dolores excitat, & letha-
lis est. Oritur autem ferè ex la-
terum inanitate, & lumbis, par-
tîmque ex jecore. Quibus igitur
ex laterum inanitate & lumbis,
initia ducuntur, iis pedes intum-
escunt, & longa alvi proflu-
via detinent, quæ nequè dolores
ex laterum inanitate ac lumbis
tollunt, nequè ventrem mollio-
rem efficiunt. A quibus à jecore
aqua inter cutem ortum ducit,
his tussis & tussendi cupiditas
inest, sed nihil effatu dignum ex-
puunt, pedesque intumescunt,
ac venter non nisi dura ægrèque
egerit & circà alvum tumores
non fiunt, qui partîm dextrâ, par-
tîm sinistrâ parte oriuntur & de-
finunt. Caput autem & manus &
pedes frigere, ventre & lateribus
calentibus, malum denunciat. At
corpus totum æqualitèr calidum

esse ac molle , optimum. *Ægrum* quoquè facile converti oportet, & cum sese attollit levem esse. Quod si gravis esse videatur, cum reliquo corpore tum manibus & pedibus , majori cum periculo est. Præter gravitatem verò , si ungues & digiti livescant , mors confestim expectanda est : at omninò nigri tum digiti , tum pedes, minùs quàm liventes perniciosi sunt. Sed alia quoquè signa in considerationem adhibenda. Et enim si facile malum ferre videatur , & præter hæc aliud quoddam ex salutaribus signis adfuerit , morbum ad abscessum converti sperandum , ita ut æger quidèm morbo superesse , & partes corporis denigratæ decidere debeant. Testes autèm & pudenda ubi fursùm contrahuntur , vehementes dolores & mortis periculum denunciant.

Cels. 1. 3. c. 21. *AQUÆ* intèr cutem tres species sunt : communis est humoris nimia abundantia , ob quam ne ulcera quidèm in his ægris facile sanescunt.

Cels. 1. 3. c. 21. *HYDROPICIS* alvum moliri cibo

bo, melius est, quàm medicamentis.

Non alienum erit metiri portionem hydropici & urinam, Cels. 1.3.c.21.
nam si plus humoris excernitur quam assumitur, ita demùm secundæ valetudinis spes est.

FACILIUS in servis, quàm in Cels. liberis tollitur, (*hydropisis*,) 1.3.c.21.
quìa cum desideret famem, sitim, & mille alia tædia, longamque patientiam, promptius iis succurritur qui facile coguntur, quàm quibus inutilis libertas est. Sed ne hi quidèm, qui sub alio sunt, si ex toto sibi temperare non possunt, ad salutem perduntur. Ideoque non ignobilis Medicus, *Chrisippi* discipulus, apud *Antigonum* Regem amicum quemdam ejus, notæ intemperantiæ, mediocritèr eo morbo implicitum, negavit posse sanari; eumque alter Medicus *Epirotes Philippus* se sanaturum polliceretur; respondit; illum ad morbum ægri respicere; se ad animum; nequè ad animum res fefellit. Ille enim cum summâ diligentia non Medici tantummodò, sed

Regis custodiretur, tamèn malagmata sua devorando, bibendoque suam urinam, in exitium se præcipitavit.

H Y E M S.

Aph. 17. FRIGIDUM verò convulsiones, nervorum distentiones, denigrationes, & rigores febriles efficit.

Vide TEMPUS.

H Y G I E I N E.

Aph. 3. SOMNUS, vigilia, utraq; Sect. 2. modum excedentia, malum denunciant.

Aph. 14. NEQUE satietas, neque fames, Sect. 2. neque aliud quicquam bonum, quod suprà naturæ modum fuerit.

Aph. 18. EORUM quæ universim & celeritè alunt, celeres quoquè excretiones esse solent.

Præd. QUOD autem attinet ad eos Lib. 2. qui exercitationibus & laboribus fatigantur, quæ quidem p. 84. & seq. pro certo asseverantur, ut asserunt qui ea narrant, nec esse putato, nequè si quis exstimet, prohibeo. Etenim quam quis animo concepit opinionem, nullum si-

gnum, nequè bonum nequè malum refellit, quo quis fretus, num rectè renunciatum sit, nèc ne possit cognoscere. Alioquin sanè suppetit ei qui volet ut credat, nihil enim impedit. Verùm existimo si quid ex his veri efferatur, aut de his qui exercentur, aut de illis quos antea scripsimus, primùm quidèm, qui hujus cognitionem habuit ex signis conjecturam captasse, deindè dubiè & ut fert humana natura prædixisse, simulque eos qui renunciant prodigiosius, quam res existit commemorare. Quandò nequè proclive est in morbis errata cognoscere, etiàm si ægri decumbant, & parùm nutrientibus cibis utantur, adeò ut non admodùm multa Medicum intueri oporteat, qui hæc in considerationem adhibere velit. Etenim quidam solo potu utuntur, alii ad potum, vel sorbitionem, vel optimum cibum adjungunt. Quarè tùm necesse est eos qui largiore potu utuntur, difficilius spirare, & majorem urinæ copiam reddere, eos verò qui sor-

bitione aut cibo abundè usi sunt, siti majori & febre tentari. Quod si quis ad utraque & potum & cibos immoderatè se gesserit, & etiàm ad febrem & spirandi difficultatem, ventris circumtensionem & magnitudinem adjunget. Licèt autem & in his omnibus optimè periclitandis cæterisque eam probationem facere, quam in omnibus adhibemus & rectè utimur. Imprimis quidem facile est mente ac oculis complecti, eodem loco decumbentem & diligenti victûs ratione utentem, nùm quâ in re aut obambulando, aut multùm edendo non obsecutus sit. Deindè manibus tùm ventrem, tùm venas attrectantem minus falli convenit, quam qui non attrectavit. Nares quoquè in febricitantibus quidem multaque & pulchrè denunciant, odores namque multum inter se differunt. At in valentibus & rectâ victûs ratione utentibus, non video quâ in re, hâc exploratione uti possim. Ad hoc vocem & spiritum audiendo, licet auribus dignoscere, quæ in valentibus non

æquè sunt manifestà; verùm qualiter antèa se habent. Quod si morborum & ægrorum naturam Medicus cognoverit, nihil necesse est quicquam prædicere. Nam nec difficilius quis spiraverit adhuc inerrante morbo, & graviore febre tentabitur, venterque intensior fuerit. Quas ob causas, antequam morbus consistat, secura non est prædictio. Sed hoc elapso tempore, enunciare oportet quicquid præter rationem evenerit. Nequè verò obscura sunt quæ ob ægrorum contumaciam mala contingunt. Spirandi namque difficultas cæteraque id genus, si ob erratum contingunt, postridiè desinent. Quare qui hanc judicationem in considerationem ad dicendum adhibuerit, non aberrabit. Atquè hunc quidè in modum habendam esse rationem tùm eorum qui domi manent; tùm eorum qui exercentur, cæterorumque omnium, in his erratis quæ committunt nunc suadeo, exquisitas autem illas narrationes & audio & derideo. Nequè enim video

quânam ratione eos qui parùm à Medici monitis aberrant deprehendere queam. Quod si majora fuerint errata, quonam modo in considerationem videre debeant, scriptis complecti est animus. Imprimis quidèm oportet, si quis horum cognitionem habere velit, quæ committit æger Medicis non auscultando, cum totâ die intueri, & eodem in loco, ac eâdem horâ, præsertimque cum primum sol collucet. Tunc enim aliquantùm exinanitus fuerit, & adhuc jejunosus est, neque ullo labore, præterquam matutinis deambulationibus fessus, in quibus minimè Medico contradicit, si quidèm à somno experrectus ad deambulandum se contulerit. Quare necesse est eum qui absolutâ victûs ratione utitur, eâ horâ præcipuè, æquabilem cum coloris, tum etiàm totius corporis statum nactum esse. Ideoque & qui ad hoc negotium incumbit, tunc temporis maximè mentis acumine atque oculorum acie valuerit. Præter hæc in cogitationem etiàm adhibere oportet.

hominis mentem, mores, & corporis vires, quandoquidè quidam facilius aut difficilius imperata exsequuntur. Imprimis igitur qui in ediam subit, si abundantiorè cibum & potum sumpserit, his se prodet indicium. Nam & ejus corporis moles major videbitur & plenior, ac melius coloratus fuerit, nisi malè prodierint alvi excrementa, eritque ad fatigationem alacrior. Videndum quoquè est nùm qui eruptione rejecerit, aut flatibus vexetur, quæ fieri assolent his qui in eo victus errato hunc in modum se habent. Quod si ubi pleniorè cibum edere cogitur, aut valentèr fatigari, aut cibum non comederit, aut inebriatus fuerit, aut post copiosiorè cœnam non deambuaverit, hunc in modum explorare poteris. Cœnam si quidè non sumpserit, deambulet autè uti consuevit, tùm aspectu jucundior fuerit, tùm in exercitationibus obeundis acrior & efficacior, secçsius verò & minor & maxime compactus huic contigerit. Quod si cœnam sumpserit

nec deambulaverit, ructatione
 & flatibus conflictabitur, nequè
 plenitudo minor videbitur, &
 in fatigatione magis quàm antea
 sudabit, spirandique difficulta-
 te & gravitate laborabit, & alvi
 secessus copiosiores & minus glu-
 tinosi his fuerint. Si vero nequè
 cibum absumpserit, nequè deam-
 bulaverit, & languidior & tur-
 gidior fuerit. Sed si inebriatus
 fuerit, utique quam prius magis
 sudaverit, & difficilior spirabit,
 & seipse gravior & humidior
 evadet. Quin & alacrior fuerit,
 nisi caput aliquatenus dolore ve-
 xetur. Uxore vero semel usus, &
 acrior fuerit & magis expeditus.
 At si sæpius venerem exercuerit,
 durior evadet cum quodam squa-
 lore, corpusque decoloratius
 erit & majore lassitudine tenta-
 tum.

Cels. l. i.
 c. i.

SANUS homo, qui & benè va-
 let, & suæ spontis est, nullis
 obligare se legibus debet, àc ne-
 què Medico, nequè iatroaliptâ
 egere. Hunc oportet varium ha-
 bere vitæ genus, modo ruri esse,
 modò in urbe, sæpiusque in agro
 navigare,

navigare, venari, quiescere interdum, sed frequentè se exercere. Si quidèrn ignavia corpus hebetat, labor firmat, illa maturam senectutem, hic longam adolescentiam reddit.

Bis die cibum capere, potiùs Cels. l. 1. c. 1.
quàm semel, (potest sanus ho-
mo,) & semper quam pluri-
mum, dummodò hunc conco-
quat.

CONCUBITUS nequè nimis Cels. l. 1. c. 1.
concupiscendus, nequè nimis
pertimescendus est, rarus, cor-
pus excitat, frequens, solvit. Cùm
autèm frequens non numero sit,
sed naturâ, ratione ætatis & cor-
poris, scire licèt eum non inuti-
lem esse, quem corporis nequè
languor, nequè dolor sequitur.

IDEM interdiù pejor est, tutior Cels. l. 1. c. 2.
noctu: ita tamèn, si nequè illum
cibus, nequè hunc cum vigiliâ
labor statim sequitur.

Si lucubrandum est, non post Cels. l. 1. c. 2.
cibum facere, sed post conco-
ctionem.

VINUM dilutius pueris, mera- Cels. l. 1. c. 3.
ciùs senibus (convenit.) Hyeme
plus esse convenit; minùs, sed me-

raciùs , bibere. At Vere paulùm cibo demendum adjiciendumque potioni , sed dilutiùs tamèn bibendum est. Æstate ut sapiùs utendum cibo , sic exiguo est. Per Autumnum propter cæli varietatem periculum maximum est , itaquè nequè sine veste , nequè sine calceamentis prodire oportet : cibo verò jam plenior uti licet , minùs sed meraciùs bibere.

Cels. 1. 1. c. 3. VENUS Hyeme non pernicioſa, Veretutiſſima: nequè Æstate verò nequè Autumno utilis eſt, tolerabilior tamèn per Autumnum eſt. Æstate in totum , ſi fieri poſſeſt , abſtinendum.

Cels. 1. 2. c. 27. BRASSICA ſubcruda alvum movet , biſ cocta ſtringit.

Cels. 1. 3. c. 2. OMNIUM optima ſunt quies & abſtinentia : ſolaque abſtinentia ſinè ullo periculo medetur.

Cels. 1. 3. c. 21. MULTUM ambulandum , currendum aliquando & ſuperiores maximè partes ſic perfricandæ ut calorem in cutem evocet : inter quæ ſpiritum ipſe contineat. Evocandus eſt ſudor non per exercitationem tantùm ſed etiàm in arenâ

calidâ , vel laconico , vel cliban-
no , similibusque aliis : maximè-
que utiles sunt naturales, & siccæ
sudationes sunt , quales supèr *Ba-*
ras habemus & in myrtetis.

EXERCITATIO primò levis, Cels.l.4.
deindè major adhibenda est ; c. 5.
maximè quæ superiores partes
moveat , in omnibus stomachi
vitiis aptissima est.

OPTIMUM medicamentum Cels.l.5.
quies est. c. 26.

Vide CONSUETUDINEM. LA-
BOREM. SOMNUM. CIBUM. VI-
CTUM.

HYSTERICA PASSIO.

MULIERI uteri strangulatu ve- Aph. 35.
xatæ , aut difficultate partûs la- Sect. 5.
boranti , sternutatio succedens
bono est.

IN mulieribus quæ uteri suffo- Sent.
cationibus tentantur , idque sinè 554.
febre , faciles sunt convulsiones , Coac.
quale quid etiàm *Drocardi* conti-
git.

Vide CONVULSIONEM.

HYPOCONDRIA

S E U

PRÆCORDIA.

Aph. 72. QUIBUS sublata præcordia
Sect. 4. murmurant, lumborum succedente dolore, iis alvi humectantur, nisi flatus deorsum erumpant, aut urinæ copia prodeat: atquæ hæc in febribus contingunt.

Aph. 40. QUIBUS ad præcordia dolores
Sect. 6. citrà inflammationem oriuntur, iis febris succedens dolorem solvit.

Sent. PRÆCORDIA verò, sine ullo doloris sensu, æqualitèr mollia esse oportet. At inflammatione tentata, aut inæqualitèr affecta, aut dolore vexata, non contemnendæ ægritudinis notas præ se ferunt.

Sent. PRÆCORDIA verò tumida, dura ac dolentia, si in universum sic affecta sunt, maximum quidè malum protendunt: si verò alterâ parte duntaxat, ex sinistrâ minùs periculum impendet. Cæterum per exordia quidè mor-

tem propè affore ista denunciant, ubi verò vigesimum diem superârunt, & febris detinuerit, in pus vertuntur. Atquè intrâ primum circuitum istud contingit, ac sanguinis è naribus fluxus plurimum conducit. Etenim plerumque his caput dolet, & oculorum acies hebescit: atquè tum sanguinis eruptio magis expectari debet, idque circa quintum & trigesimum ætatis annum. In senioribus verò non item.

QUIBUS, præcordia inflammatione tentantur, & pus colligunt, iis, sub mortem nigra dejiuntur. Sent. 288. Coac.

PRÆCORDIORUM contentio cum sopore & incontinenti corporis jactatione, capitis dolore vexato, tubercula ad aures exci- rat. Sent. 289. Coac.

Ex præcordiorum tumore, biliosis spiratio magna & febris acuta, tubercula ad aures susci- tat. Sent. 290. Coac.

IN præcordiorum dolore, cum aliquo murmure, succedens lumborum dolor in febribus, alvos plerumquè humectat, nisi flatus Sent. 291. Coac.

eruperit, aut urinæ copia prodierit.

Sent. IN præcordiis ex longo inter-
292. vallo afflictis & graveolente al-
Coac. vo, subnatum ad aures tubercu-
lum, mortem adfert.

Sent. PRÆCORDIA non mollia, &
296. facies benè habita, non nisi libe-
Coac. rali sanguinis ex naribus proflu-
vio, aut convulsione, aut co-
xendicum dolore, solutionem ac-
cipiunt.

Sent. Ex alvi suppressione, sublata
301. præcordia, malum denuntiant,
Coac. præcipuè verò in his, qui ex
longo intervallo contabescunt,
& quibus alvi humectantur.

Sent. PRÆCORDIA in tumorem sub-
442. lata omnibus quidè[m] mala sunt,
Coac. præsertim verò his qui ex longo
intervallo tabidi existunt.

Sent. Ex his qui cum perniciè con-
444. sumpti sunt, nonnulli, antè mor-
Coac. tem subindè rigoribus corripiun-
tur.

Sent. QUIBUS ardore conflictatis,
92. fatuitate, aut alto stupore (quem
Præd. *Catochum* dicunt) detentis, præ-
lib. I. cordia variant, & in contrarias
subindè affectiones transmutan-

etur, ac venter in tumorem præter naturam sublatus est, cum ciborum interceptione & tenui circa caput & thoracem oborto sudore: in his animadvertendum est, num sit concitatus & magnus spiritus? aut genituræ similis excretio accidat? singultum prænunciet? aut etiã ex alvo spumantia & biliosa proditura sint? Eos, splendescens quiddam aut corruscans per urinam redditum juvat, alvus verò in his etiã commovetur.

PRÆCORDIORUM contentio, cum capitis gravitate & surditate, ad hæc quæ oculorum aciem perturbant, sanguinis eruptionem ex naribus prænunciant. Sent. 147. Coac.

PRÆCORDIA optima quidẽ, quæ dolore vacant, mollia sunt & æqualia, tum dextrâ, tum sinistra parte, incensa verò aut dolentia, aut intenta, aut inæqualiter affecta dextrâ parte ad sinistram, hæc omnia animadvertenda sunt. Quod si etiã pulsus in præcordiis insit, perturbatio- nem aut delirium indicat; verum etiã eorum oculos intueri Præn. pag. 38. & 39.

oportet. Si namque oculi crebro moveantur, insania expectanda est. At tumor in præcordiis durus & dolens, pessimus quidem ubi tota præcordia occupârit. Sin verò alterâ parte sit, minore cum periculo sinistra. Hujusmodi autem tumores circâ principia quidem mortem brevi affore indicant. Quod si nequè intrâ vigesimum diem febris quiescat, nequè tumor subsidat, ad supurationem res vertitur. His autem primo circuitu etiam sanguinis e naribus fluxus contingit, valdèque juvat. Verum eos interrogare oportet, nùm capite doleant? aut obtusam oculorum aciem sentiant? Quod si quid ex his accidat, eò rem tendere sciendum est. In junioribus tamèn, nequè dùm trigessimum quintum annum attingentibus, sanguinis eruptio magis Expectanda est. Molles autem tumores & doloris expertes digitisque cedentes, longiores judicationes faciunt, illisque minùs graves sunt. Quod si intrâ dies sexaginta, nequè febris cesset,

nequè tumor subfidat , fore sup-
purationem hoc loco , & reliquo
ventre eodem modo significat.
Itaquè tumores dolentes , duri
& magni , periculum mortis in-
trà paucos dies affore significant.
Molles verò & minimè dolen-
tes , quique digito pressi cedunt ,
illis diuturniores esse solent. Ac
ventris tumores minùs abscede-
re nati sunt , quàm qui in præ-
cordiis oriuntur , minimè verò
qui infrà umbilicum in pus ver-
tuntur. Sed ex superioribus locis ,
sanguinis eruptio maximè expe-
ctanda est. Longorum verò om-
nium in his regionibus tumorum ,
suppurationes in consideratio-
nem adhibendæ. Suppurationum
autèm quæ indè proveniunt , ea
observatio facienda est. Quæ qui-
dèm foràs vertuntur , optimæ
sunt , ubi parvæ sunt , & quàm
maximè foràs feruntur , & in
acutum tendunt. Pessimæ ve-
rò quæ magnæ sunt & latæ mi-
nimèque in mucronem attol-
luntur. At quæ intrò rumpuntur
optimæ , ubi nihil cùm exter-
nâ sede communicant , in sese

contrahuntur , nullo dolore afficiunt, totaque regio externa unius coloris apparet. Pus verò optimum est album, æquale & leve , & quàm minimum graueolens, huic autèm contrarium, pessimum.

Vide DOLOREM PRÆCORDIORUM.



J A C E R E.

O PRIMUS ille quidè̃m jacen-
tis habitus, quem sanus ali-
quis usupare convenit. Supinum
verò jacere cruribus porrectis,
probari non potest. Id quoquē
deterius, ubi subindē̃ deorsum ad
pedes prolabitur. Exitiosum est
ubi hiat, aut assiduē̃ dormit, aut
ubi supinus jacet cruribus vehe-
mentē̃ contractis ac reductis,
pronus autē̃m jacere ei qui non
consuevit, delirium aut circa
ventrem dolores portendit. Quod
si pede & manu sudat, nequē̃
vehemens color ei subest, &
crura dispergit, mali morbi si-
gnum est, angorem namque
portendit. Ubi verò residere vult
ager, malum quidē̃m indicium in
acutis morbis, sed longē̃ pessi-
mum in pulmonum & laterum
affectibus. Noctu dormiendum,
interdiū̃ vigilandum, contrā̃ ve-
rò malum. Minimum autē̃m of-
fendit, si quis matutino tempore
ad tertiam diei partem dormiat.
Qui verò ab hoc tempore som-

Sent.

497.

Coac.

nus est, malus. Pessimum tamen est si somnus nequè noctu nequè interdiu accedit. Id enim ob dolorem laboremque accidit, vel delirium fore significatur.

Præd. **ÆGRUM** à Medico in latus
pag. 37. dextrum aut sinistrum recumbentem deprehendi oportet, manibusque & cervice ac cruribus paulum reductis, totoque corpore molliter posito. Hic enim ferè sani jacentis est habitus. Is autem habetur optimus decubitus, qui benè valentium similis est. Supinum verò jacere manibus, cervice, & cruribus porrectis, minùs bonum. Quod si prònus ad pedes de lecto delabatur, magis formidandum. Ubi verò pedes nudos, nequè admodum calidos habere comperietur, & manus, cervicem & crura inæqualitèr dispersa & nuda, malum; anxietatem enim indicat. Lethale quoquè & hianti ore assidue dormire, & ubi supinus jacet cruribus valdè contortis & amplexis. At in ventrem jacere, ei qui per bonam valetudinem ita dormire minimè consuevit, deli-

rium aut partium circa ventrem
dolorem indicat. Ægrum verò
residere velle in ipso morbi impe-
tu, pravum quidè in omnibus
morbis acutis, & pulmonum in-
flammatione laborantibus pessi-
mum.

J A C T A T I O.

CORPORIS jactationes & in- Sent. 2.
continentiæ cum perfrictione, Coac.
pessimæ.

IN præcipitibus malis, corpo- Sent.
ris motio, jactatio ac turbulentus 82.
somnia, nonnullis convulsionem Coac.
portendit.

CORPORIS æstuatione & in- Sent.
quietâ jactatione conflictati, ci- 557.
trâ vomitum ingravescentes, ma- Coac.
lè habent, atquè etiàm qui velli-
cantur citrà vomitum.

CORPORIS jactationes & in- Sent.
continentiæ in febre cum Perfri- 27.
ctione & superiorum partium te- Præd.
nui sudore, phrenitim denun- lib. I.
ciant (quod in *Aristagorâ* ex-
pertum est) atquè etiàm perni- Sent.
ciem. 25.

CONSIDERANDUM est in Præd.
lib. I.

æstuabundis & corporis jactatione, citrà vomitum & lumborum dolore conflictatis ægris, si audacitèr desipuerint, nùm nigra per secessum proditura sint?

Vide FEBRES. CONVULSIONEM.

ICTERUS.

Aph. 42. MORBO regio laborantibus, je-
Sect. 6. cur durum fieri, malum.

Sent. MORBUS regius si antè diem

121. septimum accesserit, malum si-

Coac. gnificat septimo autèm, nono, undecimo ac decimo quarto, judicationem adfert, dùm præcordia non induret. Quod si secùs contingat, res in dubium vertitur.

Sent. IN morbo regio affectis, nec

490. admodùm sentientibus, qui-

Coac. bus singultus adest, iis alvus effunditur, fortè verò etiàm supprimitur, atquè hi cum virore pallefcunt.

Sent. IN spirituosiss & anhelatoribus

164. morbo regio laborantibus & fe-

Præd. bre acutâ, cum præcordiorum

lib. 1. duritie & tumore, si corporis summa perfrigerentur, magnotum circa aures abscessuum

exortum , fortassis expectare oportet.

Vide MORBUM REGIUM. COLOREM.

J E C U R.

Qui ex purulento jecore aduruntur , ubi pus purum fluxerit & album , supersunt , quod pus in tunicâ ipsis inclusum sit. Sin verò qualis amurca fluat , pereunt.

Aph. 45.
Sect. 7.

Vide DOLORES JECORIS.

I L E U S.

Ex morbo tenuioris intestini (*ileum* dicunt.) Vomitio , aut convulsio , aut delirium , malum.

Aph. 10.
Sect. 7.

Quibus ex stranguria volvulus succedit , intra diem septimum moriuntur , nisi febre accedente copiosa urina effluat.

Aph. 44.
Sect. 6.

I M P E T I G I N E S.

IMPETIGINES & lepræ , albicantesque vitiligines , si juveni-

Præd.
lib. 2.
p. 114.

bus quidè̃m, aut pueris, horum aliquid contingat aut sensim se prodens, diuturnitate temporis augetur: in iis quidè̃m ex pustulæ, abscessus esse minimè existimandæ sunt, sed morbi. At quibus ex his aliquid subito multumque contingit, id certè abscessus dici possit; oriuntur autè̃m albicantes vitiliginis ex maximè quidè̃m lethalibus morbis, velut quæ tabes dicitur. Lepræ verò & impetiginis, ex iis qui ab atrâ bile fiunt. Ex quibus quæ valdè juvenibus contingunt, & recentissima quæque sunt, ex faciliùs curationem recipiunt, tum quæ in summè mollibus & carnosissimis corporis partibus nascuntur.

INFLAMMATIO.

Cels. NOTÆ inflammationis sunt
l. 3. c. 20. quatuor, rubor & tumor, cum colore & dolore.

Cels. Quò gravior inflammatio est,
l. 6. c. 6. eò magis leniri medicamento debet.

INSANIA.

I N S A N I A.

VEHEMENTI infaniâ detenti, Sent.
tremuli, cum crebrâ sputatione, 94.
metus est nè phrenitici evadant. Coac.

DESIPIENTIÆ quæ circâ ne- Sent.
cessaria fiunt, pessimæ, & quæ 98.
ex his ingravescunt, exitium por- Coac.

DESIPIENTIÆ cum voce stri- Sent.
dulâ, linguæ revulsione, ac ipsi 99.
quoquè tremuli, vehementem Coac.
mentis alienationem significant.
In his durities aut asperitas per-
niciem minatur.

Ex infaniâ in raucedinem cum Sent.
russi fit secessio. 484.

INSANIENTIBUS accedens con- Coac.
vulsio, oculorum aciem retundit. Sent.

VEHEMENTES mentis emo- 485.
tiones silentes, absquè quiete, Coac.
oculis quoquoversum intuentes, Sent.
spiritum efflantes, perniciem mi- 486.
nantur, diuturnas verò faciunt Coac.
partium resolutiones. Quin etiâ
vehementèr insaniunt hoc mor-
bo affecti. Quibus autèm cùm
ventris perturbatione hujusmodi
affectus ingravescunt, iis nigra

Q

per alvum ad judicationem prodeunt.

Sent. 2. DESIPIENTIÆ quæ jam admodum fractis & debilitatis viribus succedunt, pessimæ sunt, non secus ac *Thasmonii*.
lib. 1.
Præd.

Sent. 34. DEMENTIÆ in quibus tremuli sunt ægri, obscure, aut vix quidam desipere videntur, aut aliquid investigantium more sensim contrectant & palpant, miro quodam modo phrenitim prænunciant, non secus ac *Didimarchus* in *Coo* contigit.
lib. 1.
Præd.

Sent. 40. QUÆ præter vacuationem sunt impotentia, nequè vacuatione existente, perniciem intendant.
lib. 1.
Præd.

Sent. 73. CERVICIS dolor in omni quidam febre malo est. In his verò pessimus in quibus vehementem insaniam metuimus.
lib. 1.
Præd.

Cels. NEQUE ignorare oportet leviores esse morbum cum risu quam serio insanientium.
lib. 3. c. 18.

Vide DESIPIENTIAM. DELIRIUM. DOLORES CAPITIS. PHRENITIM.

INSOMNIA.

Qui insomniâ vexantur cum subitâ corporis jactatione & inquietudine, iis sanguinem erupturum sperare oportet, idque præsertim si non antea quid profluxerit. Animadvertendum verò nùm id post horrois sensum contingat?

Sent.

486.

Coact.

INTESTINA.

Quibus intestina contorquentur, circa umbilicum labores, & lumborum dolor adest, qui nequè medicamento purgante, nequè aliâ ratione solvitur, in siccum hydropem confirmatur.

Aph. 11.

Sect. 4.

Si dolor intestina torquens, & genuum gravitas, & lumborum dolor citrà febrem adfuerint, medicamento quod per inferiora purgat opus esse significant.

Aph. 20.

Sect. 4.

Ex tenuioribus intestinis si quid perfectum fuerit, minimè coalescit.

Aph. 24.

Sect. 6.

Ex furore intestinorum diffcultas, aut hydrops, aut vehemens

Aph. 5.

Sect. 7.

Qij.

mens mentis emotio (*extasis* dicitur) bono est.

Sent. INTEMPESTIVE' suppressa intestinorum difficultas, abscessum
462. in costis, aut visceribus, aut articulis inducit. Ac fortè biliosa quidè articulis, sanguinea verò in costis ac visceribus abscessum facit.
Coac.

Sent. IN tenuioris intestini morbo
470. laborantibus, vomitio & surditas, malo sunt.
Coac.

Sent. Ex laterum inanitate ad tenue
515. intestinum migrantes dolores, in diuturnis morbis ex abortione, nequè admodum purgatâ muliere, perniciem denunciant.
Coac.

Sent. RELIQUA alvi profluvia quæ
Præd. l. fine febre sunt, & parvo tempore durare, & mitia esse solent.
2.p.106. Aut enim elota, aut suâ sponte desinent. Cessaturum autem alvi secessum denunciaveris, ubi contractato manu ventre nullus motus suberit, & ad extremam dejectionem flatus prodierit. Sedes autem procidit, viris quidè, quibus ora venarum sanguinem fundunt (*hemorrhoidas* vocant) & alvi fluxus corripit, pueris quo-

quæ calculosis, & in diuturnis ac-
sinceris intestinorum difficulta-
tibus, senibus verò quibus mucosæ
quædam concretiones affixæ
sunt.

IN tenuioris intestini morbis Sent. 158.
graveolentibus, cum febre acutâ Præd. lib. I.
& ex longo intervallo tumescen-
tibus præcordiis, qui ad aures
oboriuntur abscessus, mortem
adferunt.

Vide ILEUM.

JUVENTUS.

QUICUMQUE alvos habent hu- Aph. 53.
midas, ii quidem si juvenes sunt, Sect. 2.
melius degunt, quam qui siccas
habent. At in senectute pejùs de-
gunt, cum ipsis senescentibus
ferè resiccentur.

LONGA corporis statura, in ju- Aph. 54.
ventute quidèdegenda, libera. Sect. 2.
lis nec indecora, in senectute
verò inutilis, & brevitate dete-
rior.

Vide ÆTATEM. ALVUM.



LABOR.

Celf. 1. **D**ESIDIA atquè luxuria, hæc
 1. Præf. duo prius in *Gratiâ* corpora
 vitiârunt, deindè apud nos affli-
 xerunt.

Celf. **Q**UEM interdiù vel domestica
 1. c. 2. vel civilia officia tenuerunt, huic
 tempus aliquod servandum cura-
 tioni corporis est. Prima autèm
 ejus curatio exercitatio est, quæ
 semper antecedere cibum debet:
 exercitationis autèm modus & fi-
 nis esse debet sudor, aut certè
 lassitudo quæ citrà fatigationem
 fit.

Celf. **P**OST satietatem nihil agen-
 1. c. 2. dum.

Celf. **N**IMIS otiosa vita ~~in~~utilis non
 1. c. 3. est, quia potest incidere laboris
 necessitas.

Vide CONSUETUDINEM.

LABRUM.

Sent. **C**ONTRACTUM labrum bilio-
 240. sæ alvi perruptionem denunciat.

Coac. *Vide* OCULUM.

L A C.

Si mulier, quæ nequè gravida Aph. 39.
est, nequè peperit, lac habet, Sect. 5.
ei menstrua defecerunt.

MULIERI uterum gerenti, si Aph. 52.
lac copiosum è mammis effluat, Sect. 5.
fœtum imbecillem indicat. Quod
si solidæ mammæ fuerint, valen-
torem fœtum significant.

LAC exhibere capite dolenti- Aph. 64.
bus, malum. Malum item & Sect. 5.
febricitantibus, & quibus præ-
cordia sublata murmurant, &
siticulosi. Malum quoquè &
quibus biliosæ sunt dejectiones,
quiquè febre acutâ laborant, &
quibus copiosa sanguinis dejectio
facta est. At tabidis lac dare con-
venit, non valdè admodum fe-
bricitantibus, & in febribus lon-
gis & languidis, dùm nullum ex
suprà commemoratis signis ad-
fuerit, & præter rationem exte-
nuatis.

LAC quod in capitis doloribus Cels.
& in acutis febribus pro veneno l. 3. c. 22,
est, in phthisi tamèn, sicut in om-
nibus longis difficilibusque fe-

briculis , rectè dari potest.

LACHRYMÆ.

Vide OCVLOS.

LATUS.

Sent. QUIBUS latus in tumorem sub-
428. latum est , calidius existit , ubi in
Coac. alterum latus incumbentibus ,
pondus quoddam suspensum esse
videtur , iisus unâ in parte col-
lectum est.

*Vide DOLOREM LATERIS.
PLEURITIDEM.*

LASSITUDO.

Aph. 5. LASSITUDINES sponte obortæ,
Sect. 2. morbos prænunciant.

Sent. DELASSATI ægri , caligine ob-
35. ducti , pervigiles & sopore de-
Coac. tenti , cum tenui sudore recales-
centes , malè habent.

Sent. LASSITUDINE laborantes cum
36. horrore , judicii modo levitèr
Coac. exudantes , celeritèr ad calorem
revocati , malè habent , tum ve-
rò præsertim si ista insupèr san-
guinem

guinem è naribus stillârint. Cir-
cà hæc aurigine admodùm fœ-
dati , & largiùs colorati moriun-
tur , iisquè album alvi recremen-
tum prodit.

LASSITUDINE conflictati ægri, Sent.
singultuosi, & alto stupore (quem 45.
Catochum vocant) detenti , malè Coac.
habere significant.

Vide GRAVITATEM. FEBRES.

LETHARGUS.

QUI lethargo aut veterino Sent.
conflictantur , ex manibus tre- 139.
munt, somnolenti sunt, malè co- Coac.
lorati, tumidi, pulsus habent
tardos & lentos, ac oculorum
genas inferiores sublatas, sudores
superveniunt, alviquè subtumef-
cunt, impotentes sunt, ac bilio-
sa effundunt. Quòd si resiccata
fuerint, urinæ alvique recremen-
ta clàm prodeunt, urinæ quales
in veterino genere redduntur ne-
què potum, nequè aliud quic-
quam postulant. Mentis verò
compotes facti, de cervicis dolo-
re conqueruntur, ac incertos soni-
tus per aures impetu ferri sentiunt.

R

Sent.

140.

Coac.

QUI verò ex lethargo evadunt,
magnâ ex parte pus intrò colligunt.

L I E N.

Præd. I. QUIBUS lienes magni, iis gingivæ vitiantur & os graveolet.
2. p. III. Quibus autem lienes magni sunt, nequè sanguinis eruptiones contingunt, nequè os graveolet, in tibiis ii mala ulcera habent & nigras cicatrices. Quòd si manifestus quispiam adfuerit faciei abscessus, aut vox gravis sit, aut dentium dolor, iis sanguinis eruptionem ex naribus fore spes est. At qui partes eas quæ subsunt oculis vehementer sublatas habent, magnos lienes comperies. Quòd si pedum quoquè tumores adsint, ex aquâ etiàm laborare videbuntur. Sed & ventrem & lumbos, præter hæc, inspicere oportet.

Vide DYSENTERIAM.

L I E N O S U S.

Vide LIENTERIAM.

LIENTERIA.

IN diuturnis intestinatorum levitatibus, si ructus acidus, qui antea non extitit, succedat, bonum est signum. Aph. 1. Sect. 6.

LIENOSI qui difficultate intestinatorum corripiuntur, iis, post longam succedentem intestinorum difficultatem, aqua intercutem aut levitas intestinatorum accidit & moriuntur. Aph. 43. Sect. 6.

LIENOSIS, accedens intestinorum difficultas, bono est. Aph. 48. Sect. 6.

IN intestinatorum levitate laborantibus, cum sævissimis ulceribus, dolores ex intestinatorum cruciatu soluti, articulorum partes attollunt, ac ex huiusmodi tenues squamæ cum rubore & pustulis fiunt. Ii, post multos ac tenues sudores, velut acceptis ex flagris, vibicibus rubescunt. Sent. 467. Coac.

LONGIS intestinatorum levitatibus laborantes unà cum sævissimis ulceribus, intestinatorum cruciatu & dolore, iis solutis intumescunt. His insuper exortus rigor, malo est. Sent. 468. Coac.

Sent. **INTESTINORUM** levitates cum

469. spirandi difficultate, & pectoris

Coac. morfu, ad tabem tendunt.

Præd. 1. **LEVITATES** autem intestinorum

2.p.115. assiduæ quidè & multo tempo-

re perseverantes, ac omnibus

horis, & cum strepitu, & sinè

hoc exturbatæ, & similiter noctu

& interdiu affligentes, si quod

excernitur valdè crudum est,

aut nigrum & leve, ac mali odo-

ris, eæ quidè omnes malæ sunt.

Nam & sitim exhibent, neque

portionem per urinam reddunt,

quod in vesicam non descendat,

os exulcerant, & elatum faciei

ruborem, ejusque cutis vitia om-

ni colorum genere distincta,

(*Ephelidas* vocant) excitant si-

mulque ventrem quasi ferment-

tatum, sordidum, ac rugosum

efficiunt: ex quibus aut cibum

capere, aut deambulare ad res

obeundas nequeunt. Morbus hic

seniores gravissimè infestat, quin

& viros vehementè affligit, cæ-

teras verò ætates multò minùs.

At qui eas ætates quas ab hoc

morbo malè affici diximus, non

attingit, & paucissima signa ha-

bet quæ mala esse scripta sunt, is securissimè constitutus est. Curationem autèm postulat hic morbus quòad & urina proportionis modulo feratur, corpusque cibos ingestos sentiat, & vitiosum cutis dolorem deponat.

Vide ALVUM. DYSENTERIAM. EXCREMENTA. HYDROPEM. TENESMUM.

L I N G U A.

Si lingua derepentè incontinens, aut aliqua corporis pars syderata evadat, id atram bilem indicat. Aph. 40. Sect. 7.

LINGUA nigra atquè cruenta, si quid horum signorum abest, non valdè malum: morbum enim minorem declarat. Aph. 9. Sect. 8.

LINGUA circà initia quidèm horrida, in eodem verò tempore ubi exasperatur, livescit, finditur, mortem denunciat. Quòd si admodùm nigrescat, decimo quarto die judicationem promittit. Periculi autèm maximè plena est nigra & ex virore pallescens. Sent. 229. Coac.

LINGUÆ bisulcum velut salivæ. Sent. 230. Coac.

vâ albâ obductum, febris omiffionem indicat, eò quidè quod agnatum est craffo existente, eodem die, fi verò tenuius fuerit. Eadem etiàm significatio est, fi hæc circâ summam linguam contingant, minùs tamèn firma.

Sent. 331. LINGUA tremula cum narium
Coac. rubore & alvo humectâ, fi reliqua, quæ sunt circâ pulmonem, nullam judicationis significationem præferant, malo est, ac celeres perniciosas significationes denunciât.

Sent. 332. LINGUA præter rationem
Coac. mollis reddita ac nauscabunda, cùm sudore frigido, ab alvo liquidâ, nigræ vomitionis significationem affert. In his lassitudinis sensus denunciât.

Sent. 233. LINGUÆ tremulæ quibusdam
Coac. etiàm alvum humectam nonnunquàm reddunt. In his autèm, si nigræ sint, etiàm mortem denunciant. Ac fortassis lingua tremula instabilem mentem & à sede constantiæ deturbatam significat.

Sent. 234. LINGUÆ densæ & peraridæ
Coac. phrenitidem portendunt.

LINGVA ex resiccatione densa & aspera, phrenitidem portendit. Sent. 3. lib. 1. Præd.

LINGVÆ tremulæ instabilem mentem & à sede constantiæ mentem deturbatam significant. Sent. 20. lib. 1.

Vide PHRENITIDEM. CONVULSIONEM. PULMONES. VOCEM. Præd.

LIPOTHIMIA.

QUI crebrò & vehementer citrà manifestam causam animo linquuntur, repentè moriuntur. Aph 41. Sect. 2.

VIRIUM exolutio dolorem solvens, alvum maximè humectam reddit. Sent. 629. Coac.

LIPPITUDO.

LIPPITUDINE affecto suborta febris solutionem affert. Sin minus, cœcitatís, aut mortis, aut etiàm utriusque metus est. Sent. 222. Coac.

QUIBUS cum lippitudine capitis dolor accedit, & longo tempore perseverat, cœcitatís metus impendet. Sent. 223. Coac.

LIPPITUDINE laborantem, Sent. 224. Coac.
R iij

spontè alvus profluens, juvat.
Vide OCULOS. FEBRES.

L I V O R.

Aph. 2. CARO livida ex offe ægrotante,
 Sect. 7. malum denunciat.

Sent.

66.

Coac.

UBI livores in febre fiunt;
 propè affore mors significatur.

Vide GRAVITATEM.

L O C H I A.

Vide CONCIPERE. MENSES.



M A M M Æ.

MULIERIBUS quibus ad Aph.40.
 mammas sanguis in tumo- Sect. 5.
 rem colligitur, furor significatur.

Vide CONCIPERE. DOLOREM
 M A M M A R U M.

M A N U S.

MULIER ambidextra non fit. Aph.43.
 QUI ad manûs contactum re- Sect. 7.
 filiunt, malè habere judicantur. Sent.

DE manuum verò motione ità 59.
 censeo; in febribus acutis, aut Coac.
 pulmonum inflammationibus, Præn.
 aut phrenitide, aut capitis dolo- p. 36.
 ribus, quibus antè faciem fe-
 runtur, & aliquid frustra ve-
 nantur, & festucas colligunt,
 aut floccos è vestibis evellunt,
 & ex pariete paleas carpunt, ex
 his omnibus malum & mortem
 portendi.

M A R E S.

Vide GRAVIDAM. PRÆGNAN-
 TEM.

M A X I L L Æ

Sent. IN vehementibus circa ma-
 239. xillas doloribus , periculum est.
 Coac. ne os fluctuet.

Vide CONVULSIONEM.

M E D I C U S.

Aph. 1. VITA brevis , ars longa , oc-
 Sect. 1. casio præce s , experientia fal-
 lax , iudicium difficile. Nequè
 verò satis est ad ea quæ factio-
 opus sunt præsto esse , sed &
 ægrum , & eos qui præsentem
 sunt , & res externas , ad id
 probè comparatas eîre , oportet.

Aph. 52. CUM quis omnia rectâ ratione
 Sect. 2. facit , nequè tamèn pro ratione
 succedit , non est ad aliud pro-
 grediendum , si manet quod ab
 initio visum est.

Præn. OPERÆ pretium mihi facturus
 p. 36. Medicus videtur , si ad provi-
 dentiam sibi comparandam omne
 studium adhibeat. Cùm namquè
 præsenferit & prædixerit apud
 ægrotos , tùm præsentia , tùm
 præterita , tùm futura , quæque

ægri omittunt exposuerit , res utiquè ægrotantium magis agnoscere credetur , adeò ut majore cum fiducia se se homines Medico committere audeant. curandi verò rationem optimè molietur , si ex præsentibus affectionibus futura prænoverit. Nequè enim fieri potest ut omnes ægroti sanitatem assequantur. Hoc nempè longè præstantius foret , quàm futuroz confectionem pragnoscere. Quando quidè verò quidam vi morbi intereunt priùsquam Medicum accersant , quidam etiàm vocato Medico confestim , partim quidè unum diem , partim etiàm paulò diutiùs vitam trahentes mortui sunt , priùsquam Medicus arte suâ singulis morbis viriliter se opponere possit. Proindè ubi talium affectionum naturam , quantum scilicèt vires corporis superant , cognoverit , simulque & si quid divini in morbis inest , hujus quoquè providentiam ediscere oportet. Hâc enim ratione , meritò sibi admirationem , & boni Medici exultationem

conciliaverit. Qui namquē morbo superiores esse possunt, eos utiquē longē rectiūs conservaverit, ex longo antecā intervallo ad singula consiliū dirigens, tūm etiām morituros, tūm evasuros ubi prænoverit & prædixerit, extrā culpam positus erit.

Celf. lib 1
Præf. U T alimenta sanis corporibus agricultura, sic sanitatem ægris Medicina promittit.

Idem. N O N credunt posse eum scire quomodò morbos curare conveniat, qui undē hi sint ignoret.

Idem. E U M rectē curaturum esse dicunt, quem prima origo causæ non fefellerit.

Idem. N A M nē agricolam quidē, aut gubernatorem disputatione, sed usu fieri (*cognoscitur.*)

Idem. (M E D I C I N A) est ars conjecturalis, nequē respondet ei plerumque non solūm conjectura, sed experientia.

Idem. N E Q U E ignorare Medicum oportet quæ sit ægri natura, humidum magis, an magis siccum corpus ejus sit, validi nervi, an infirmi, frequens valetudo, an rara, eaque, cum est, vehe-

mens esse soleat, an lenis, brevis, an longa?

Vix ulla perpetua praecepta Medicinalis ars recipit. Idem.

HIPPOCRATES dixit mederi oportere communia & propria intuentem. Idem.

Cum par scientia sit, utilior tamèn Medicum esse (scias) amicum, quàm extraneum. Idem.

NATURA repugnante nihil Medicina proficit. Magis tamèn ignoscendum Medico est parùm proficienti in acutis morbis quàm in longis, hic enim benè spatium est intrà quod, si quod non profuit auxilium, æger extinguitur: ibi & mutationi remedium & deliberationi tempus patet, adeò ut rarò, si inter initia Medicus accessit, obsequens æger sinè ullius vitio pareat. Cels. l. 3. c. 7.

MULTUM interest ab initio rectè quis curatus sit, an perperam? Quia curatio minùs his prodest, in quibus assiduè frustra fuit. Cels. l. 3. c. 2.

ANTIQUOS admodùm celebres Pythagorici numeri fefellerunt, l. 3. c. 4.

cùm hîc Medicus non numerare debeat, sed ipsas accessiones intueri, & ex his conjecturare quandò cibus dandus sit.

Cels. 1.3.c.4. ILLUD est unum semper & ubiquè servandum, ut ægri vires subindè assidens Medicus inspiciat, & quandiù supererunt, abstinentiâ pugnat: si imbecillitatem vereri cœperit, cibo subveniat. Id enim ejus officium est, ut ægrum nequè supervacua materia oneret, neque imbecillitatem fame perdat.

Cels. 1.3.c.5. CUM ægros semper securos agere conveniat, ut corpore tantum non etiâ animo laborent, tum præcipuè ubi cibum sumpserunt: itaquè si qua sunt quæ exasperatura sunt eorum animos, optimum est ea dùm ægrotant, eorum notiâ subtrahere.

Cels. 1.3.c.6. PERITI Medici est non protinus, ut venit, apprehendere manu brachium, sed primùm residere hilari vultu, percontarique quemadmodum se habeat: & si quis ejus metus est, cum probabili sermone lenire: tum deindè ejus corpori manum admove-
re.

MEDICUS nequè in tenebris
nequè à capite ægri residere de-
bet, sed illustri loco adversùs
eum, ut omnes notas ex vultu
quoquè cubantis perspiciat.

QUISQUE experimentis in se
credere debet.

Cels.

l 4. c. 19.

MEDICAMENTORUM usum ma-
gnâ ex parte *Asclepiades* non sinè
causâ sustulit, cùm omnia ferè
stomachum lædant, malique
succi sint: ad ipsius victûs ratio-
nem potiùs omnem curam suam
transulit. Verùm ut illud in
plerisque morbis utiliùs est, sic
multa admodùm corporibus no-
stris incidere consueverunt, quæ
sinè medicamentis ad sanitatem
pervenire non possunt. Illud an-
tè omnia scire convenit, quod
omnes Medicinæ partes ità con-
nexæ sunt, ut ex toto separari
non possint, sed ab eo nomen
trahant à quò plurimum petunt.
Ergò ut illa quæ victu curat, ali-
quandò medicamentum adhi-
bet, sic illa quæ præcipuè medi-
camentis pugnat, adhibere etiàm
rationem victûs debet, quæ mul-
tùm admodùm in omnibus ma-
lis corporis proficit.

Cels.

lib. 5.

Psæf.

Cels.
lib. 5.
cap. 26.

EST prudentis hominis primum eum qui servari non potest, non attingere, ne videatur occidisse quem fors ipsius interemit. Ubi gravis metus est, finem certam tamen desperatione indicare necessariis periclitantis in difficili rem esse, ne si victa ars malo fuerit, vel ignorasse vel fefellisse videatur. Sed ut hæc prudenti viro conveniunt, sic rursus *histrionis* est parvam rem attollere, quo plus præstitisse videatur.

Cels.
1.7.c. 3.

MEDICI partium est, eniti ad reperiendam sanitatem.

MELANCHOLIA.

Aph. 21.
Sect. 6.

INSANIENTIBUS si varices aut sanguinis profluvium per ora venarum quæ in ano sunt (*hemorrhoides* dicuntur) accesserint, insaniam solutio.

Aph. 23.
Sect. 6.

METUS & tristitia si diu perseverent, melancholiam istud indicium est.

Aph. 56.
Sect. 6.

MORBORUM melancholicorum periculosi decubitus, aut corporis syderationem, aut convulsionem,

nem , aut furorem , aut cœcitatē denunciant.

QUÆ sensim feroces fiunt mentis emotiones , in vehementes & melancholicas evadunt. Quod si ex muliebrium suppressione accidat , in ferinas tendunt , qualia sæpius contingunt. Videndum igitur nūm fœminæ hujusmodi convulsionibus sint obnoxia? animadvertendum quā etiā est , nūm vocis defectiones cū alto sopore convulsionem quoquē minentur? Qualitèr *Cerdonis* filia , comparentibus muliebribus purgationibus , contingere cœpit.

Sent.

123.

lib. 1.

Præd.

Vide IN SANIAM.

M E N S E S.

MULIERI menses decolores , Aph. 36. nequē semper eādē periodo Sect. 5. procedentes , purgationem indicant esse necessariam.

MULIERI si voles menstrua si- Aph. 50. stere , cucurbitalam quā m- Sect. 5. ximam ad mammas appone.

S.

Aph. 56. IN fluore muliebri si convulsio
Sect. 5. accedat & animi defectio, malo
est.

Aph. 57. MENSIBUS copiosioribus pro-
Sect. 5. fluentibus morbi contingunt, &
non prodeuntibus ab utero mor-
bi eveniunt.

Aph. 60. SI mulieri utero gerenti pur-
Sect. 5. gationes eant, fœtus ut bene
valeat fieri non potest.

Aph. 61. SI mulieri purgationes non
Sect. 5. prodeant, nequè horrore, ne-
què febre succedente, ciborum
verò fastidia ei accidant, gravi-
dam esse existimato.

Sent. IN muliebribus purgamentis
512. quæ antè partus aquosa pro-
Coac. deunt, malum denunciant.

Sent. QUIBUS ex muliebribus purga-
518. mentis dolores intensi ad supe-
Coac. riorem ventris partem & te-
nuius intestinum excitati, alvos
humeant, & levem anxietatem
inducunt: his ad judicationem,
in somnum propensiones fiunt,
& impotentes ex capitis dolore
cum tenuibus sudoribus & per-
frictionibus vexantur. Hujusmo-
di recidivæ plurimis post re-
missionem abortæ celeritèr inte-
rimunt.

QUIBUS à partu alba prodeunt,
& his subsistentibus surditas cum
febre & lateris dolor acutus ex-
citatur, eæ in vehementem &
perniciosam mentis emotionem
incidunt.

Sent.
525.
Coac.

PRÆGNANTIBUS. falsuginosa,
pòst partum molestias ex albis
mordacibus denunciant. Purga-
tiones hujusmodi duritiem adfe-
runt. In his singultus malo est,
& uterorum procidentia, quæ
& unà interficit.

Sent.
526.
Coac.

Ex purgamentis muliebribus
ad pedes & lumbos pertingentes
tensiones, suppurationes indi-
cant & viscosa graveolentia ex
alvo cum dolore prodeuntia. Ex
præscriptis quoquè suffocationes,
suppurationes denunciant.

Sent.
527.
Coac.

HORRORE subindè tentatis,
lassitudine & capitis gravitate
conflictatis, muliebres purgatio-
nes erumpunt.

Sent.
541.
Coac.

SÆP E fœminæ quibus sanguis
per menstrua non respondet, l. 4. c. 4.
hunc expuunt.

Cels.

Vide PURGAMENTA.

M O R B I.

Aph. 8. SI quis ex morbis cibum ca-
Sect. 2. piens vires non recipiat, copio-
 fiore alimento corpus uti signifi-
 cat. Quod si cibum minimè ca-
 piente istud contingat, evacua-
 tione indigere sciendum est.

Aph. 12. QUÆ per morbos pòst judica-
Sect. 2. tionem intùs relinquuntur, mor-
 borum reversiones facere consue-
 verunt.

Aph. 30. CIRCA initia & fines (morbo-
Sect. 2. rum) omnia sunt levissima, at
 circà vigores vehementissima.

Aph. 3. MORBI alii ad alias anni tem-
Sect. 3. pestates benè vèl malè habere
 consuevère, & ætates quædam
 ad anni tempestates, & loca, &
 victûs rationes.

Aph. 19. IN quibusvis anni temporibus
Sect. 3 omnis generis morbi oriuntur,
 nonnulli tamèn in quibusdam
 tùm fiunt, tùm excitantur.

Aph. 28. AT magnâ ex parte pueris
Sect. 3. morbi judicatione solvuntur,
 partim quidèm intrâ quadragin-
 ta dies, partim verò intrâ sep-
 tem menses, nonnulli intrâ an-

nos septem , quidam etiàm ad
pubertatem progressis. Qui verò
pueris perseverârint , nequè circà
mensium eruptionem , diù per-
severare consueverunt.

ADOLESCENTIBUS autèm san- Aph.29.
guinis spuitiones , tabes , febres Sect. 2.
acutæ , comitiales , aliquè mor-
bi præcipuè tamèn prædicti.

HIS verò qui hanc ætatem su- Aph.30.
perârunt , crebri anhelitus , mor- Sect. 3.
bi laterales , pulmonum inflam-
mationes , lethargi , phreniti-
des , febres ardentes , diuturna
alvi profluvia , cholerae , inte-
stinorum difficultates & levita-
tes , sanguinis per ora venarum
quæ in ano sunt profusio.

AT senibus spirandi difficulta- Aph.31.
tes , destillationes tussim infe- Sect. 3.
rentes , stranguriæ , urinæ diffi-
cultates , articulorum & renum
dolores , vertigines , apoplexiæ ,
mali corporis habitus , totius
corporis pruritus , vigiliæ , alvi ,
oculorum & narium humidita-
tes , visûs hebetudines , grave-
dines , auditus graves.

SI cui convulsione aut disten- Aph.57.
tione nervorum detento , febris Sect. 4.
successerit , morbum solvit.

Aph. 6. **I**N morbo diuturno ciborum
Sect. 7. fastidium & sinceræ dejectiones,
malum denunciant.

Aph. 60. **S**I febre detento, nullo exi-
Sect. 7. stente in faucibus tumore, dere-
pentè suffocatio succedat, nèc
risi ægrè devorare queat, le-
thale.

Aph. 61. **S**I febre detento cervix per-
Sect. 7. vertatur, nequè devorare queat,
nullo in cervice tumore existen-
te, lethale.

Aph. 69. **E**T quibus dejectiones, si re-
Sect. 7. fidere permiseris, nequè move-
ris, veluti strigmenta subsident,
& si paucae sunt, parvus est mor-
bus, sin verò multæ, magnus,
iis, alvum infrà purgari condu-
cit. Quod si minimè purgatâ al-
vo sorbitiones exhibueris, quò
plures dederis, eò magis no-
cebis.

Aph. 71. **I**N febribus non intermitten-
Sect. 7. tibus excreationes lividæ, cruen-
tæ, biliosæ, & graveolentes,
omnes malæ. Cùm verò probè
secedunt, bonæ. Per alvum etiàm
& vesicam, & ubicunquè quod
secedit subsisterit minimè purga-
tum, malum.

IN febris non intermittenti- Aph. 74.
bus si externa frigeant, interna Sect. 7.
verò urantur, & sitis detineat,
lethale.

IN febre non intermittente si Aph. 75.
labrum, aut nasus, aut oculus, Sect. 7.
aut supercilium pervertatur, si
nequè videat, nequè audiat, &
jàm debilis sit, horum quicquid
acciderit lethale.

QUALIA etià quæ per vesi- Aph. 82.
cam, & alvum, & carnes ex- Sect. 7.
cernuntur, & sic ubi aliàs corpus
à naturâ recesserit, inspicere
oportet. Si parvum, parvus est
morbus, si multum, magnus, si
admodum multum, lethale istud
est.

EX morbo diuturno alvi de- Aph. 5.
ductio, mala est. Sect. 8.

DIVULSA omnia quidè m- Sent.
olestiam exhibent, & intensos do- 425.
lores circà initia creant, ac in- Coac.
terposito temporis spatio qui-
busdam sui sensum in memoriam
suggerunt. Gravissima autèm
sunt quæ circà thoracem fiunt,
præcipueque in periculum addu-
cunt.

ÆGRUM quoquè facile con- Sent.
493.
Coac.

verti oportet, & dùm surgit levem esse. At gravitas quæ totum corpus vel manus ac pedes premit, vitiosa est. Quod si cum gravitate digiti quoquè ac ungues lividi fiant, in propinquo mors est. At si omninò nigrescant, minùs quàm liventes periculum portendunt. Verùm tunc reliqua consideranda sunt. Etenim si facilè morbum sustinet æger, & aliud quiddam ex his quæ securitatem pollicentur se prodit, morbus in abscessum vergit, & denigratæ corporis partes decidunt.

Sent. SED nequè antè pubertatem
 §12. occupant hi morbi, pulmonum
 Coac. inflammationes, laterum dolores, podagræ, renum vitia, varix in tibiâ, fluor sanguineus, cancer non innatus, albicans vitiligo non cognata, defluxio in spinalem medullam, sanguinis per ora venarum profluvium, tenuioris intestini morbus (quem *cordapson* vocant) non à naturâ insitus. Horum morborum nullus antè pubertatem metuendus est. Ab anno autèm decimo quarto
 ad

ad quadragesimum secundum usque, natura omnis generis morborum corporis ferax est. Contra verò ab hâc ætate, ad annum sexagesimum tertium, nequè strumæ fiunt, nequè vesicæ calculus, nisi antea occupet, nequè in spinalem medullam defluxio, nequè renum morbus, nisi ex aliâ ætate sequantur, nequè sanguinis per ora venarum profluvium, nequè fluor sanguineus, nisi priùs adfuerit. Atquè hi morbi ad senectutem usquè absunt.

IN gravibus & præcipitibus malis distorqueri, velût qui vomitione conflictantur, malum Sent. 117.
est, quin & albæ alvi ejectiones Præd.
molestæ sunt. Quæ ex his prodeunt non viscosa, in vehementem mentis emotionem cum multo ardore agunt, videndumque est, nùm postea soporati àtorpescentes evadant? Qui ex his conflictantur, diutiùs laborant. In his animadvertendum est, nùm imminente judicatione arescentes difficultate spirandi teneantur?

Cels. l. i. ALII putant interesse non
Præf. quid morbum faciat, sed quid
tollat.

Cels. l. i. MORBI non eloquentiâ, sed
Præf. remediis curantur.

Cels. l. i. INTEREST enim fatigatio mor-
Præf. bum, àn sitis, àn frigus, àn ca-
lor, àn vigilia, àn fames fece-
rit? àn cibi vinique abundantia,
àn intemperantia libidinis?

Cels. INITIA morborum primùm
l. 2. c. 16. famem sitimque desiderant, ipsi
deindè morbi, moderationem,
ut nequè alius quàm expedit, ne-
què ejus ipsius nimium sumatur.
Nequè enim convenit juxtà me-
diam protinùs satietatem esse.
Quod si sanis corporibus etiàm
inutile est, ubi aliqua necessitas
famem fecit, quantò inutilius
est in corpore ægro? Nequè ul-
la res magis adjuvat laborantem
quàm tempestiva abstinentia.

Cels. 1. NON dubium est quin vix
3. c. 2. quisquam, qui non dissimula-
vit, sed per hæc maturè morbo
occurrit, qui non ægrotet.

Cels. 1. NEQUE inter magnos dolores,
3. c. 6. nequè incremente morbo tutum
est ægrum impleri cibo, sed ubi

inclinata jam in melius valetudo est.

CUM verò in summo incremento morbus est, utiquè non antè diem quartum magnâ siti antecedente, frigida aqua copiosè præstanda est, ut bibat etiàm ultrà satietatem, ut cùm jam venter & præcordia ultrà modum repleta sunt satisque refrigerata, vomere debet. Quidam nè vomitum quidè exiguunt, sed ipsâ aquâ frigidâ tantum ad satietatem datâ pro medicamento utuntur. Ubi utrumlibet factum est, multâ veste operiendus est, & collocandus ut dormiat, ferèque post longam sitim & vigiliam, post multam satietatem, post infractum calorem, plenus somnus venit; per quem ingens sudor effunditur: idque præsentissimum auxilium est: sed in his tamen in quibus præter ardorem nulli dolores, nullus præcordiorum tumor: nihil prohibens, vel in thorace, vel in pulmone, vel in faucibus, non ulcus, non defectio, non dejectio, non profluvium alvi fuit. T ij

Cels.

l.3.c.7.

Vide ÆTATEM. ACUTUM
MORBUM. FEBREM. MEDICUM.
SUDORES. TEMPUS.

MORBUS REGIUS.

Aph. 62. QUIBUS per febres morbus Re-
Sect. 4. gius antè diem septimum obor-
tus fuerit, malum.

Aph. 63. QUIBUS per febres die septimo,
Sect. 4. aut nono, aut undecimo, aut
decimo quarto, morbus Regius
obortus fuerit, bonum, nisi præ-
cordia dextra dura fuerint, alio-
qui minimè bonum.

Aph. 73. QUI morbo Regio laborant,
Sect. 5. non multum flatulenti sunt.

Cels. 1. 2. PERICULOSUM est etià post
c. 4. arquatum morbum, febrem oriri.

Vide ICTERUM.

MORSUS VENTRICULI,

Vide EXCREMENTUM.

MUTATIO.

Sent.

43.

Præd.

lib. I.

CELERES extremorum corpo-
ris ad utraque extrema permuta-

tiones, perniciem denunciant.

NEQUE quidquam est stultius, Cels. l. 1.
quàm quale quid vivo homine Præf.
est, tale existimare esse mo-
riente, imò jàm mortuo.

NEQUE ex salubri loco in gra- Cels. l. 1.
vem, nequè ex gravi in salu- c. 3.
brem transitus satis tutus est.

NEQUE verò ex multâ fame, Idem.
nimia satietas; nequè ex nimîâ
satietate fames, idonea est.

NEQUE ex nimio labore subi- Idem.
tum otium, nequè ex nimio
otio subitus labor, sinè gravi
noxâ est.

MALI etiàm morbi signum est Cels. l. 2.
nimis celeritèr emacrescere. c. 4.

Vide CALOREM ET FRIGUS.

M U T U S.

Vide FEBRES.



N A T U R A.

Celf. l. 1. c. 3. **A**NTE omnia scire convenit naturam corporis : quia alii graciles , alii obesi sunt ; alii calidi , alii frigidiores , alii humidi , alii sicciores ; alios adstricta , alios resoluta alvus exercet.

Idem. **R**ARO quisquam non aliquam partem corporis imbecillam habet.

Celf. l. 2. c. 8. **S**CIRE licet , inter ea quæ ars adhibet , naturam plurimum posse.

Celf. l. 2. c. 18. **P**ERTINET ad rem , omnium proprietates nosse.

Vide TEMPERAMENTUM.
TEMPUS. HYGIEINEM.

N A R E S.

Sent. 215. **N**ARIUM rubores , alvi liquidæ & diffuentis , sunt indicia.
Coac.

N E R V U S.

Sent. 504. **P**RÆCISUS nervus , aut quod in genâ est tenue , aut præputium , non coalescit.
Coac.

NERVI quicumque crassi vulnus accipiunt , ut plurimum claudos reddunt , præcipuèque si obliquum vulnus fuerit , ac in musculorum capitibus , præsertim femorum.

Sent.
508.
Coac.

N O M Æ.

NOMÆ verò maximæ sunt lethales , quæ putredines altissime descendentes habent , suntque nigerrimæ & siccissimæ. Vitiøsæ quoque & in periculum præcipitant , quæ saniem nigram reddunt. At albæ & mucosæ putredines , mortem quidem afferunt minùs , sed potius recidivas faciunt , & diutiùs perseverant. Herpetes autem ex his quæ depascendo serpunt , minimum habent periculi , àt secundum abditos caneros difficiliùs tolluntur. Ac his omnibus febrem uno die succedere confert , & pus quàm maximè candidum & crassum. Prodest quoque in altè conditis & nigris putredinibus , nervi syderatio , aut ossis , aut amborum. Pus enim multum in

Præd. 1.
2. p. 98.

syderationibus effluit, & putredines liberat.

Vide P U S. U L C U S.

NYCTALOPIA.

Præd. lib. 2. p. 110. QUOS nyctalopes nuncupamus, qui nocturnè cernunt, hi morboprehenduntur juvenes, aut pueri, aut etiam adolescentes, & spontè evadunt, partim quidè quadragesimo die, partim verò septimo mense, quibusdam etiam toto anno perseverat. Et tempus quidè æstimari debet, & magnitudinis morbi, & ægri ætatis ratione adhibita. Hos juvant quidè supervenientes abscessus & ad internas partes tendentes, qui tamèn per juventutem non admodum contingunt. At nequè mulieres, nequè virgines quibus menses apparent hoc morbo tentantur. Qui verò ex diuturno lachrymarum fluxu nyctalopes fiunt, eos interrogare oportet, nùm quis dolor, antè istorum indicationem, caput occupaverit?

O C U L I.

QUIBUS in febribus aut aliis Aph. 52.
 morbis oculi ex voluntate Sect. 4.
 illachrymant, nihil absurdi acci-
 dit. At quibus præter voluntatem
 absurdius.

OCULORUM dolores, meri Aph. 31.
 potio, aut balneum, aut fo- Sect. 6.
 mentum, aut venæ sectio, aut
 medicamentum purgans exhibi-
 tum solvit.

OCULORUM dolores exhibitâ Aph. 46.
 meri potione, & copiosæ aquæ Sect. 7.
 calentis balneo, venæ sectione
 curato.

QUIBUS oculi in morbis spontè Aph. 2.
 illachrymant, bonum, quibus Sect. 8.
 verò non spontè, malum.

OCULORUM claritas, àc Sent.
 eorum album ex nigro aut livido 227.
 clarum fieri, ad judicationem Coac.
 confert. Ac quò celerius clares-
 cunt, eò celeriore judicatio-
 nem, àt tardiùs tardiore signi-
 fificant.

CALIGINE obducti oculi, aut Sent.
 eorum album rubescens, aut li- 218.
 vescens, aut nigris venis refer- Coac.

rum , nihil probi præfert. Malum quoquè est & lucem refuge-
re , aut illachrymare , aut per-
verti , atquè ex his alterum mi-
norem esse perniciem denunciat ,
& oculos crebrò disjicere , gra-
mias ac parvas sordes ipsis adhæ-
rescere , aut albescentem humo-
rem concretum & tenuem (*ægida*
nominant) habere , & eorum al-
bum augeri , nigrum autèm im-
minui , aut nigrum à superiore
palpebrâ contegi. Vitiosa quoquè
est oculorum cavitas , & vehe-
mens oculi foràs expressio , ac
splendoris elisio , adeò ut pupilla
extendi nequeat , & cilia retorta ,
ac fixi oculi , ac continentèr con-
niventes , coloris immutatio ,
aut palpebras per somnum non
committere , perniciem osten-
tat. Quin & distortus oculus ma-
lo est.

Sent.

219.

Coac.

IN febre ortus oculorum rubor ,
diuturnam alvi malignitatem
præfert.

Sent.

220.

Coac.

ERUMPENTES circà oculos emi-
nentia , dùm ægri ex morbo re-
creantur , prorumpentis alvi
spem faciunt.

CUM oculorum perversione, Sent.
 febribus & lassitudinis sensu de- 221.
 rento, rigor perniciem minatur. Coac.
 Atque in hujusmodi casibus so-
 porati, malum denunciant.

OCULI hebescentes & obtusi, Sent.
 concreti ac caligantes, malum 225.
 portendunt. Coac.

OCULORUM hebetatio cum Sent.
 animi defectione, promptam con- 226.
 vulsionem denunciat. Coac.

IN præcipiti malo rectus ocu- Sent.
 lorum obtutus ac motus pernici- 227.
 tas, somnus turbulentus, per- Coac.
 vigiliū, interdumque sangui-
 nis ex naribus stillationes, nihil
 boni denunciant.

OCULORUM caligines, crebris Sent.
 apparentibus mensibus, solvun- 552.
 tur. Coac.

HEBESCENTES oculi & obtusi Sent.
 improbandi sunt. Quin & fixi ac 46. l. i.
 caligine obducti malum porten- Præd.
 dunt.

EX recursatione dolorum in Sent.
 lumbis, oculi perversio & distor- 69. l. i.
 tio, malo est. Præd.

IN præcipitibus malis oculi Sent.
 obferatio, aut perfractio, malo 84. l. i.
 est. Præd.

Sent. 124. lib. 1. Præd. lib. 2. Præd. p. 101. ad 103.

QUIBUS dùm convelluntur oculi, fixi & immoti splendent, iis mens è fede constantiæ deturbatur, & diutiùs morbum trahunt.

OCULI gramiosi optimum habent secessum, si simul lachryma & gramia & tumor cœperint, aut si lachryma gramia permixta, nequè vehementer calida fuerit, gramia verò alba & mollis, & tumor levis ac solutus. His etenim sic se habentibus notum oculus conglutinabitur, ut dolorem non sentiat: isque casus minimè periculosus, minimèque diuturnus fuerit. At si lachryma multa & calida, cum paucissimâ gramia & exiguo tumore, idque ex altero oculo profluat, valde diuturnum id quidem sed sine periculo fit, idque lippitudinis genus, doloris expers est. Et in his præcipuè judicatio consideranda est, quæ prima quidem fit circa vigesimum diem. Quod tempus si superat, quadragessimus dies expectandus est, aut si nequè in his desinit, in sexaginta diebus solvitur. At toto corpore ad gramiam attentum esse oportet.

ret, nūm in digito misceatur, & alba ac mollis fiat, idque præcipuè sub judicationis sensus? Tūm namquē ubi finitur, id evenire solet. Quod si hæc utrumque oculum invaserunt, majus est ulcerum periculum, sed brevī solventur. Gramiæ autē siccæ vehementes dolores afferunt, brevī tamē solvuntur, nisi oculus vulnus acceperit. Tumor verò magnus, doloris expers & ficeus, sinè periculo est. Quod si cum dolore est, ficeus quidē malus, metusque est nè oculum exulceret ac palpebræ coeant. Formidabilis quoquē est, ubi cum lachryma conjunctum dolorem habet. Nām si lachryma calida & falsa profluit, in pupillā & palpebris exulcerationis periculum est. At si tumor quidē constitierit, lachryma verò multa diutiùs effunditur, & gramia tenent, viris quidē palpebrarum eversionem rectè prædixeris, at mulieribus & pueris exulcerationem & palpebrarum eversionem. Si verò gramia pallidæ aut lividæ fuerint, lachrymaque

multa & calida, caput ardor occupet, ex temporibus ad oculum dolor tendat, insomniæque his accesserit, ulcus in oculo factum esse necesse est, ac, ut rumpatur, metus est. Juvat autem succedens febris, aut dolor in lumbos firmatus. His verò futurorum prædictionem rectè institues, si & temporis & eorum quæ ex oculo fluunt rationem inieris, tum etiã gravissimorum dolorum, tum vigiliarum. Sed ubi oculum introspicere licet, si quidẽ ruptum inveneris, & per rimam pupilla extiterit, malum significat, nèc facilè restituitur. Quod si etiã putredo subit, nulli ampliùs est usui. Reliqua verò ulcerum genera prædicere licet, & locorum putredines & altitudines intuenti. Pro ulcerum magnitudine cicatrices fieri necesse est. Quibus igitur rumpuntur oculi, posteaque adeò exstant ut pupilla loco mota esse videatur, iis nèc ullo tempore, nequẽ arte, ut videant, opem ferre licet. At parvæ pupillarum dimotiones restitui possunt, dùm

nè quid mali accesserit & juvenis sit æger. Ulcerum verò cicatrices , si non aliud malum subsit , omnes & à tempore & ab arte juvari posse existimandæ sunt , ac præcipuè quæ recentissimè & in juvenum corporibus contractæ sunt. Ex locis autèm insignem facit noxiam pupillæ acies si exulceretur , secundùm eam id quod est suprà supercilia , deindè verò quicquid his locis fuerit proximum. Pupillæ quoquè cæsum , aut argenteum , aut cæruleum colorem nactæ improbandæ sunt. His aliquantùm meliores existimandæ sunt , quæ aut minores , aut ampliores apparent , aut angulos habent , sive id ex manifestâ causâ , sive spontè contingat. Caligines & nubeculæ , ac subalbicantes cicatrices (*ægides* dictæ) exteruntur ac evanescunt , nisi eo in loco vulnus aliquod subortum sit , aut illic antea cicatricem aut unguem esse contigerit. Quod si in oculi nigro resplendens cicatrix orta sit , nigri aliquid dealbat , ita ut si diutiùs perseveret & aspera &

crassa, etiàm vestigium aliquod postea relinquat, judicationes verò non secùs ac in febribus scripti, ità & hìc se habent. Sed & observatis signis, pro genere quidèm lippitudinum, prædictionem instituas licet. Nempè diurnas lippitudines fore, ubi pessima signa affuerint, velùt in singulis descriptum est. Breves verò ubi optima signa comparuerint, easque septimo die aut proximis diebus finiendas prædicere, ac alioquì in tuto esse existimare oportet. Quibus autèm levamentum adfuerit, si id nequè judicatoriis diebus, nequè cum bonis signis contingat, in iis recidivæ metuendæ sunt. Imprimis verò in oculorum affectibus, urinæ status in considerationem adhibendus est. Occasio namque præceps est & lubrica.

Præn. OCULI si lucem refugiunt aut
 pag. 37. illachrymant præter voluntatem,
 aut alter ex iis minor sit, aut
 quæ in iis alba esse debent rubescunt,
 aut in iisdem venulæ livescunt,
 aut nigricant, aut lippen-
 tium oculorum fordes circa
 eorum

eorum aciem appareant , aut etiam assidue mobiles , aut tumidi , aut vehementer cavi fuerint , aut eorum aspectus squalidus & minimè lucidus , aut totius faciei color immutatus , hæc omnia mala , perniciosaque existimanda. Quin etiam per somnum an ex oculis aliquid subappareat spectare oportet? Ubi namque non commissis palpebris ex albo quid subapparet , id si nequè alvi profluvium , nequè medicamentum purgans expressit , nequè ita dormire consueverit æger , prævum est indicium & lethale admodum ; quod si pervertatur aut corrugetur palpebra , aut livescat , aut palle scat , itèmq; labrum , aut nasus , cum alio aliquo signo , mortem in propinquo esse sciendum. Lethale quoque labra resoluta , pendentia , frigida , & exalbida esse.

Vide CONVULSIONEM. DOLOREM CAPITIS ET LUMBORUM. LIENEM. LIPPITUDINEM. PUERUM.

OPHTALMIA.

Aph. 17. OPHTALMIA laborantem ab
Sect. 6. alvi profluvio corripitur, bonum.

Vide O CULUM.

OMENTUM.

Sent. QUIBUS omentum procidit, ut
502. putrescat necesse est.
Coac.

O S.

Sent. PALLIDIS, gracilibus & crebra
271. oris salivatione laborantibus, in
Coac. somnis sudores boni sunt. Nempè
quidè & horum plurimos su-
dore levare non improbandum.
Quibus si dolores ad inferiora
decumbant, toleratu faciles exi-
stunt.

Sent. ORIS ventriculi dolor cum
72. præcordiorum contensione, at-
lib. 1. què etià capitis dolor, mali-
Præd. gnum quidpiam & suspiciosam
quamdam affectionem indicat. In
his certè animadvertendum est
nùm derepentè moriantur, ve-
lùt in *Dysode* evenit, cui urinæ
valdè fermentatæ & prærubræ
aderant?

ORTS perversiones quæ nulli corporis parti consentiunt, celeritèr aut suâ sponte, aut ex necessitate sedantur, in reliquis verò corporis syderationibus, quibus præter motionis impotentiam pars corporis affecta extenuatur, ii restitui non possunt. At quibus colliquationes non succedent, ii profectò sanitatem consequentur. Tempus autem quo ista contingent prædicere licet, ad morbi vim & tempus, & hominis ætatem, ac anni tempestatem attendendo, ubi in animum induxeris vetustissimos morbos, & pessimos, & qui sæpiùs repetunt, eosque qui in corpore sunt admodum senili, non facilè cedere. Est etiàm Autumnus & Hyems Vere & Æstate ad eos morbos tollendos minùs accommodatus.

Vide J A C E R E.

O S S A.

Ex syderatione os abscedit.
NEQUE corporis os quodcumque resectum, nequè cartilago augetur.

Aph. 77.

Sect. 7.

Sent.

550.

Coac.

Sent.
501.
Coac.

Ossium capitis fracturæ cognitu difficillimæ , quæ circà futuras sunt. Fiunt autèm potissimum à gravibus & rotundis telis , aut ex his quæ ex opposito feruntur , nequè ex plano. At ossa , de quibus fissa sint necnè ambigitur , sic discernas , si in utramque maxillam albucum aut ferulam manducandam exhibueris , atquè animum advertere jusseris , nùm os aliquod strepere videatur. At processu temporis , fissa quidèm septimo die , partim verò decimo quarto , partim etiàm aliàs , sui significationem edunt. Nàm vel caro ab osse abscedit , aut os livescit , aut dolores ex saniei influxu excitantur , eaque jam remediis ægrè cedunt.



PALPITATIO.

QUÆ contingunt in febre cit- Sent.
cà ventrem palpitationes , 295.
mentis emotiones adferunt. Quin Coac.
& sanguinis ex naribus proflu-
vium , cum horroris sensu inter-
dùm accedit.

QUO S palpitationes in totum Sent.
occupant , nùm voce defecti in- 347.
tereunt ? Coac.

QUIN & quæ contingunt circà Sent.
ventrem palpitationes , cùm præ- 144.
cordiorum contentione oblongâ lib. 1.
& intumefcente , sanguinis ex Præd.
naribus profluvium denunciant ,
idque , quandoquè cum horroris
sensu.

Vide CERVICEM.

PALLOR.

Vide CONCIPERE. COLOREM.
FACIEI. DOLOREM.

PALPEBRA.

Vide JACERE. OCULOS. SOM-
NUM.

P A R T E S.

Vide EXTENUATIONEM.

P E C T U S.

Sent. D O L O R in pectore fixus cum
 71. torpore malum denunciat. Hi si
 lib. 1. subortâ febre exæstuent, celeri-
 Præd. tẽr mortem oppetunt.

P H L E B O T O M I A.

Aph.22. RUPTA quæ ex dorso ad cubiti
 Sect. 6. articulos descendunt, venæ se-
 ctio solvit.

Aph.48. URINÆ stillicidium (*strangu-*
 Sect. 7. *riam* vocant) & meiendi difficul-
 tatem, vini meri potio & venæ
 sectio solvit. At secundæ sunt in-
 ternæ.

Cels. SANGUINEM incisâ venâ mitti
 1.2.c.10. novum non est: sed nullum penẽ
 morbum esse in quo non mitta-
 tur, novum est.

Cels. I N mittendo sanguinem non
 1.2.c.10. tam annos Medicus numerare,
 quàm vires ægrotantis æstimare
 debet.

CUM sit minimè crudo sanguis mittendus, tamèn ne id quidèm perpetuum est, nequè enim semper concoctionem res expectat: ergò si ex superiore parte decidit aliquis, si contusus est, si ex aliquo subito casu sanguinem vomit: quamvis paulò antè sumpsit cibum, tamèn protinùs ei materia demenda est: idèmq; etiàm in aliis repentinis casibus dictum fit. Cels. 1.2.c.10.

QUOD si vehemens febris urget in ipso impetu ejus sanguinem mittere, hominem jugulare est. Expectanda ergò intermissio, & ista medicina ferè in biduum dividenda, satiùs enim est primò levare ægrum, deindè perpurgare, quàm simul omni vi effusâ fortassè præcipitare. Cels. 1.2.c.10.

INCIDENDA ad medium vena est, ex quâ cum sanguis erumpit: colorem habitumque ejus oportet attendere: nam si is crassus & niger est, vitiosus est, ideòque utilitèr effunditur: si rubet & pellucet, integer est: eaque missio sanguinis adeò non prodest, ut etiàm noceat: protin-

nūsq̄ue is supprimendus est.

Celf. SEMPER antè , finis faciendus
lib. 2. est , quàm anima deficiat.

cap. 10. *Vide* SANGUINEM. EVACUA-
TIONEM. OCULOS. PARTUM.
VULNUS. URINAM. CHIRUR-
GUM. PHRENITIDEM.

PHRENITIS.

Aph. 1. QUI suprà quadragesimum
Sect. 8. annum phrenitici evadunt , ii
verò minimè convalescunt. Mi-
nori namque periculo sunt ob-
noxii , quorum naturæ & ætati
morbus familiaris fuerit.

Sent. QUIBUS adsunt superiorum
69. partium tenues sudores cum per-
Coac. frictionibus , nèc finè febre , ii
corporis incontinentiâ & phre-
nitide vexati , præceps pericu-
lum denunciant.

Sent. QUÆ in phreniticis manifesta
90. apparent insomnia , probanda
Coac. sunt.

Sent. IN phrenitide albicans dejectio
91. ac torpor , malum denunciat.

Coac. His succedens rigor , pessimus.

Sent. IN phreniticis cùm omnia cir-
92. cà initia moderatè & sedatè se
Coac. habeant ,

habeant, ac subindè permutentur, malum denunciatur.

IN vehementi & furiosâ mentis emotione, accedentes tremores, exitio sunt. Sent. 93. Coac.

VEHEMENTER & acutè mente emoti, si febris iterùm repetat, phrenitici evadunt. Sent. 95. Coac.

PHRENITICI parùm bibunt, ex levibus strepitibus facilè irritantur, tremuli sunt, aut convulsionibus tentantur. Sent. 96. Coac.

IN intensâ phrenitide tremores lethales. Sent. 97. Coac.

DESIPIENTIÆ quæ jam admodùm fractis & debilitatis viribus succedunt, pessimæ sunt. Sent. 100. Coac.

CREBRÆ in phreniticis permutationes, convulsiones denunciant, ac pravæ sunt. Sent. 101. Coac.

CREBRÆ in phreniticis cum perfrictione sputationes, nigrorum vomitionem prænuntiant. Sent. 102. Coac.

QUI inter initia sopore detenti, capitis, lumborum, præcordiorum, cervicis dolore ac insomniâ conflictantur, eos considerare oportet, nùm sint phrenitici? In his narium stillatio perniciem ostentat, idque præcipuè si Sent. I. Præd. lib. I.

quarto, inter initia, die contingat.

Sent. 8. QUIN & quæ in phreniticis
Præd. manifesta apparent in somniapro-
lib. 1. videnda sunt.

Sent. 9. VEHEMENTES phrenitides in
Præd. tremorem delinunt.

lib. 1. IN phreniticis initio modera-

Sent. tum esse, sedatum & facilem,

12. crebrò verò permutari malum

Præd. est. QUIN & sputatio frequens
lib. 1. mala est.

Sent. IN gravitèr & acutè mente

15. emotis, si febris iterum repetat

Præd. cum sudore, phrenitici evadunt.

lib. 1. QUÆ paucò tempore feroces

Sent. sunt mentis emotiones, in feri-

26. nas evadunt.

Præd. CREBRÆ in phreniticis sputa-

lib. 1. tiones cum perfrictione, non

Sent. longè postea nigrorum vomitum

31. affuturum indicant.

Præd. Ex phreniticis alii hilares, alii

lib. 1. tristes sunt, alii faciliùs conti-

Cels. nentur & intrà verba desipiunt,

lib. 3. alii insurgunt & violentèr quæ-

c. 18. dam manu faciunt, atquè ex his

ipsis, alii nihil nisi impetu pec-

cant, alii etiàm artes adhibent,

summamque speciem sanitatis in-

captandis malorum operum oc-

casionibus præbent , sed exitu deprehenduntur. Ex his autem, eos, qui intrâ verba desipiunt, aut levitèr etiâ manu peccant, onerare asperioribus coercitionibus supervacuum est: eos verò qui violentiùs se gerunt, vincere convenit, ne vel alteri, vel sibi noceant. Nequè credendum est si vinctus aliquis dùm levâri vinculis cupit, sanum jam se fingat, quânvîs prudentèr & miserabiliter loquatur, quoniam is dolus insanientis est. Adversùs omnium sic insanientium animos gerere se pro cuiusque naturâ necessarium est.

ASCLEPIADES perindè Cels. lib. 3. ac si trucidentur, rationem hanc c. 18. secutus, quod nequè insania esset nisi cum febre intentâ, nequè sanguis nisi in remissione ejus, rectè mitteretur.

PHRENITICIS somnus difficilis Cels. lib. 3. & præcipuè necessarius est; sub hoc enim plerique sanescunt. c. 18.

Vide **ÆTATEM. DEMENTIAM. INSANIAM. JACTATIONEM. PLEURITIDEM. TEMPUS.**

P L E U R I T I S.

Aph. 8. **Q**U I morbo laterali laborant,
Sect. 5. nisi intrà dies quatuordecim re-
purgentur, iis in suppurationem
deponitur.

Aph. 16. **M**O R B O laterali aut pulmo-
Sect. 6. num inflammatione conflictato,
succedens alvi profluvium, ma-
lum.

Aph. 33. **Q**U I acidum eructant, non
Sect. 6. admodum morbo laterali ten-
tantur.

Aph. 11. **E**x morbo laterali pulmonis
Sect. 7. inflammatio, malo est.

Sent.

113.
Coac. **A**D lateris dolorem insupèr ac-
cedente strangulatu suppuratio-
nis futuræ spes est.

Sent.

379.

Coac.

IN morbo laterali, quibus
circà initia in totum purulentæ
sunt sputiones, ii tertio die aut
quinto moriuntur. Quos si supe-
rent, nec longè meliùs habue-
rint, septimo, aut nono, aut
undecimo, suppurati fiunt.

Sent.

380.

Coac.

QU I B U S suprà aurem rubor
contingit, nequè alitèr quàm
morbo laterali affecti incalef-
cunt, alvusque biliosa & graveo-

lencia exturbat, ii vigesimo & quadragesimo die periculum subeunt, quos si superaverint, servantur.

MORBI laterales sicci & in quibus nihil expuitur gravissimi sunt. Metuendi quoque in quibus dolores ad superiora tendunt. Sent. 381. Coac.

MORBI laterales, graviores, qui sine divulsionibus, quam qui cum divulsionibus contingunt. Sent. 382. Coac.

QUIBUS in morbo laterali lingua circa initia biliosa est. Hi intra septimum judicantur, quibus verò tertio aut quarto die, circa nonum. Sent. 383. Coac.

QUOD si bulla aliquantulum livescens in linguâ appareat initio, qualis excitatur ferro candente in oleum intincto, difficilior fit solutio, & judicatio quidem ad decimum quartum diem deducitur. Sanguinem autem plurimum expuunt. Sent. 384. Coac.

SPUTUM verò in morbo laterali ubi maturescere & expui tertio die cœperit, celeriores solutiones facit, quòd si posterius, tardiores. Sent. 386. Coac.

IN morbo laterali affectis, do-

lores & alvum emolliri utile est, sputa colorari, nullos in pectore strepitus fieri, urinam rectè procedere. Quibus contraria, molesta sunt, sputumque dulcescere.

Sent.

387.

Coac.

At verò biliosi simul & sanguinci morbi laterales, ferè nono die aut undecimo judicantur, ac maximè sanescunt. Quibus autèm in morbo laterali, initio quidèm dolores leves sunt, quinto verò aut sexto die ingravescent, ferè ad duodecimum perveniunt, raròque servantur, sed præcipuè septimo ac duodecimo die periculum subeunt. Quòd si bis septem evaserint, servantur.

Sent.

388.

Coac.

QUIBUS in morbo laterali plurimus ex sputo strepitus in pectore sonat, & vultus demissus est, oculusque aurugine suffusus, & caligine obductus, in his mors expectanda est.

Sent.

389.

Coac.

QUI ex morbo laterali suppurantur, in quadraginta diebus post ruptionem pus spuitione rejiciunt.

Sent.

389.

Coac.

DENSA & exercitationi dedita corpora, citiùs ex morbo laterali & pulmonis inflammatione in-

tereunt, quàm quæ sine exercitatione degunt.

LATERIS dolore citrà inflammationem affecti, cum perturbationibus, tenuibus, aut moderatis in phrenitidem labuntur. Sent. 411. Coac.

LATERIS dolor cum diuturnâ febre, puris educationem fore denotat. Sent. 421. Coac.

QUI subindè horrore corripiuntur, ad suppurationem deveniunt. Quin etiâ febris talem suppurationem ducit. Sent. 422. Coac.

QUOS ex lateris dolore cibi fastidia comitantur, iis os ventriculi aliquantulum dolet, & sudoribus diffluunt. Ubi autem facies ruboribus velût efflorescit, & alvus est liquidior, pus in pulmonibus collectum habent. Sent. 423. Coac.

LATERIS dolores in febribus levitè firmatos, & absque ullâ significatione, venæ sectio lædit, sive aversum à cibis animus, sive sublata præcordia æger habeat. Quin etiâ in corporis perfriktione torpescences non sinè febre, sanguinis deductio lædit, & cùm videantur melius habere, moriuntur. Sent. 491. Coac.

Vide DOLOREM LATERIS ET
PULMONUM. SPUTA,

PODAGRA.

Aph.29. MULIER podagrâ non laborat,
Sect. 6. nisi cùm menstrua defecerint.

Aph.30. PUER podagrâ non tentatur
Sect. 6. ante Venereum usum.

Aph.49. PODAGRICI morbi, intrâ
Sect. 6. diem quadragesimum depositâ
inflammatione, subsistunt.

Aph.55. PODAGRÆ vitia Vere & Au-
Sect. 6. tumno ferè moventur.

Præd. AT de his qui podagrâ tentan-
lib. 2. tur ista nobis dicenda videntur.

pag 92. Qui in senectute tofos aut callos
in articulis induratos habent,
aut laboriosè vitam tolerant,
cum alvo siccâ ii sanè omnes
(ut sentio) humanâ arte sana-
ri nequeunt. His certè succe-
dentes intestinorum difficulta-
tes optimè medentur, quîn &
quæcumque aliæ colliquationes
infernæ, eos valdè juvant. Juve-
nis verò cui necdùm circum ar-
ticulos calli induruerunt, cuique
victûs ratio, curæ est, ad labo-
rem est impiger, alvumque ha-

bet, vitæ instituto, probè cedentem, is sanè prudentem nactus Medicum, sanus evadet.

PODAGRICIS equitare alienum est. Cels. 1.4.c.24.

Vide EUNUCHUM.

P O T U S.

POTIO non ultrà danda est Cels. quàm ut vitam sustineat, optimaque est quæ urinam movet. 1.3.c.21.

VINUM omnibus, dùm febris, Cels. dùm inflammatio est, alienum est. 1.3.c.21.

Vide HYGIEINEM.

P R Æ C O R D I A.

Vide HYPOCONDRIA.

P R Æ G N A N S.

UTERUM gerentibus purgantia medicamenta exhibenda, si Sect. 5. Aph.29. humor impetu feratur ad excretionem, quarto mense, & ad septimum usquè, sed his minùs. In majoribus autèm & grandioribus foetibus subtimidè se gere-re oportet.

Aph. 30. MULIEREM utero gerentem ,
Sect. 5. morbo quopiàm acuto corripi ,
lethale.

Aph. 31. MULIERI uterum gerenti venaa
Sect. 5. secta abortionem facit , idque
potissimum si fœtus grandior
fuerit.

Aph. 45. QUÆ mediocri corporis habitui
Sect. 5. præditæ fœtus bimestres aut tri-
mestres absquè occasione mani-
festâ abortionem excludunt , iis
uteri acetabula (græci *Coryledones*
vocant) mucoris plena sunt ,
nequè præ pondere fœtum conti-
nere possunt , sed abrumpuntur.

Aph. 51. QUÆ utero gerunt , iis uterum
Sect. 5. os connivet.

Aph. 55. QUÆCUMQUE utero gerentes
Sect. 5. febribus detinentur , & vehe-
mentèr extenuantur citrà mani-
festam causam , eæ difficultèr &
cum periculo pariunt , aut in
abortionis periculum incidunt.

Aph. 59. SI mulier non concipiat , scire
Sect. 5. autèm expetit nùm conceptura
sit , vestibus undiquè obvolutæ
per inferna suffitum apponito ,
& si odor quidèm ad nares & os
usquè per corpus tibi pervadere
videatur , ipsam non ex sese in-
fœcundam esse scito.

MULIERI si lac è mammis pro- Cels.
luit, imbecillum est quod intus l.2. c.7.
gerit, duræ mammæ sanum il-
lud esse tentantur.

Vide ABORTUM. GRAVIDAM.
CONCIPERE.

PRÆDICTIO.

PRÆDICTIONES Medicorum Præd.
referuntur permultæ, tum præ- lib. 2.
claræ, tum admiratione dignæ, pag. 83.
quales nequè equidèm prædixi, & 84.
nequè quemquam qui prædiceret
audivi. Ex quibus quædam sunt
hujusmodi. Hominem qui Me-
dico ejus curam habenti, & cæ-
teris periclitari videretur, in-
gressum verò alium Medicum de
eo pronunciasse, hunc non peri-
turum, verùm oculis captum
fore. Et ad alium qui prorsus
malè affectus existimabatur, in-
gressum prædixisse, eum quidèm
ex morbo relevaturum verùm
mancum futurum: & in alio qui
ne superesse quidèm posse exi-
stimabatur pronunciasse ipsum
quidèm sanum fore, àt pe-
dum digitos denigratos putri-
laginem contracturos. Atquè

talia multa id genus prædicta
narrantur. Aliud quoque præ-
dictionis genus ad eos qui in
auctione & negociatione ver-
santur spectat, cum partim qui-
dè m mortem, partim verò in-
saniam, quibusdam etià va-
rios morbos prædicunt, ad hæc
omnia quæ instant, & retroactis
temporibus evenerunt vatici-
nantur & vera efferunt. Alia
præterea prædictionum forma
esse dicitur, quæ circa athletas
eosque qui propter morbos se
exercent & laboribus fatigant,
versatur, & dignoscit si quid in
cibo sit ab his prætermissum aut
mutatum, aut potu pleniore
utantur, aut deambulationem
intermittant, aut quid circa res
Venereas agitent. Quorum om-
nium nihil eos fugit, nè vel si
pusillum quidè quis Medico
non paruerit, cujus exactam co-
gnitionem non habeant. Atque
hæc omnia narrantur prædictio-
num genera. Ego autem hujusmo-
di vates esse nolo, signa verò de-
scribam ex quibus quis sanos fore
aut morituros homines conjectu-
ra cognoscat, eosque qui tum

brevi , tùm longiore temporis intervallo fani sunt futuri aut morituri. Scriptum est autem à nobis de his quæ abscedunt & quomodo eorum quidquam existimare oporteat. Ac eos quidèm existimo qui claudicationes & cætera id genus prædicunt , si modo quid mentis habuerunt , firmato jam morbo eas prædictiones fecisse , & cùm manifestum foret id quod abscedere natum est intrò recurrere non posse , idque longè potiùs quàm antè abscessus initia. In spem autem adducor & alia prædicta esse , mortesque & morbos & insanias , eaque mihi videntur ità accidisse , nihilque eorum non facilè prædici posse videtur , si quis modò ad ea mentis acie velit contendere. Imprimis namque quotus quisque est qui aquâ inter cutem aut tabe laborantes non novit ? Deniquè deliraturi nè longè quidèm latere possunt eos qui norint quibus aut innata est à congenita ad hunc morbum propensio , aut qui jam antea insani erunt. Si namqu hujusmodi

temulenti fuerint , aut carnibuss
vescantur , aut pervigilatione ,
aut frigore , aut calore incon-
sultè utantur , ex eo vitæ genere
magna spes est ipsos deliratu-
ros. Ac eos qui per ora venarum san-
guinem fundere sunt soliti , si
quis per Hyemem liberaliore po-
tu usos aut benè coloratos con-
spiciat , hic facillè prædixerit ,
ipso Vere erupturi sanguinis ma-
gnam spem affore , adeò ut sub
Æstatem decolores & aquosi eva-
dant. Nempè sic decet eum qui
hæc omnia addidicerit prædi-
cere , si hujusmodi contentio-
num præmium reportare deside-
rat. Ex his namque quæ scripta
sunt & mortem , & insaniam , &
bonum corporis habitum prædi-
cere licet. Quin & alia id genus
multa referre possem , nisi in
animo esset , quæ sunt cognita
facillima scribere. Quod si quis
me audiat , is quàm prudentissi-
mè & consultissimè tum in cate-
râ arte , tum in prædictis hujus-
modi se geret , probè intelli-
gens , qui prædictionis succes-
sum consecutus sit , apud pru-

dentem ægrum admirationi fore, qui verò deerraverit, præterquam quod odio gravabitur, eum nè insanix quidè suspicionem effugere posse. Quapropter præcipio prædicta tum hæc, tum alia omnia prudenter fieri, & si sentio & video quæ in arte dicuntur aut fiunt perperam ab hominibus æstimari & referri.

ATQUE hæc quidè de his scribenda, aliaque id genus dicenda existimavi. Cum his verò qui prædictionum exquisitas narrationes prædicant, partim ipse commercium habui, partim cum eorum filiis & discipulis diù disserui, quorumdam etià scripta nactus sum, ideòque cum cujusque sensum probè percepissem, nequè usquàm exactam disciplinam comperissem, ad hoc scribendum aggressus sum.

Vide M E D I C U M.

PRURITUS.

IN corporis perfrictione cum torporis sensu, sanguinis detractionio mala est.

Sent.
343.
Coac.

Sent.
488.
Coac.

QUIBUS inferiores partes malè afficiuntur , vehementibus pruritibus priùs obortis , iis urina fabulosa fit & subsistit. At qui perniciosè habent , iis mens obtorpescit.

Præd. I.

2.p.109.

& 110.

QUIBUS autèm torpores & pruriginès pungentes , per caput , interdùm quidèm totum , interdùm etiàm aliquà in parte percurrunt sæpiùs verò frigoris aliqujus sensus caput pervagari videtur , ab iis sciscitari oportet , nùm etiàm ad summam linguam pungens ille pruritus pertingat? Sic enì magnus morbus est , & qui ægrè solvatur : alioquì verò facilis. Auxilium autèm consequuntur ex abscessibus , velut antea scriptum est. Qui tamèn his minùs quàm illis contingunt. Tenebricosæ autèm vertigines si cum doloribus adfuerint , malum in insaniam erumpit nèc facile profligatur , & senes præcipuè affligit. Reliqui capitis morbi , tùm viris , tùm mulieribus vehementissimi sunt , àc diutiùs perseverant , àc cum securitate. Contingunt autèm & juvenibus & virginibus

virginibus in ætatis flore, potissimumque circa menstruorum exitum. At mulieribus circa capitis dolores, reliqua quidem omnia quæ etiam viris contingunt. Pungentes tamèn prurigines & atræ bilis vitia minùs hæ quàm viri sentiunt, nisi menses penitus evanuerunt.

P U E R I.

P U E R I verò quibus oculi de repente pervertuntur, aut pejus affecti sunt, aut tubercula sub cervicem enascuntur, aut aliquantulum linguâ hæsitant, aut tussès siccæ trahentes permanent, aut ubi adoleverint, ad ventrem dolor contendit, nequè conturbatur, aut iis latera distorquentur, aut venæ crassæ circa ventrem in *varices* convertuntur, aut omentum descendit, aut testis intumuit, aut manus extenuatur & impotens redditur, aut pes & tibia tota citrà aliam occasionem claudicat. In his omnibus animadvertendum est, morbum ista omnia præcessisse. Id quoque

plerique eorum qui pueros educant interrogati fatebuntur, quidam etià, quod eos lateat, tale quid accidisse se scire negant.

Vide ÆTATEM. HYGIEINEM. MORBOS.

PULMONES ET PULMONUM INFLAMMATIONES.

Sent. Ex pulmonis inflammatione
18. interdum intrà ventrem dolores
Coac. àc claviculam, & cum incontinenti corporis jactatione aliquantulum stertere, sputi copiam in pulmone indicant.

Sent. PECTORIS dolor cum febre,
274. & alvus perturbata cum torpore,
Coac. nigras dejectiones præsefert.

Sent. IN his igitur & omnibus qui
393. pulmonem affligunt morbis, bonum quidè est facile morbum sustinere, dolore defungi, sputum promptè expuere, facile spirare, siti esse vacuum reliquum corpus æqualitèr incallescere ac molle esse. Ad hæc somnos, sudores, urinarum educationem laudabilitèr fieri: quibus

contraria , mala sunt. Quando-
cumque ergò bona hæc omnia
huic sputo aderunt , poterit se-
cunda valetudo contingere. Quòd
si quædam adfuerint , quædam
etiàm abfuerint , non ultrà deci-
mum quartum diem vita produ-
cetur. At verò si contraria signa
accefferint , celerius mors con-
tinget.

QUIBUS ex pulmonis inflam-
matione abscessus ad aures aut
inferiores partes fiunt , tum sup-
purant , tum per fistulam , viâ
apertâ , effunduntur. His autem
secunda valetudo contingit, quos
febris & dolor consequitur , si
sputum non satis pro ratione eji-
citur , nequè biliosæ fuerint alvi
dejectiones , sed solutu faciles
ac sinceræ , nequè urina admo-
dum crassa , aut multum habens
sedimentum ac in reliquis omnia
securitatem polliceantur. Fiunt
autem aliis quidem in partibus
inferioribus quos circâ præcordia
inflammatio fatigat , aliis verò
in superioribus partibus , quibus
præcordia doloris & tumoris
sunt experta , spirandi autem

Sent.
395.
Coac.

difficultas pro tempore accesserit, quæ deinde sinè ullâ evidenti occasione quiescat.

Sent. At verò in pulmonis inflamma-
 396. tionibus quæ periculum creant,
 Coac. abscessus in cruribus non inutili-
 tèt fiunt. Quibus nè potest quic-
 quam melius accedere quàm si
 sputum pro flavo purulentum
 pro ratione excernitur, nequè
 in urinâ bonum apparet sedimen-
 tum, periculum est nè claudi-
 cet æger, aut nè res multùm ne-
 gotii sit exhibitura. Quod si ab-
 scessus intrò recurrant, perse-
 verante febre nequè prodeunte
 sputo, periculum aut mortis,
 aut delirii imminet. Quicumque
 verò pulmonis inflammatione la-
 borant, nequè diebus judicato-
 riis repurgantur, verùm cum
 delirio quatuordecim dies supe-
 rarunt, iis suppurationis metus
 impendet.

Sent. PULMONIS inflammationes
 397. quæ ex morbo laterali permuta-
 Coac. tionem accipiunt, iis quæ ab ini-
 tio fiunt securiores sunt.

Sent. In morbis pulmonis gravedi-
 399. nes & sternutamenta tùm præce-
 Coac.

dere, tùm verò succedere, malo est. In reliquis verò morbis sternutamentum utilitate non vacat.

In pulmonis inflammationibus si lingua tota alba fiat ac aspera, ambæ pulmonis partes inflammatione vexantur, quibus verò dimidiata lingua, quâ parte id apparet, inflammatio affligit. At quibus quidèmad unam claviculam dolor subit, iis una superior pulmonis ala laborat: quibus verò ad ambas claviculas dolor extenditur, ambæ superiores pulmonis alæ laborant: quibus ad mediam costam, media: quibus verò ad quam partem pulmo extenditur dolor permeat, inferna ala laborat: quibus una tota pars laborat, quæ ei parti respondent omnia ægrotant. Si quidèmagitur suspensæ utrinque pulmonis partes *aortæ* dictæ, tantâ inflammatione tententur, ut ad latus adhæreant, illâ corporis parte resolutionem sentiunt, & ad costam livores foris fiunt, quos veteres *ictos* aut sydere percussos vocabant. Quod si tanta non est inflammatio ut adhæreant, dolor

Sent.

400.

Coac.

quidè totum occupat , nequè tamèn resolutionem sentiunt , nequè livores habent.

Sent.

401.

Coac.

QUIBUS autèm unà cum corde pulmo totus inflammatur , ità ut in latus incumbat , ii toto corpore nervorum resolutionem sentiunt , & sinè sensu jacet æger frigidus , secundo autèm aut tertio die interit. Quod si contingat ut cor nihil tale quiddam , aut etiàm minùs patiatur , diutiùs vivunt , nonnulli verò etiàm servantur.

Sent.

402.

Coac.

Ex lateris morbo præcipuè aut pulmonis inflammatione purulentos , calores interdiù quidèm tenues , noctù verò intensiores consequuntur , nequè quicquàm effatu dignum expuunt , circa cervicem & claviculam sudores occupant , oculi cavantur , malæ verò rubent , digiti quidèm manuum summi calent & scabri redduntur , ungues autèm unci fiunt & perfrigescent , in pedibus tumores & pustulas toto corpore habent , ac cibos refugiunt. Atquè hæ sunt diuturnarum vomitarum notæ. Quæ verò celerem eruptionem habent , tùm ex no-

tis quæ ad eas consequuntur comprehenduntur, tum etiã ex doloribus qui circà initia fiunt, simulque si spiritus aliquantò majori cum difficultate trahitur. Rumpuntur autem, magnâ ex parte suppurationses, partim quidẽ vigesimo die, partim quadragesimo, partim etiã sexagesimo. Quibus igitur inter initia intensus dolor instat, nec non spirandi difficultas, & tussis cum frequenti sputatione, circà vigesimum diem, aut celerius ruptio expectanda est. Quibus autem leviora hæc insunt, pro ratione ferior eruptio futura est. Sed & dolorem & spirandi difficultatem, ac crebram spirationem, eruptionem ipsam præcedere necesse est. Temporis autem ratio ineunda est, ex quo primum quis dolorem aut gravitatem sensit, aut febricitavit aliquis, aut si quandò etiã vigorprehendit. Ut plurimum igitur brevì servantur, quos febris statim atque eruptio facta est dimittit, & cibos appetunt, & quibus pus facile educitur album, odoris ex-

leve ejusdèmq̃ue coloris , sinè p̃tuitâ , àc alvus exigua & coacta reddit. At verò ii moriuntur , quos febres consequuntur , & sitis , & cibi fastidium , si pus lividum , aut ex pallido virescens , aut pituitosum , aut spumans , àc insupèr si alvus est liquida. Quibus autèm ex prædictis partim quædam absunt , hi quidèm moriuntur , illi verò post longa temporum intervalla sani evadunt.

Sent. IN pulmonum vitiis suprà modum rubræ sanguinis stillæ , malum denunciant.

412. Coac. IN pulmonis inflammatione , quibus circà initia urinæ crassæ sunt , deindè antè quartum diem tenues evadunt , mors impendet.

Sent. IN pulmonis inflammationibus 416. ficcis qui pauca concocta educunt , metuendi sunt.

Sent. H I S aliquantulùm extenti in 417. pectoribus rubores fiunt , & perniciem denunciant.

Sent. IN pulmone pus colligentibus 429. per alvum pus secedere , mortiferum.

Præn. Ex suppuratis autèm quos pul-
P. 43. monum morbi concitârunt , ferè seniores

seniores moriuntur, at ex cæteris suppurationibus, juniores potius intereunt. At lumborum & inferiorum partium dolores, qui cum febre affligunt, si relictis inferioribus ad septum transversum transeant, exitiales sunt admodum. Ad alia igitur signa animum adhibere oportet. Si quidem ex pravis signis quippiam apparuerit, omni spe destitutus est æger cum verò suppuratiuruntur, quibus purum quidem pus est & album, & minimè fœtidum, ii servantur. At quibus subcruentum & cœnosum, moriuntur. Quod si irruente ad septum transversum morbo, reliqua signa minimè prava se ostenderint, hunc suppuratum fore magna spes est.

NIHIL pestiferum est, nisi Cels.
quod pulmonem exulcerat. l 4. c. 3.

Vide ANGINAM. DOLORES
PULMONUM. SPUTUM. PUS.

P U L S U S.

QUIBUS in vehementi pulsa-
Z

Sent.
368.
Coac.

tionem stercoreis derepentè dejicitur,
lethale.

P U S.

Aph. 47. DOLORES & febres contingunt
Sect. 2. magis circa puris generationem,
quàm eo confecto.

Aph. 41. QUIBUS suppuratum aliquod
Sect. 6. in corpore existit, nequè de se
significationem edit, iis ob puris
aut loci crassitudinem sui indi-
cium non exhibet.

Aph. 58. UBI omentum exciderit, com-
Sect. 6. putrescere necesse est.

Sent. QUIBUS ad palatum humor:
238. colligitur, plerumque in pus:
Coac. vertitur.

Sent. QUI pus intrò collecturi sunt,
403. iis primùm quidèmsalsuginosum
Coac. sputum expuitur, deindè dul-
cius.

Sent. QUIBUS tubercula in pulmone:
404. oriuntur, ii pus intrà dies qua-
Coac. draginta, ex quo fit ruptio, ex-
puunt, quod si superent, ut plu-
rimùm tabidi fiunt.

Sent. QUIBUS si concutiuntur, pus:
409. luculentum & graveolens prodit,
Coac. ut plurimùm moriuntur.

Sent. QUIBUS specillum à pure, ve-
410. ac.

lūt ab igne , coloratur , ii ferè
moriuntur.

QUÆ ob puris intrò collectio- Sent.
nem febres intermittunt , in his 419.
magnâ ex parte ægri tenuibus su- Coac.
doribus diffluunt.

AT sanè ex suppurationibus Sent.
quas pulmonum morbi excitâ- 431.
runt , ferè senes moriuntur , ex Coac.
cæteris verò juniores.

QUIBUS purulentis ab humeris Sent.
concussis , multus editur strepi- 432.
tus , ii minùs habent puris , Coac.
quàm quibus paulò difficilior
ineſt ſpiratio , iiq̃ue meliùs colo-
rati videntur. Quibus verò nul-
lus intùs fit ſtrepitus , difficultas
tamèn ſpirandi vehemens adest ,
& liveſcunt ungues , ii pure ple-
ni ſunt , & pernicioſè habent.

QUIBUS ex hepatis uſtione pus Sent.
amurcæ ſimile prodiſt , lethale. 451.
Coac.

QUÆ ad manùs contactum tor- Sent.
peſcunt , peraridæ , fitis exper- 542.
tes , muliebria multa profun- Coac.
dentes , pus intrò colligunt.

SI in ventrem ſanguis conflu- Celf.
xit , ibi in pus vertitur. l.2. c. 7.

PUS quo craſſius & albidius Celf.
eſt , eò periculi minùs eſt. l.5. c. 26.

Vide DOLOREM CAPITIS. JECUR. PLEURITIDEM. PULMONEM. SPUTUM. URINAM.

P U S T U L Æ.

Aph. 9. PUSTULÆ latæ , rarò prurigi-
Sect. 6. nosæ.

Sent. QUIBUS per febres assiduas
114. pustulæ toto corpore enascuntur,
Coac. lethale est , nisi quid purulentum abscedat. In his verò præcipuè adnasci ad aures tubercula solent.

Sent. PUSTULARUM eruptiones , ve-
444. lût summâ cute levitèr laceratâ
Coac. aut vellicatâ , totiùs habitus tabem & corruptionem denunciant.

Sent. QUIBUS ad articulos præru-
489. bræ pustulæ superficiales enatæ
Coac. sunt , àc subindè rigent , iis velût ex acceptis plagis cum dolore venter & inguina rubescunt , & pereunt.

Vide ÆTATEM.

P U R G A T I O.

Aph. 10. QUÆ judicationem subeunt ,
Sect. 1.

aut etiâ jam perfectè subierunt,
ea nequè moveto medicamentis,
nequè aliis irritamentis innova-
to, sed finito.

COCTA medicamento pur- Aph.22.
gante educito ac moveto, mini- Sect. 1.
mè cruda, nequè per initia, nisi
suoptè impetu ad excretionem
ferantur, quod ferè non accidit.

IN morbis acutis rarò & per Aph.24.
initia medicamentis purgantibus Sect. 1.
utendum. Idque diligenti antè
adhibitâ circumspèctione facien-
dum.

CUM purgantur quæ purgari Aph.25.
decet, confert & facilè tolerant, Sect. 1.
ubi contrà accidit, difficultèr.

CUM quis corpora purgare vo- Aph. 9.
let, ea ad fluxum benè comparata Sect. 2,
faciat oportet.

QUI inculpatâ sunt corporis Aph.36.
sanitate dùm per medicamentum Sect. 2.
purgans repurgantur, citò exsol-
vuntur, & qui pravo utuntur
cibo.

QUI benè habito sunt corpore, Aph.37.
ad medicationes molestè habent. Sect. 2.

CUM quis omnia rectâ ratione Aph 52.
facit, nequè tamèn pro ratione Sect. 2.
succedit, non est ad aliud pro-

grediendum, si manet quod ab initio visum est.

Aph. 1. UTERUM gerentibus medica-
Sect. 4. menta purgantia sunt exhibenda,
si humor impetu fertur ad excre-
tionem, quarto mense, & ad
septimum usque, his tamèn mi-
nùs. Iis minoribus autèm & gran-
dioribus fœtibus, subtimidè se
gerere oportet.

Aph. 2. IN medicamentorum purgan-
Sect. 4. tium usu, qualia etiàm spontè
prodeuntia, utilia sunt, talia è
corpore educere convenit, quæ
verò contrario modo prodeunt,
cohibere.

Aph. 3. SI quæ purgari decet, purgen-
Sect. 4. tur, confert & levitèr ferunt,
contrà verò, gravitèr.

Aph. 4. ÆSTATE quidèm superiores
Sect. 4. ventres potiùs medicamentis re-
purgato, Hieme verò inferiores.

Aph. 5. SUB *canis* ortum & antè *canis*
Sect. 4. ortum molestæ sunt per medica-
menta purgationes.

Aph. 6. GRACILES & facili vomitione
Sect. 4. utentes, medicamento per supe-
riora purgare oportet, reformi-
dantes Hiemem.

Aph. 7. AT difficili vomitione utentes
Sect. 4.

& modicè carnosì, per inferiora, Æstatem reformidantes.

TABESCENTES verò, reformidantes per superiora purgationes. Aph. 8. Sect. 4.

ATRABILE abundantes largiùs per inferiora, simili ratione adhibità, contraria purgandi via. Aph. 9. Sect. 4.

IN valdè acutis si suoptè impetu ad excretionem humor feratur, medicamento purgante eodem die utendum. Si quidè in his cunctari malum. Aph. 10. Sect. 4.

QUIBUS alvi intestinorum levitate infestantur, eos Hyberno tempore per superiora medicamento purgare, malum. Aph. 12. Sect. 4.

QUI veratro sumpto non facilè per superiora purgantur, iis antè potionem corpora copiosiore cibo & quiete præhumeatato. Aph. 13. Sect. 4.

UBI quis veratrum potione sumpserit, corporum quidè motiones magis, quàm somnum & quietem inducito. Nam vèl navigatio turbari motione corpora indicat. Aph. 14. Sect. 4.

UBI veratrum magis ducere voles, corpus moveto; ubi verò Aph. 15. Sect. 4.

sistere, somnum conciliato, nequè moveto.

Aph. 17. SI cui sinè febre, cibi fastidium, oris ventriculi morsus, tenebricosa vertigo contigerit, & os amarulentum fuerit, hæc necessariam esse per superiora purgationem indicant.

Aph. 18. DOLORES suprâ septum transversum purgatione indigentes, medicamentum quod per superiora purget necessarium esse indicant. At qui septo transverso sunt inferiores, per inferiora.

Aph. 19. QUI sumptâ potione medicâ dùm purgantur non sitiunt, ii purgandi finem non faciunt, donec sitiverint.

Aph. 20. SI dolor intestina torquens & genuum gravitas, & lumborum dolor citrà febrem adfuerint, medicamento quod per inferiora purgat opus esse significant.

Aph. 4. Ex profusâ purgatione convulsio aut singultus succedens, malum.

Aph. 25. Ex medicamenti purgantis potione, convulsio lethalis.

Aph. 70. CORPORA cum quis repurgare volet, fluxilia reddere oportet.

Quod si suprâ fluxilia reddere voles, alvus sistenda est, si verò infrâ, humectanda.

In omni superfluâ purgatione, Sent. 568.
 frigus cum sudore, exitiale. Et Coac.
 intèr hæc qui subindè vomunt,
 & siticulosi sunt, malè habent.
 Qui verò anxietate laborant,
 cum lumborum dolore, iis alvus
 humectatur.

Ex epoto veratro, prærubro- Sent. 569.
 rum & nigrorum purgationes, Coac.
 vitiosæ. Virium exsolutio cum
 talibus mala est.

ALVI durities cum dolore, unâ Sent. 640.
 cum febribus horroris sensu infi- Coac.
 gnibus, ac cibi fastidio laboran-
 tibus, paulùm humectatâ ad
 purgationem alvo, ad suppura-
 tionem non tendit.

SED purgationes quoquè ut in- Cels. l. 1. c. 3.
 terdùm necessariæ sunt, sic ubi
 frequentes sunt, periculum affe-
 runt. Assuescit enim non ali cor-
 pus, & ob hoc infirmum erit,
 cum omnibus morbis obnoxia
 maximè infirmitas fit.

Vide REMEDIUM.

PURGAMENTA.

Sent. MULIEBRIA purgamenta non
 § 42. subiltere utile, ac fortè ex tali-
 Coac. bus comitia'es morbi oriuntur,
 partim verò diuturnæ alvi sub-
 ductiones, partim etiàm sangui-
 nis per ora venarum profluvium.

Sent. Ex purgamentis muliebribus
 § 7. ad pedes & lumbos pertingentes
 Coac. tentiones, suppurationes indi-
 cant, & viscosa graveolentia ex
 alvo cum dolore prodeuntia. Ex
 præscriptis quoquè suffocationes,
 suppurationes denunciant.

Sent. HORRORE subindè tentatis,
 § 41. lassitudine & capitis gravitate
 Coac. conflictatis, muliebres purga-
 tiones erumpunt.

Vide MENSES.



R E G I O N E S.

DIFFERUNT pro naturâ locorum genera Medicinæ. Cels. lib. 1. Præd.

Vide TEMPESTATES.

R A T I O.

MENTE constare, & benè habere ad ea quæ offeruntur, quovis in morbo bonum; contra verò malum. Aph. 33. Sect. 2.

R A U C I T A S.

RAUCITAS cum tussi & alvo liquidâ, pus educit. Sent. 414. Coac.

R E C I D I V Æ.

CREBRÆ iisdem perseverantibus casibus morborum reversiones, imminente judicatione sanguinem profundentes, nigram vomitionem excitant. Quinetiàm tremulos ægros faciunt. Sent. 122. Coac.

QUIBUS autèm sæpiùs recidivæ contingunt, si sextum mensem. Sent. 144. Coac.

superaverint , in tabem coxar-
 riam ferè incidunt.

Vide FEBRES. MORBOS.

REMEDIU M.

Aph. 6. AD summos morbos summæ ad-
 Sect 1. unguem curationes adhibitæ ,
 optimè valent.

Cels. C U J U S rei non est certa co-
 lib 1. gnitio , ejus opinio certum re-
 Præf. perire remedium non potest : ve-
 rumque est quod ad ipsam curan-
 di rationem nihil plùs confert
 quàm experientia.

Cels 1.1. N O N eadem omnibus , etiàm
 Præf. in similibus casibus opitulantur.

Cels. C A V E N D U M , nè in secundâ
 1.1. c. 1. valetudine, adversæ præsidia con-
 sumantur.

Cels. O M N E auxilium corporis aut
 1.2. c. 9. demit aliquam materiam, aut ad-
 jicit , aut evocat , aut reprimit ,
 aut refrigerat , aut calefacit , aut
 durat , aut mollit.

Cels. S A T I U S est anceps experiri
 1.2. c. 10. auxilium , quàm nullum.

Cels. V E H E M E N T I malo , nisi æquè
 1.2. c. 11. vehemens auxilium succurrere
 non potest.

MEDICAMENTA stomachum Cell.(1.2)
ferè lādunt. c. 12.

MEDICAMENTUM non sempèr Cels.(1.2,
āgris prodest , nocet sempèr c. 13.
sanis.

Ad cataplasma calefaciens va- Cels.(1.2,
lentior omnis farina est ex mulso, c. 33.
quā ex aquā coctā.

ILLUD ignorari non oportet, Cels.
quod non omnibus āgris eadem lib. 3.
auxilia conveniunt. c. 1.

OPORTET itaquē ubi aliquid Cels.
non respondit, non tanti putare lib. 3.
auctorem quanti āgrum , & ex- c. 1.
periri aliud atquē aliud.

ASCLEPIADES officium esse Cels.
Medici dicit , ut tutò , ut celeri- lib 34
tèr , ut jucundè curet , id votum cap. 41
est , sed periculosa esse nimiū
& festinatio , & voluptas solet.
Quā verò moderatione utendum
sit ut quantū fieri potest omnia
ista contingant. Quæritur quā ra-
tione primis diebus āger conti-
nendus sit? Antiqui medicamentis
quibusdam datis concoctionem
moliebantur , eò quòd crudita-
tem maximè horrebant. Deindè
etiā materiam quæ lādere vi-
debatur , ducendo sapiūs alvum,

subtrahebant. *Asclepiades*, medicamenta sustulit, alvum non toties, sed ferè tamèn in omni morbo subduxit. Febre verò ipsa infestante se remedio hoc uti professus est, convellendas enim vires ægri putavit, luce, vigiliâ, siti ingenti, sic, ut nè eos quidèm primis diebus elui fineret. Quo magis falluntur qui per omnia jucundam ejus disciplinam esse contendunt. Etenim ulterioribus quidèm diebus, cubantis etiàm luxuriæ subscripsit, primis verò, tortoris vicem exhibuit. Ego autèm medicamentorum dari potiones & alvum duci non nisi rarò debere concedo. Et id non ideò tamèn agendum, ut ægri vires convellantur existimo: quoniam ex imbecillitate summum periculum est. Minui ergò tantum exsuperantem materiam oportet quæ naturalitèr digeritur ubi nihil novi accedit. Itaque abstinendus à cibo primis diebus, in luce habendus æger, nisi infirmus interditi est, isque cubare quàm maximo conclavi debet. Quod ad sitim verò somnumque

pertinet, moderandum, id est ut interdiu vigilet, noctu, si fieri potest, conquiescat: ac nequè potest, nequè nimium siti crucietur. Os etià ejus elui potest, ubi & siccum est & ipsi foetet, quamvis id tempus aptum potioni non est: commodèque *Erasistratus* dixit, sæpè inferiore parte humorem non requirente, os & fauces requirere.

NON facile sanguinem mittere, non facile ducere alvum, non cruciare vigiliâ, famevè, aut nimiâ siti, non vino curare satis convenit. Cels. 1. 3. c. 7.

CUM eadem omnibus convenire non possunt, ferè quos ratio non restituit, temeritas adjuvat. Cels. 1. 3. c. 9.

SÆPÈ etià pertinacia juvenis, malum corporis vincit. Cels. 1. 3. c. 12.

SOMNUS illis medicamentis accersendus est. (Quæ soporifera sunt,) habitâ scilicèt eadem moderatione quæ hîc necessaria est, nè quem obdormire volumus, excitare postea non possimus. Cels. 1. 3. c. 18.

IN omnibus stomachi vitiis præcipiendum est, ut, quo modo se quisque æger refecerit, eodem sanus utatur. Cels. 1. 4. c. 5.

Celf. MEDICAMENTIS uti nisi in vehementibus malis supervacuum est.
1.4.c.19.

Celf. UT I somniferis nisi nimia necessitas urget alienum est : sunt enim ex vehementibus medicamentis, & stomacho alienis.
1.5.c.25.

Celf. VINUM omnibus dum febris, dum inflammatio est, alienum est.
1.5.c.26.

Celf.1.7. EADEM medicamenta sæpè salutaria, sæpè vana sunt.
Præf.

Celf.1.7. Duo genera curationum sunt, c.7. alia, in quibus eligere tempus non licet, sed utendum est eo, quod incidit; sicut in vulneribus & fistulis: alia, in quibus nullus dies urget, & expectare tutissimum & facile est, sicut evenit in iis quæ & tardè concreescunt, & dolore non cruciant.

Vide PURGATIONEM.

RESPIRATIO.

Aph.50. QUANDO in febre non inter-
Sect. 4. mittente difficultas spirandi & delirium contigerit, lethale.

Aph.67. IN febribus spiritus offensans,
Sect. 7. malo est, convulsionem namque indicat.

IN

IN bile redundantibus magna Sent.
 spiratio cum febre acutâ & præ- 126.
 cordiorum contensione, absces- Coac.
 sum juxtâ aures promover.

SPIRATIO frequens quidè & Sent.
 parva, aut inflammationem, aut 260.
 dolorem principalium partium Coac.
 indicat; magna verò & ex longis
 intervallis, delirium, aut con-
 vulsionem. Et frigidus quidè
 spiritus lethalis est, mortem quo-
 què affert febriculosus & fuligi-
 nosus, frigidus tamèn minùs. Et
 magnus quoquè foràs expiratus,
 parvus verò intrò, & parvus fo-
 ras, magnus verò intrò pessimus
 quidè ad mortemque proximè
 accedit & qui protensus est ac
 urgens, & obscurus, duplica-
 raque intrò revocatio, qualis
 inspirationem conduplicantibus.
 Facilis autèm spiratio in omnibus
 morbis qui cum febre acutâ in-
 festant, & in quadraginta die-
 bus judicantur, magnum habere
 ad salutem momentum existi-
 manda est.

QUIBUS spiritus retrahitur, & Sent.
 vox stragulabunda est, iis cer- 266.
 vicis vertebra intrò defidet, & Coac.

ad exitum velut ex convulsione
quâdam respiratio ducitur.

Sent. IN his qui ad septimum pro-
339. gressi sunt cum coloris fœda-
Coac. tione, inter ambulandum spira-
tio coacervata & terræ appeten-
tia, sanguinis corruptionem ac
virium exsolutionem denunciat.

Sent. SPIRATIONS quæ non nisi
424. erectâ cervice ducuntur, hydro-
Coac. pem siccum faciunt.

Sent. SPIRATIONS suspiriosæ quæ
519. foras educuntur, ac citrà ratio-
Coac. nem facta colliquatio in uterum
gerentibus abortiones indicant.

Sent. QUÆ suspiriosæ spirationes fo-
549. ras educuntur in febribus abor-
Coac. tionis periculum afferunt.

Præn. QUÆ puellæ erectæ cervicis
p. 38. spiratione vexantur, iis uterum
ferentibus mammæ pus colli-
gunt. Muliebria purgamenta cir-
cà initia apparere, malum.

Præn. SPIRITUS frequens dolorem
pag. 38. aut inflammationem in locis sep-
to transverso superioribus indi-
cat. Qui verò magnus inspiratur
& ex magno intervallo, deli-
rium. At frigidus ex naribus &
ore expiratus, exitialis admo-

dùm jam est. Facile autem spirare, valde magnum ad salutem momentum existimandum, cum in omnibus morbis acutis quibus febris conjuncta est, tum in his qui intra dies quadraginta judicantur.

MALI morbi testimonium est. Cels. vehementer & crebro spirare. l.2. c. 4.

Vide SENE S.

RESPONSIO.

AB homine moderato, ferox & audax responsum, malum portendit. Sent. 44. lib. I.

RIGOR.

Præd.

Si febre non intermittente rigor frequenter incidat, agro jam debili, lethale est. Aph.46. Sect. 4.

RIGORES mulieribus quidem initium ducunt ex lumbis magis, & per dorsum ad caput perveniunt, quin etiam viris parte corporis posteriore magis quam anteriore, veluti ex cubitis & femoribus. Quod & indicat cutis raritas, quam etiam pilus ostendit. Aph.69. Sect. 5.

Aph. 7. Ex multo potu rigor & deli-
Sect. 7. rium, malum.

Sent. 1. Qui ex rigore perfrictione de-
Coac. tinentur, cum capitis à cervicis
dolore, vocis defectione à te-
nui sudore, ii, ubi vires resumpse-
rint à se se velut recollegerint,
moriuntur.

Sent. 3. UBI totum corpus ita perfri-
Coac. xit ut obrigeat, perniciem affert.

Sent. 4. Ex perfrictione metus à ani-
Coac. mi abjectio præter occasionem,
in convulsionem tendit.

Sent. 7. RIGORES cum sopore non ni-
Coac. hil periculi denunciant, & fa-
cies incensa cum sudore maligni-
tatem significat. Insupèr poste-
riorum partium frigus, convul-
sionem provocat. Ac omnino
posteriorum partium refrigera-
tio convulsionem minatur.

Sent. 9. CONTINENTER & assidue ve-
Coac. xans rigor, imbecillo jam cor-
pore, lethalis est.

Sent. Qui crebro tenuiter exudant
10. à subinde rigent, ii perniciosè
Coac. habent, & tandem sub mortem
suppurati & alvum conturbatum
Sent. habereprehenduntur.

11. Qui rigores ex dorso profi-
Coac.

ciscuntur graviores sunt & molestiores. Ubi verò quis decimo-septimo die rigore correptus, quarto àc vigesimo die insupèr riguerit, difficultèr habet.

RIGORES multi cum torpore, Sent.
malignum quiddam denunciant. 14.

RIGORES qui in sextum diem Coac.
incidunt, difficile judicium ad- Sent.
ferunt. 15.

CONTINENTES in præcipitibus Coac.
malis rigores, malo sunt. Sent.
21.

VIRIUM exsolutiones ex rigore Coac.
cum capitis dolore perniciem de- Sent.
nunciant. Cruentæ in his urinæ 22.
malo sunt. Coac.

RIGOR cum posteriorum par- Sent.
tium distentione mortem adfert. 23.

RIGORES velut in iis febribus Coac.
quæ propius ad tertianarum na- Sent.
turam accedunt, si in medio in- 26.
gravescent, febre nullum ordi- Coac.
nem servante, maligni valdè
sunt. Quæ verò contra ingravescunt, in convulsione vexatis
cum rigore & febre perniciem denunciant.

QUÆ ex rigore sunt vocis de- Sent.
fectiones, tremore solvuntur, 27.
atque eos qui subindè novo rigore Coac.

R

corripiuntur , succedentes tremores judicant.

Sent. 28. Qui ex rigore virium exsolutiones & capitis dolores sentiunt, ii in dubium de vitâ veniunt. In his cruenta urina malum denunciat.

Sent. 29. Quibus rigor adest, iis urina restitat.

Coac. 38. Qui in diebus judicatoriis cum angore aut incontinenti corporis jactatione, absquè sudore perfrigerantur, atquè omninò qui sinè sudore perfrigerantur citrà judicationem, malè habent.

Sent. 39. Quin & qui subindè riguerunt, post hæc sincerâ vomitione refuderunt, anxietate vexati, tremuli in febre, malum portendunt. Quin etiàm ex rigore vox intercepta perniciem denunciat.

Sent. 40. Qui verò post sanguinis ex naribus eruptionem ex tenuibus sudoribus perfrigescunt, malè habent.

Sent. 231. Subabsurdus est qui cum judicatione rigor fit.

Sent. 61. Summi totius corporis perfrictiones in diebus judicatoriis

Præd. lib. I.

cum angore & corporis inquietudine, si sinè sudore fiunt, damno sunt, præcipuè verò damnantur qui ex his superveniunt rigores.

In rigore familiares non agnoscere & eorum quæ gesta sunt oblivisci, malum est.

Sent.

64. l. 1.

Præd.

Ex rigore perfrictiones quæ ad calorem non revocantur, malæ sunt.

Sent.

65. l. 1.

Præd.

Ex perfrictione exudantes ad calorem revocati periculum denunciant: præsertim verò si accedat lateris æstus cum dolore, & subindè rigeant, malum impendet.

Sent.

66.

lib. 1.

Præd.

RIGORES cum æstu non nihil periculi denunciant, & facies incensa cum sudore, in his malum significat insupèr posteriorum partium frigus convulsionem provocat.

Sent.

67.

Præd.

lib. 1.

CORPORIS perfrictio cum rigiditate, perniciem denunciat.

Sent.

67. l. 1.

Præd.

Qui subindè rigoreprehenduntur, & sub noctem aliquantò graviùs habent, pervigiles, in somnis nugantes aut delirantes, interdum sese lotio perfunden-

Sent.

101.

lib. 1.

Præd.

tes, ii convulsiones cum sopore tendunt.

Sent. 107. QUIN etiàm non nihil metuen-
lib. 1. dus est cum judicatione rigor.

Præd. IN iis quibus rigores imminenti
Sent. urina restitat, & in convulsionis
110. affectionibus, velût huic mulieri
lib. 1. contigit, quæ ubi inhorruit su-
Præd. dore correpta est.

Sent. CERVICIS & dorsi perfrictio-
113. nes, & quæ totum corpus vi-
lib. 1. dentur pertingere, insupèr &
Præd. spumantes mictiones, cum ani-
mi deliquio, ac oculorum hebe-
tatio, convulsionem in proximis
esse significant.

Sent. QUIBUS ex rigore febres ad-
142. sunt, cum lassitudinis sensu, in
lib. 1. iis muliebrium profluvium ex-
Præd. spectare oportet. Quod si cervi-
cis dolor prehenderit, sanguinis
ex naribus eruptionem fore spes-
est.

Sent. RIGORES ubi sanguinis erup-
151. tionis succedunt, diuturni fiunt.
lib. 1.

Præd.

Vide ABORSUM. ABSCESSUM.
FEBRES. HÆMORRAGIAM.
HYPOCHONDRIA. HORRORES.

RUBOR.

R U B O R.

In febris ex prægresso dolore
 rubores ad aures subnascentes,
ignis sacri in facie spem faciunt. *Sent.*
 Quin & convulsiones cum vocis *200.*
 privatione & virium exsolutione *Coac.*
 ad hæc consequi par est.

Vide ANGINAM CEREBRUM.
 COLOREM. FACIEM. TESTICU-
 LOS. TUMORES.

R U C T U S.

Vide LIENTERIAM.



SANGUIS.

Aph. 20. **S**I sanguis in ventrem præter
Sect. 6. naturam effusus fuerit, ut in
pus vertatur necesse est.

Aph. 3. **Q**UIBUS per febres quartanas
Sect. 8. sanguis ex naribus fluxerit, malo
est.

Sent. **P**ERPUSILLÆ sanguinis è nari-
57. bus stillæ, damno sunt.

Coac. **S**PINÆ perversiōem & spiran-
Sent. di difficultatem sanguinis fluxus
311. liberat.
Coac.

Sent. **S**ANGUINIS ex parte adversâ
327. profluvium malum est, velut
Coac. si in Lienis tumore ex dextrâ nare
effluat. Et circâ præcordia idem
spectari oportere existimandum
est.

Sent. **Q**UIBUS ex largâ & frequenti
333. sanguinis eruptione, copiosa fit
Coac. nigrorum dejectio, cum alvi
verò suppressione sanguinem pro-
fundunt, iis alvus dolore con-
flictatur, unâ autem cum qui-
busdam flatibus tolerabilius fe-
runt. Ac fortè hi copiosis, fri-
gidis & tenuibus sudoribus dif-
fluunt. In his returbata urina ma-

la non est, nequè quod in eâ infidet genitali semini simile. Ut plurimum autem hi dilutas urinas reddunt.

SANGUINEM spuitione rejectis Sent. 427. Coac. cientibus sinè febre esse conducit, ac tussi & dolore levitèr conflictari, sputumque ad dies quatuordecim tenuari. Intensè autem febricitare, ac tussire, aut dolere, sanguinemque recentem semper spuerè minimè conducibile.

SANGUINIS fluxus si quarto die oriatur, diuturnitatem indicat, & alvus effunditur, cruraque intumescunt. Sent. 533. Coac.

Qui spumantem sanguinem excreant, his in pulmone vitium est. Cels. l. 2. c. 7.

Vide EXCREMENTA. HÆMORRAGIAM. PRURITUS.

SATIETAS.

Qui ex longâ valetudine sese recolligentes cibum benè sumunt ac nihil proficiunt, ii malignè relabuntur. Sent. 127. Coac.

Vide CIBUM. HYGIENEM.

Bb ij

S E C E S S U S.

Vide EXCREMENTA.

S E C T I O.

Aph. 18. Cui vesica perfecta fuerit,
Sect. 6. aut cerebrum, aut cor, aut sep-
tum transversum, aut tenue
quoddam intestinum, aut ven-
trculus, aut jecur, lethale est.

Aph. 19. Os cum perfectum fuerit, aut
Sect. 6. nervus, aut genæ tenuis parti-
cula, aut præputium, nequè au-
getur, nequè coalescit.

Vide CHIRURGUM. VULNUS.

S E C U N D I N A.

Aph. 49. Ut secundæ excidant sternuta-
Sect. 5. torio naribus appposito, nares &
os comprimito.

S E D E S.

Vide D O L O R E M.

S E N E S.

Aph. 39. Ut plurimum quidè m fenes
Sect. 2.

juvenibus ægrotant minùs. At qui ipsis morbi diuturni contingunt, eos ferè ad mortem comitari solent.

Vide ÆTATEM. MORBUM.

SICCITAS.

Vide TEMPUS.

SIGNA SALUBRIA ET INSALUBRIA.

HÆC igitur in febris acutis Aph. 10. notare oportet, quandò quis Sect. 8. moriturus sit, & quandò evasurus.

TESTIS dexter frigidus & convulsus, lethale. Aph. 11. Sect. 8.

UNGUES nigri, & digiti manuum & pedum frigidi, contracti, vèl remissi, mortem in propinquo esse ostendunt. Aph. 12. Sect. 8.

LABIA livida, aut etiàm resoluta, & inversa, & frigida, lethalia. Aph. 13. Sect. 8.

AURES frigidaë, pellucidaë, contractaë, lethales sunt. Aph. 14. Sect. 8.

ET tenebriosâ vertigine laborans, & lucem averfans, & Aph. 15. Sect. 8.

somno ac ardore multo detentus,
desperatus.

Aph. 16. ET qui in rabiem actus furit:
Sect. 8. intrepidè, & non agnoscit, &
nequè audit, nequè intelligit,
jà moribundus est.

Aph. 17. MORITURIS signa hæc magis
Sect. 8. fiunt manifesta, & ventres at-
tolluntur, atquè inflantur.

Aph. 18. TERMINUS verò mortis est, si
Sect. 8. animæ calor suprà umbilicum ad
locum septo transverso superio-
rem ascenderit, & omne humi-
dum fuerit combustum. Post-
quàm pulmo & cor humorem
amiserint, calore in mortiferis
locis coacervato, caloris spiri-
tus confertim exhalat, undè to-
tum cum toto constitit. Rursus
partim quidè per carnes, par-
tim verò per spiracula in capite,
undè vivere dicimus, relinquens
anima corporis tabernaculum,
& frigidum & mortale simula-
crum, unà cum bile, & san-
guine, & pituitâ, & carne, de-
ditione tradit.

Sent. UBI jàm perniciēs imminet,
62. parvi tremores & æruginosa vo-
Coac. mitio, & in quibus inter potan-

dum strepitus quidam percipitur, quique præ ficcitate murmur quoddam sentiunt, & qui ob spiritum tussiculosum ægrè devorant, in gravibus malis perfrigeratis perniciosè habere judicandi sunt.

Qui vehementer efflant & reflexis sunt palpebris, ac per somnum leviter suspiciunt, aurigine admodum fœdati & largius colorati, moriuntur. In his album alvi recrementum præcedit.

Sent.

64.

Coac.

In his qui propter imbecillitatem non vident, nèc audiunt, aut quibus labrum, aut oculus, aut nasus pervertitur, mors denunciatur.

Sent.

72.

Coac.

CONVULSIONES cum febre acutâ perniciem denunciant.

Sent.

269.

Vide AFFECTUS CUIUS SUNT. Coac.

SINGULTUS.

SINGULTU detento, si sternutamenta accedant, singultum tollunt.

Aph. 13.

Sect. 6.

Ex vomitione singultus & oculi rubentes, malo sunt.

Aph. 3.

Sect. 7.

Ex jecoris inflammatione singultus, malo est.

Aph. 17.

Sect. 7.

Bb iiij.

Aph. 41. Si senioribus supra modum
Sect. 7. purgatis singultus accidat, non
bonum.

Sent. Ex sinceris vomitionibus sin-
565. gultus malus est, mala quoque
Coac. convulsio. Quin etiam idem exi-
stimandum est in immodicis pur-
gationibus, quæ ex medicamen-
torum potionibus fiunt.

Vide CONVULSIONEM. ILEUM.
HÆMORRAGIAM. PARTUM.

S I T I S.

Sent. Ac penitus quidam in gravi
58. morbo sitim temerè ac præter ra-
Coac. tionem cessare, malum est.

Vide BIBERE. HYGIENEM.

S O L U T I O M O R B I.

Sent. TERTIANA exacta quinto, aut
148. septimo, aut summum nono cir-
Coac. cuitu terminatur.

S O M N U S.

Aph. 1. Quo in morbo somnus labo-
Sect. 2. rem facit, lethale; quod si juvet
somnia, minimè lethale.

Ubi delirium somnus sedaverit, bonum. Aph. 2. Sect. 2.

SPECTARE verò oportet quæ etiam ex oculis per somnum subapparent. Etenim si quid ex albo non commissis palpebris subappareat, nequè id ex alvi profluvio, aut medicamenti potione contingat, pravum signum est & lethale admodum. Aph. 52. Sect. 6.

SOMNUS, vigilia, utraque si modum excefferint, morbus. Aph. 71. Sect. 7.

PROFUNDI somni nequè turbulenti, iudicii firmitatem denunciant, turbulenti verò non sine corporis offensione, instabiles sunt & infirmi. Sent. 151. Coac.

SOMNI, quales sopore oppressis, & totius corporis perfriktionibus, perniciem ostentant. Sent. 181. Coac.

QUOD ad somni rationem attinet, quemadmodum à naturâ nobis est consuetum, interdium quidè vigilandum, noctum verò dormiendum. Quod si istud immutatum fuerit, deterius existimandum. At minimùm offenditur æger, si primâ luce dormiat ad tertiam diei partem. Qui verò postea somnus contingit, Præn. p. 39.

deterior est. Pessimùm autèm si nequè noctù nequè interdiù dormiat. Nàm aut ob dolorem infania adest, aut delirii affuturi hæc nota est.

Cels. l. 1.
cap. 2.

IMBECILLIS stomacho, quo in numero magna pars urbanorum, omnesque penè cupidi litterarum sunt, observatio necessaria est, ut quod corpori vel loci vel studii ratio detrahit, cura restituat. Ex his igitur qui benè concoxit, manè tutò surget, qui parùm quiescere debet, & si manè surgendi necessitas fuèrit, redormire: qui non concoxit ex toto conquiescere, ac nequè labori se, nequè exercitatione, nequè negotio credere.

Vide CONVULSIONEM. JACERE INSOMNIA. OCULOS. REMEDIUM. SOPOREM. HYGIEINEM.

S O N I T U S.

Vide CEREBRUM. TINNITUM.

SOPOR ET SYDERATIO.

Aph. 50.
Sect. 7.

QUIBUS cerebrum syderatione

tentatum est, intra tres dies intereunt. Quod si hos effugerint, sani evadunt.

QUÆ convulsionis in morem affligunt, ea, altum stuporem (*Cathocum* vocant) inducunt.

Sent.

104.

Coac.

SOPOR profundus & altus omnino damnandus est.

Sent.

178.

Coac.

QUI inter initia sopore detenti, capitis, lumborum, cervicis, præcordiorum dolore ac insomniâ conflictantur, considerandi num phrenitici evadant? In his narium stillatio perniciem ostendit, tum verò vel maximè,

Sent.

179.

Coac.

si quarto die, aut inter initia contingat. Alvi quoque prærubra proluvies, malo est.

QUI sopore oppressi circa initia, tenuiter exudantes, concoctas urinas emittunt, cum magnâ corporis æstuatione, citrà judicationem verò perfrigescunt, & rursùm ex brevibus intervallis peruruntur, torpore, sopore, aut convulsione tentati, perniciosè affecti sunt.

Sent.

180.

Coac.

SOPORE, lassitudine ac surditate tentatos, alvus erumpens & ad judicationem rubra demittens juvat.

Sent.

182.

Coac.

Sent. 183. **Q**UI sopore detinentur cum
Coac. incontinenti corporis jactatione,
præcordiorum dolore, & parvâ
vomitione, ii tubercula ad aures
habent. Sed & antea circa fa-
ciem tumores apparent cum so-
pore.

Sent. 184. **Q**UIBUS in morbis subita fit
Coac. percussio, cum inquietâ corpo-
ris jactatione, iis sanguinis erup-
tionem fore spes est.

Sent. 185. **Q**UI sopore, corporis inquietu-
Coac. dine, præcordiorum dolore affli-
guntur cum frequenti & paucâ
sputatione, iis tubercula ad au-
res exoriuntur, ac fortassis so-
pore tentati, ad aliquam convul-
sionem deveniunt.

Sent. 186. **Q**UIBUS sopore conflictatis,
Coac. fatuitate & alto stupore (quem
Catochum vocant) detentis, præ-
cordia variant, ac venter in tu-
morem præter naturam sublatus
est, cum ciborum fastidio ac alvi
interceptione, tenui circa caput
& thoracem oborto sudore; in
his animadvertendum est, num
concitatus & magnus spiritus,
aut genituræ similis excretio pro-
diens, singultum prænuntiet?

Alvus verò fortassis etià biliosa demittat? Eos, splendescens quidam per urinam redditum, juvat, alvus verò in his etià commovetur.

UBI cerebrum syderatione periclitatur, quidam tribus diebus, quidam etià septem moriuntur, quos si evaserint, servantur. Ex quorum numero pereunt quibus per sectionem os disparatum apparuerit.

Sent.
187.
Coac.

IN syderatis succedentes *hæmorrhoides* utiles, refrigerationes verò & torpores malum denunciant.

Sent.
478.
Coac.

IN syderatis ex magnâ spirandi molestiâ subortus sudor, mortem adfert. In his rursù si febris accedat, solutio contingit.

Sent.
479.
Coac.

SYDERATIONES quæ repenti fiunt, si insupèr febris exsolutionis in modum contingat, quæ diutiùs trahat, perniciem minantur.

Sent.
480.
Coac.

ANIMADVERTENDUM est diligenter nùm profundus & altus sopor omninò damnari debeat?

Sent.
63. l. 1.
Præd.

SYDERATIONES quæ repenti contingunt, si insupèr febris mediocris accedat, quæ diù trahat,

Sent.
82.
lib. 1.
Præd.

perniciem minantur , quale quid
Numenii filio contigit.

Sent. Ex capite dolentes , & alto
88. l. I. stupore (*Cathocum* vocant) de-

Præd. tenti ac delirantes cum alvi inter-
ceptione & ferociente intuitu ,
floridi in scapulas rigescunt ac
posteriorum partium distentione
tentantur.

Sent. IN sopore affectis ægris , spu-
93. l. I. mantibus prodeuntibus dejectioni-

Præd. nibus , febris acuta ingravescit.

Sent. Vocis defectiones cum vi-
96. l. I. rium exsolutione , alto stupore

Præd. (*Cathocum* vocant) detentis per-
niciem minantur.

Sent. QUÆ ex lumbis in cervicem &
118. l. I. caput redundant , & , levis syde-

Præd. rationis more , resolutionis sen-
sum inducunt , convulsionem ac
mentis emotionem minantur.
Videndumque est , nùm talia
convulsione solvantur ? Qui hu-
jusmodi conflictantur , variè
morbum trahunt , atquè eadem
diutiùs perseverant.

Sent. IN his qui quodam sopore aut
154. l. I. morbo Regio detinentur , nè ad-

Præd. modum sentiunt , & quibus sin-
gultus adest , alvus affatim pro-

rumpit, fortassis etiàm supprimi-
tur, atquè ii exsolvuntur, vi-
dendum nùm abscessus ad au-
res in his expectare oporteat?

IN levitèr syderatis abscessus
qui ad aures contingunt, malo
sunt. Sent. 160. l. 1.
Præd.

IN capitis dolore, sopor & fur-
ditas aliquem ad aures abscessum
effundunt. Sent. 168. l. 1.
Præd.

PRÆCORDIORUM conten-
sio cum sopore, corporis incon-
tinenti jactatione, & capitis do-
lore, tubercula ad aures attollit. Sent. 169.
lib. 1.
Præd.

SPINALIS MEDULLA.

SPINÆ perversiorem & spi-
randi difficultatem sanguinis flu-
xus liberat. Sent. 311.
Coac.

AT verò si spinalis medulla,
aut ex casu, aut aliquâ quapiàm
externâ causâ, aut suâ spontè la-
borârit, & crurum impotentiam
facit, ut nè tactum quidè per-
cipiat æger & ventris & vesicæ,
adeò ut nè primis quidè diebus
stercus aut urina nisi coactè red-
datur. Quod si morbus invetera-
verit, & stercus & urina agro

inscio prodit , tandèmq̃ue non
 longo post intervallo perit. Qui-
 bus fauces sanguine frequenter &
 noctu & interdiu replentur ,
 dùm nequè capitis dolor præ-
 gressus fuerit , nequè tussis , ne-
 què vomitus , nequè febris pre-
 henderit , nequè pectoris aut
 dorsi dolor tenuerit , in his nares
 & fauces inspiciendæ , nùm quod
 ulcus eo in loco , aut hirudo
 compareat?

SPUTA ET SUPPURATIO.

Aph.15. Ex sanguinis sputo , puris
 Sect. 7. sputum malum.

Aph.16. Ex puris sputo,tabes & fluxus ,
 Sect. 7. ubi verò sputum sistitur, moriun-
 tur.

Aph.81. Ex sanguinis sputo , puris spu-
 Sect. 7. tum & fluor , ubi autèm sputum
 retinetur , moriuntur.

Sent. IN febre sputi exscrescences li-
 242. vidæ , nigræ , biliosæ , subsisten-
 Coac. tes quidèm malæ sunt , si verò
 pro ratione excernantur , utiles.

Sent. QUIBUS salsa sputa cum tussi
 243. subsistunt , iis corpus velut efflo-
 Coac. rescentibus pustulis rubescit, an-
 te

tè obitum verò exasperatur.

EXSCREATIO frequens, si quidè etiam aliud quoddam signum affuerit, phrenitidem portendit.

Sent.
244.
Coac.

IN omnibus autè laterum & pulmonum morbis, sputum promptè ac citò excreari necesse est, flavumque sputo permixtum esse. Quod si multò post dolorem flavum, aut non commixtum rejicitur, nèc non sinè multà tussì, vitiosum censetur. Omnino autè pravum flavum, si sincerum est, & glutinosum, & candidum, & rotundum, itèmq; vehementè ex virore pallescens, quodque spumosum est, & lividum & æruginosum. Aliquantò verò deterius quod sic est sincerum, ut nigrum quoquè videatur. At flavum cui paulùm sanguinis admistum est, initio quidè salutem pollicetur, quod verò septimo die, aut longiore spatio tale apparet, non adeò tutum. Admodùm autè sanguinolentum, aut quod statim initio livescit, perniciem præferet. Pravitatem etiam indicant &

Sent.
390.
Coac.

spumantia , & flava , & nigra
& æruginosa viscosaque , & quæ
cumquè celeritèr colorantur
Mucosa autèm & fuliginosa, tùm
celeritèr colorantur , tùm secu-
rora sunt. Quæ verò intrà quinq-
tum diem , dùm coctionem acci-
piunt , colorantur , meliora cen-
sentur.

Sent. SPUTUM autèm quodcumquè
391. dolorem non tollit , malum si-
Coac. gnificat , quod verò solvit , bon-
num.

Sent. QUIBUS cum bilioso purulen-
392. tum sputum , aut seorsum , aut
Coac. simul permixtum educitur , ii un-
plurimum decimo-quarto die in-
tereunt , nisi malum aut bonum
aliquod ex his quæ priùs descrip-
ta sunt , contingat. Alioquì certè
pro ratione mors expectanda est ,
atquè in his præcipuè quibus sep-
timo die sputum hujusmodi pro-
cedere cœpit.

Sent. PURULENTOS moderatiùs ha-
406. bentes , si sputa graveolentia
Coac. consequantur , recidiva interi-
mit.

Sent. QUI in morbo laterali sputa re-
407. jiciunt purulenta , aliquantulum
Coac.

Bilioſa, rotunda, aut purulenta aliquantulum cruenta, iis temporis progreſſu periculum creatur. Perniciem etiã denunciant ſputa nigra, fuliginofa, aut quibus qualia ex vino nigro ſunt.

Qui ſpumantem ſanguinem ſpuitione rejiciunt, cum præcordiorum dextrorum dolore, iis ex jecinore prodiſt, & plerumque pereunt.

Sent.
408.
Coac.

Sputa viſcida, ſalfuginofa, cum raucitate, malo ſunt. Quod ſi ad hac aliquid etiã in pectore ſublatus ſit, malum ſignificat. In his extenuatis cervicis dolores perniciem denotant.

Sent.
413.
Coac.

Hepaticis ſputum multum cruentum, ſivè intus ſubputridum, ſivè ſincerè bilioſum fuerit, ſtatim perniciem denotat.

Sent.
446.
Coac.

At de ſputo & tuſſi eorum quos tabes malè habet, eadem mihi dicenda ſunt quæ de purulentis ſcripſi. Eum namquè qui probè levare volet, convenit ſputum facilè tuſſi rejicere, eſſeque album & æquale, unius coloris, & ſinè pituita. Quod à capite deſluit ad nares vertatur, nequè ſe-

Præd.
lib. 2.
pag. 91.

brisprehendat , ut nèc cibos impedi-
at , nequè sitim faciat. Al-
vus autèm quotidie deiciat , &
quod secedit durum esto , & iis
quæ assumuntur conveniens. Ho-
minem quàm minimè tenuem
esse convenit. Pectus verò lau-
dandum quadratum & hispidum,
cujusque cartilago exigua & ad-
modum carnosae est. In quo nam-
que hæc omnia inerunt , is ma-
ximè superstes futurus est. At qui
nihil horum habuerit, exitio ma-
ximè est affinis. Juvenes verò qui
in pectore pus colligunt ex humo-
rum decubitu, aut fistulâ , & alio-
quopiam id genus , aut ex abs-
cessus reversione , ii , nisi multa
admodum bona signa affecuti
sint , minimè evadunt. Moriun-
tur verò ejusmodi homines sub
Autumno , valdeque & ex
aliis morbis longis plerique sub
hoc tempus pereunt. Ex reliquis
autèm minimè evadunt , tum
virgines , tum mulieres , quibus
ex menstruorum suppressione ta-
bes contingit. Quod si ex his ali-
qua superesse volet , cum multa
laudabilia signa accedere , tum

verò menses luculentè & manifestè comparere oportet, alioquin nihil spei relictum est. At qui ex sanguinis eruptione, pectore pus colligunt, tum viri, tum mulieres, ac virgines, ii certè haud minùs supersunt. Caterùm omnia signa tam suppuratorum quàm tabescentium, animo reputantem, tum superfuturum, tum etiàm periturum prædicere oportet. Ex sanguinis autèm eruptione maximè supersunt, quibus in dorso & pectore dolores adsunt melancholici, & ex sanguinis eruptione dolore quodammodò levantur. Nequè enim tusses admodùm, nequè febres succedunt, ac plerique sitim ad extremum usquè facillè tolerant. Sed recurrunt ferè sanguinis eruptiones, nisi abscessus succedant, ex quibus, ii optimi sunt, qui maximè cruenti. Qui verò in pectore dolores sentiunt, & temporis tractu extenuantur, tussi & difficultate spirandi conflictantur, si nequè febres prehendant, nequè suppurationes succedant, ex iis percontari oportet, si quan-

dò tussiunt & difficultèr spirant, nùm etiàm concreta quidam & modicè olens per tussim rejiciant? e. g. l. e.

Præn.
p. 41.
ad 43.

IN omnibus pulmonis & laterum doloribus, sputum celeritèr promptèque expui convenit, sputoque flavum valdè permixtum apparere. Etenim si multò post doloris initium quod flavum est, aut fulvum, aut multam tussim exhibeat, nequè valdè permixtum expuatur, deterius est. Flavum quippè si sincerum fuerit, periculum subesse testatur, album autèm & viscidum, & rotundum, inutile. Malum quoquè valdè viride, aut pallidum, itèmque spumans. At si adeò sincerum fuerit, ut etiàm nigrum appareat, id illis deterius est. Malum quoquè ubi nil expurgatur, nequè ipsum projicit pulmo, sed proptèr multitudinem fervet in gutture. In omnibus pulmonis morbis gravedines & sternutationes, tùm præire, tùm subsequi malum. Verùm in illis maximè lethalibus morbis, sternutatione utilitate non carent. At

in pulmonis inflammationibus si inter initia morbi sputum excernitur flavum non multò permixtum sanguine, salutare est & confert admodum. Septimo verò die ac tardiùs non adeò securum. Omnia autèm sputa mala sunt, quæ dolorem non sedant. Horum verò locorum dolores, qui nequè per sputorum purgationes, nequè fœcum alvi dejectionem, nequè venæ sectionem, aut medicamenta purgantia, & victûs rationem sedantur, eos ad suppurationem tendere sciendum est. Ex suppurationibus autèm admodum exitiales sunt, quæ, sputo adhuc quidèm bilioso existente, suppurantur, sive biliosum illud separatim, sive unà cum pure expuatur. Idque potissimum, si ab hujusmodi sputo suppuratio procedere cœperit, cùm morbus ad diem septimum pervenerit. Qui verò talia sput, nè de imo quarto die moriatur metus est, nisi quid boni accesserit. At in bonis quidèm signis hæc numerantur, facilè morbum sustinere, benè spirare, dolore

levari, sputum finè difficultate
rejicere, corpus æqualitèr cali-
dum & molle videri, finè siti
esse, urinas etiàm & alvi excre-
menta, & somnos, & sudores,
velut descriptum est, singula su-
pervenire bona existimanda sunt.
His enim omnibus sic contingen-
tibus, haud quaquam æger mori-
et. Quod si ex his quædam
quidè contingant, quædam
minimè non ultra decimum quar-
tum diem æger vitam producat.
Contrà verò, morbum ægrè su-
stinere, spirationem magnam &
densam esse, dolorem minimè
sedari, sputum ægrè rejicere,
vehementem sitim esse, corpus à
febre inæqualitèr detineri, al-
vum quidè & latera vehemen-
tèr calere, fronte, manibus, &
pedibus frigidis, urinas verò &
alvi excrementa, & somnos, &
sudores, una quæque qualia de-
scripta sunt, mala esse nosse con-
venit. Si quid enim ex his sputo
supervenerit, morietur æger
priusquam ad decimum quartum
diem perveniat, aut nono aut
undecimo die. Sic igitur conjicere

cere oportet, quod cum sputum istud valdè lethale sit, nequè etià ad decimum-quartum diem perducit. Ex his verò tùm malorum, tùm bonorum, subductâ ratione, prædictiones facere oportet. Sic enim quis potissimum verum assequetur. Reliquæ verò suppurationes magnâ ex parte rumpuntur, partim quidè vigesimo die, partim etià trigesimo, quædam quoquè quadragesimo, aliquæ etià ad sexagesimum diem deveniunt. Suppurationis autè initium fore ratione comprehendere oportet ab eo die quo primùm æger febricitavit, aut etià primùm rigor prehendit, & si pro dolore sibi pondus inesse in eo loco qui dolore affligebatur, dixerit. Istâ namque circâ suppurationum initia fieri solent. Ex hoc igitur tempore suppurationum ruptionem fore intrâ prædicta tempora expectandum est. Quòd si in altero tantùm latere suppuratio fuerit, tùm vertere, tùm ediscere ad hæc convenit, nùm dolor aliquis alterum latus detineat? Et nùm al-

tero calidius fuerit? Atquè ubi in latus sanum decubuerit, interrogare si quod ei pondus desuper impendere videatur? Sic enim altero latere, in quo pondus extiterit, suppuratio est. At purulentos omnes his signis dignoscere oportet. Primum quidem si febris non dimittit: Verum interdum levior quidem, nocturno vero major detinet, & sudores multi oboriuntur, tussesque & tussienti cupiditas ipsis inest, nihil tamen effatu dignum expuunt, oculique cavi redduntur, malæ ruborem contrahunt, & ungues quidem in manibus adunci fiunt, digiti vero maximèque summi incalescunt, & in pedibus tumores fiunt, cibos minimè appetunt & pustulæ toto corpore oriuntur. Diuturnæ igitur suppurationes, his indicantur signis, quibus multa fides adhibenda est. Quæ verò breve habent spatium, sic indicantur, si quid eorum appareat, quæ inter initia fiunt, simulque si etiã aliquantò difficilius spiret æger. At ex his quæ citius aut tardius rumpuntur, sic:

deprehendere licet. Si quidem dolor inter initia oriatur, & spirandi difficultas, ac tussis sputatioque perseverant, & ad vigesimum diem extenduntur: intra hoc tempus, aut adhuc prius ruptionem expectato. Quod si mitior dolor fuerit, iisque cetera omnia pro hujus ratione respondeant, tardius ruptionem sperato. At ante puris eruptionem dolorem oboriri, & spirandi difficultatem, & sputi excretionem necesse est. Supersunt autem ex morbo hi potissimum, quos febris eodem post ruptionem die dimisit, quique cibos celeriter expetiverint, & siti liberantur, venterque tum exigua, tum coacta dejicit, & si pus album & leve, ejusdemque coloris fuerit, & a pituita liberum, citraque dolorem aut tussim vehementem educatur. Sic quidem optimè & celerrimè liberantur, sin minus qui ad ista proximè accedent. Moriuntur verò, quos febris non dimiserit, aut cum dimisisse videatur, iterum accenditur, & siti quidem vexantur,

cibos verò non expetiverint , & si alvus liquida dejecerit , pusque ex viridi pallidum & lividum, aut pituitâ permixtum & spumofum expuerint. Si hæc omnia contigerint , moriuntur. At quibus eorum partim quædam contigerint , partim minimè ; ex his nonnulli quidam intereunt , quidam etiàm ex longo temporis intervallo supersunt. Sed ex omnibus his signis existentibus , tum in his , tum in reliquis omnibus conjecturam facito. Quibus ex morbis *pulmonis* ad aures abscessus oboriuntur , & ad inferiores sedes suppurant , & fistulâ factâ aperiuntur , iis secunda valetudo contingere solet. Ista verò hunc in modum consideranda sunt. Si febris detinet , nequè dolor conquiescit , nequè sputum ex ratione procedit , nequè biliosæ sunt alvi egestiones , nequè benè solutæ ac sinceræ , nequè urina admodum multa , & copiosum habet sedimentum , suffragantur verò ad salutem reliqua omnia salutaria signa : in his hujusmodi , abscessus expectato.

Ac hi oriuntur quidē in locis inferioribus, quibus circā præcordia inflammationis aliquid subest; illi autē in superioribus, quibus præcordia mollia & doloris expertia perseverant, cumque difficultate spirandi aliquandiū vexatus fuerit quæ citrà ullam aliam evidentem occasionem quieverit. In vehementibus & periculo proximis pulmonum inflammationibus, abscessus ad crura omnes sanè utiles. Optimi verò qui sunt sputo mutationem subeunte. Si namque tumor & dolor suboriat, sputo pro flavo in pus verso, & foràs prodeunte, hoc modo tum securissimè æger superstes futurus est, tum citissimè citrà dolorem abscessus conquiescet. Quòd si nequè sputum rectè excernatur, nequè urina bonam subsidentiam habere videatur, periculum est nè articulo claudicet æger, aut ei multum negotii exhibeatur. Si verò dispareant abscessus & intrò recurrant, sputo non prodeunte, & detinente febre gravis morbi periculum, & delirii, & mor-

ris , ægro imminet. Ex suppurationis autem quos pulmonum morbi concitârunt , ferè seniores moriuntur , at ex cæteris suppurationibus , jûniore potius intereunt. At lumborum & inferiorum partium dolores , qui cum febre affligunt , si relictis inferioribus ad septum transversum transeant , exitiales sunt admodum. Ad alia igitur signa animum adhibere oportet. Si quidem ex pravis signis quippiam apparuerit , omni spe destitutus æger. Cùm verò suppurati uruntur , quibus purum quidè pus & album , & minimè fœtidum , ii servantur. At quibus subcruentum & cœnosum , moriuntur. Quod si irruente ad septum transversum morbo , reliqua signa minimè prava se ostenderint , hunc suppuratum fore magna spes est.

Vide DOLORES CAPITIS.
EXSCREATIONES. PLEURITIDEM. PULMONES. PUS. TABEM.

STRANGURIA.

Aph. 58. Ad recti intestini & uteri in-
Sect. 5.

inflammationem, renescque purulentos, stranguria succedit: àt je-
core inflammatione laborante
succedit singultus.

Vide DYSURIAM. ILEUM. VESICAM. URINAM.

STATU S.

Vide JACERE. SOMNUM.

STERNUTAMENTUM.

STERNUTATIO ex capite fit Aph. 51.
concoctato cerebro, aut per Sect. 7,
humectatâ capitis inanitate. Aër
enim intus contentus extrâ effun-
ditur. Strepitum autem edit,
quod ei per angustum sit transitus.

Vide HYSTERICAM PASSI-
ONEM. PLEURITIDEM. PULMO-
NEM. PARTUM.

STRIDOR.

Vide DENTES. CONVULSIONEM.

STUPOR.

QUÆ convulsionis in morem lib. 1.
D d iiii Præd.

Sent.
161.

affligunt, cum alto stupore quem *Cathocum* vocant, abscessus ad aures excitant.

S U D O R.

Aph.36. SUDORES febricitantibus boni
Sect. 4. qui cœperint tertio die, quinto, septimo, nono, undecimo, decimo-quarto, decimo-septimo, vigesimo-primo, & trigesimo-quarto, ii enim sudores morbos judicant. Qui verò tales non sunt, laborem, & morbi longitudinem, ejusdemque reversionem significant.

Aph.37. SUDORES frigidi in febre qui-
Sect. 4. dèm acutâ oborti, mortem; in mitiori autèm, morbi prolixitatem significant.

Aph.38. ET ubi in corpore sudor inest,
Sect. 4. ibi morbum esse enunciat.

Aph.41. SUDOR copiosus de somno
Sect. 4. citrà manifestam causam obortus, corpus copiosiore uti cibo significat. Quòd si cibum non assumentis istud contingat, quod evacuatione opus sit, indicat.

Aph.42. SUDOR copiosus calidus aut
Sect. 4. frigidus sempèr fluens, frigidus

maiores, calidus minorem morbum significat.

FEBRICITANTI si sudor contin- Aph. 56.
gat non deficiente febre, malum. Sect. 4.
Prorogatur enim morbus mul-
tamque significat humiditatem.

QUIBUS cutis obtenditur arida Sent.
& dura, ii sine sudore moriuntur. 71.
At quibus laxa & rara, cum su- Sect. 5.
dore vitam finiunt.

SUDOR multus calidus aut fri- Aph. 63.
gidus semper fluens, humoris Sect. 7.
copiosam inesse significat. Hæc
igitur robusto quidem supernè,
debili verò infernè deducenda.

SUDORES diebus judicatoriis Aph. 4.
vehementè & velocitè suborti, Sect. 8.
periculosi, & qui ex fronte gut-
tarum & scaturiginum instar pro-
pelluntur, quique copiosi sunt &
valdè frigidi. Ejusmodi namque
sudorem cum vi & summo do-
lore, expressioneque diuturnâ
prodire necesse est.

Ex tenuibus sudoribus pervi-
giles, ad calorem revocati ma-
lè habent.

IN febre tenuitèr exudantes,
malignè habent.

IN præcipitibus malis, tenues
49.
Coac.

circà caput maximè sudores oboriri & corporis incontinentiâ quâdam jactari, malum indicat, rùm verò præcipuè pernicies intenditur, si ista cum urinis nigris contigerint, & spiritus magnus & concitatus adfuerit.

Sent. Qui ex sudoribus perfrigerantur ac celeritè recalescunt, malè habere judicantur.

52. Coac. Qui in tenuibus malis tenuitè exudant, & quâdam corporis incontinentiâ jactantur, malè habent.

Sent. TURBULENTÆ cum confidentiâ expergefactiones, quæ mentem emouent, malo sunt, ac convulsiones minantur, præsertim verò si cum sudore contingant. Quin & cervicis ad dorsi perfrictiones, convulsiones portendere videntur, ac multò magis quæ totum corpus pervadunt, in quibus mictiones membranularum speciem referunt.

Sent. QUIBUS circà initia tenues suboriuntur sudores, & urinæ concoctæ emittuntur cum magnâ totius corporis æstuatione, si præter rationem perfrigescant, & rursùs celeritè perurantur, &

torpore , sopore , aut convul-
sione tententur , ii perniciosè af-
fecti sunt.

TENUITER exudantes cum ca-
pitis dolore & alvo interceptâ ,
ad convulsiones proni sunt. Sent.
177.
Coac.

SUDORES autèm partim qui-
dèm sensim procedentes juvant ,
partim verò universim effusi , &
quæ affatim fiunt sanguinis de-
tractiones nocent. Sent.
360.
Coac.

SUDOR optimus sanè qui fe-
brem die judicatorio tollit. Utilis
autèm & quæ allevat. Malus ve-
rò frigidus , & ubi caput dunta-
xat & cervix insudat. Nam &
temporis diuturnitatem , & pe-
riculum denunciat. Sent.
572.
Coac.

SUDOR autèm frigidus , cum
acutâ quidèm febre , exitium ,
cum mitiore verò , diuturnum
fore morbum significat. Sent.
573.
Coac.

SUDOR unâ cum febre , acuto
morbo urgente , malus. Sent.
574.
Coac.

SUDOR in febribus acutis mul-
tus & copiosus , damno est. Sent.
58.

Ex sudoribus pervigiles & ad
calorem revocati , malè habere
judicantur. lib. 1.
Præd.
Sent.
68.

IN febre cum sudoribus , vocis lib. 1.
Præd.

Sent. ex capitis dolore defectiones, si
 94. per se resolvuntur ægri ac præter
 lib. I. voluntatem excrementa demit-
 Præd. tunt, malumque remitti videatur, diuturniorem morbum metuere oportet. In his novus subortus rigor damnandus non est.

Præn. SUDORES optimi quidè, per
 pag. 38. omnes morbos acutos, qui diebus judicatoriis contingunt, & penitus febre liberant. Boni verò, quicumquè toto corpore oriuntur, faciuntque ut æger morbum faciliùs ferre videatur. At qui nihil tale efficiunt, minimè sunt utiles. Pessimi autèm frigidi, quique circà caput tantummodò, faciem & cervicem exoriuntur. Ii namque, cum acutâ febre, mortem, cum mitiore verò, morbi longitudinem prænunciant. Quique per totum corpus; eodem modo, atquè ex capite, fiunt. Qui verò *mili* formam referunt, & circà cervicem tantum oboriuntur, pravi, boni autèm qui guttatim & cum exhalatione fiunt. Atquè hoc in totum de sudoribus animadvertere oportet, quod

nonnulli quidè ex corporis dissolutione , quidam etià ex inflammationis vehementiâ contingunt.

Vide FEBRES. HORROREM.
RIGOREM.

SUFFITUS.

ODORAMENTORUM suffitus Aph.28.
muliebria educit , & ad alia ple- Sect. 5.
rumque utilis esset , nisi capitis
gravitatem inferret.

SUFFOCATIO.

Si febre vexato , nullo existen- Aph.34.
te in faucibus tumore , repentina Sect. 4.
accidat strangulatio , lethale.

IN præcipitibus malis strangu- Sent.
latus , gracilescentibus faucibus , 61.
perniciem minatur. Coac.

PER febres repentiè strangu- Sent.
lari , & devorare non posse , ci- 277.
trâ tumorem , malum est. Coac.

Vide APOPLEXIAM.

SURDITAS.

QUIBUS biliosæ sunt dejectio- Aph.28.
Sect. 4.

nes, hæ obortâ surditate cessant,
& quibus adest surditas, his
exortis biliosis dejectionibus, fi-
nitur.

Sent. In præcipitibus & turbulentis
190. morbis obveniens surditas, malo
Coac. est. Quin & in longis morbis ma-
lum portendit, ac in his ad co-
xendices labores convehit.

Sent. IN febribus enata surditas, al-
191. vum remoratur & sistit.

Coac. QUI surditate cum capitis gra-
Sent. vitate ac præcordiorum conten-
195. tione vexantur, si oculorum acies
Coac. perturbatur, in iis sanguinis è
naribus fluxum sperare oportet.

Sent. IN acutâ febre aures obtusæ
196. vehementem insaniam porten-
Coac. dunt.

Sent. GRAVI surditate tentati, dùm
197. aliquidprehendunt tremuli, lin-
Coac. guæ resolutione ac torpore af-
fecti, malè habere judicantur.

Sent. IN surditate ac torpore ex
208. naribus substillatio molestiam
Coac. quamdam exhibet. Iis vomitio
ac alvi perturbatio conveniet.

Sent. SURDITATEM in febribus ena-
210. tam, sanguinis ex naribus proflu-
Coac. vium, ac alvi perturbatio tollit.

SURDITAS pus intrò colligen- Sent.
tibus suborta , sanguinolentam 420.
dejectionem denunciat. His sub Coac.
mortem nigra egeruntur.

SURDITAS cum urinis præru- Sent.
bris , non subsistentibus , & su- 32.
blimamentis , mentis emotio- lib. 1.
nem minantur. In his morbo Re- Præd.
gio corripì malum est. Quin
etiàm malo est ex morbo Regio
fatuitas aut stupiditas. Hos qui-
dè vox deficere solet absquè
sensuum læsione. Quin & alvus
nonnunquàm affatim prorumpit
(quale quid *Hermippo* contigit ,
& mortuus est.)

IN præcipitibus & turbulentis Sent.
morbis obveniens surditas, perni- 33. l. 1.
ciem minatur. Præd.

Ex surditate abscessus ad aures Sent.
contingere consentaneum est , 159.
præsertim verò si implaciditas lib. 1.
quædam aut iniquies , corporis ja- Præd.
ctatio succedat. Ac intèr hos , in
iis qui sopore detinentur , ista
magis sperare oportet.

Vide **DOLORS CAPITIS. EX-
CREMENTA. FEBRES.**

S U S P I R I A.

Aph. 54. IN morbis acutis cum febre,
Sect. 6. gemebundæ spirationes malæ.



TABES

TABES ET TABIDI.

TABES præcipuè contingit Aph. 9.
 ætatibus, quæ sunt ab anno Sect. 5.
 decimo-octavo, ad trigesimum-
 quintum.

IN tabe vexatis, si sputum quod Aph. 11.
 tussi rejiciunt carbonibus infu- Sect. 5.
 sum gravem odorem emittat, &
 capilli è capite defluant, lethale
 est.

IN tabidis si capilli è capite Aph. 12.
 defluant, ii succedente alvi pro- Sect. 5.
 fluvio, moriuntur.

TABE detento succedens alvi Aph. 14.
 profluvium, lethale. Sect. 5.

TABES maximè fiunt, ab anno Aph. 7.
 octavo decimo usquè ad quin- Sect. 8.
 tum tricesimum.

QUÆ secundùm naturam ad Aph. 8.
 tabem disposita sunt, omnia qui- Sect. 8.
 dèm vehementia: quædam verò
 etiàm lethalia. Secundùm au-
 tèm, si quidèm in eo tempore
 ægrotet. Cùm tempus ipsum unà
 cum morbo impugnet, velut
 cum febre ardente Æstas, cum
 hydrope Hyems. Natura enim
 longè superior est: Lienì verò
 plus affert timoris. Ee.

Sent. TABIDIS in aquam marinam
435. expuentibus, si pus fundum pe-
Coac. tit, celerem perniciem denun-
ciat.

Sent. TABIDI si capilli è capite de-
436. fluunt, alvi profluvio moriun-
Coac. tur. Et tabidis si succedant alvi
profluvia, moriuntur.

Sent. SPUTORUM retentiones in ta-
437. bescentibus, mentem ad delira
Coac. verba commovent. In his sangui-
nis profluvium per ora venarum
in ano sanguinem fundere solita
existere posse spes est.

Sent. TABES maximè periculosæ
438. sunt, quæ ex ruptione venarum
Coac. crassarum, & ex capitis distilla-
tione contingunt.

Sent. IN tabidis pruritum sentientia
440. corpora ab alvi suppressione,
Coac. malo sunt.

Sent. IN naturis ad tabem promptè
441. comparatis, si fluxiones ad gin-
Coac. givas & dentes compareant, ma-
lum denunciant.

Sent. PUSTULARUM eruptiones, ve-
444. lût summâ cute levitèr laceratâ
Coac. aut vellicatâ, totiùs habitûs ta-
bem & corruptionem denun-
ciant.

CUM spirandi difficultate arescentes, in tabe crudâ, multa educunt, exitialitèr habent.

Sent.

445.

Coac.

Vide GRAVIDAM. PRÆCORDIA. PULMONES. PUS. RESPIRATIONEM. SPUTUM. TEMPUS.

TEMPERAMENTUM.

QUIBUS nares naturâ sunt humidiores, & genitura humidior, ii morbosiore sunt valetudine, at quibus contraria sunt, salubriore.

Aph. 2.

Sect. 6.

CORPUS autem habilissimum, quadratum est, nequè gracile, nequè obesum: nam longa statura, ut in juventâ decora est, sic maturâ senectute conficitur: corpus gracile, infirmum: obesum hebes est.

Cels.

lib. 2.

c. 1.

OBESI plerumque acutis morbis, & difficultate spirandi strangulantur, subitoque sæpè moriuntur.

Cels.

lib 2.

cap. 1.

SUNT quædam proprietates hominum, sinè quarum notitiâ non faciliè quicquam in futurum præfagiri potest.

Cels.

l. 2. c. 2.

TENUIORIBUS magis sanguis,

Cels. l. 2.

E e ij

c. 10.

plenioribus magis caro abundat.

Celf. 1.3. c. 6. VENIS maximè credimus, fallacissimæ rei, quia sæpè istæ lentiores, celerioresvè sunt, & sexu, & ætate, & corporum naturâ.

Celf. 1.5. c. 26. FACILIUS sanescit puer, vèl adolescens, quàm senior; valens, quàm infirmus: nequè nimis tenuis, nequè nimis plenus, quàm si alterum ex his est: integri habitûs, quàm corrupti; exercitatus, quàm iners: sobrius & temperans, quàm vino, venerique deditus.

Vide ÆTATEM. CRASSOS. NATURAM. REGIONEM. TEMPUS. HYGIEINEM.

TEMPUS ET TEMPESTAS.

Aph. 1. TEMPESTATUM anni mutationes, potissimùm morbos pariunt, & in ipsis anni tempestatibus magnæ mutationes frigoris & caloris, aliaque pro ratione ad hunc modum.

Aph. 2. NATURÆ, hæ quidè̃m ad Æstatem, 3. aliæ verò ad Hyemem benè, vèl malè habere consuevere.

PER anni tempestates , quando Aph. 4.
eodem die modò calor , modò Sect. 3.
frigidus sit , Autumnales morbos
expectare convenit.

AUSTRI auditionis hebetu- Aph. 5.
dinem & visionis caliginem in- Sect. 3.
ducunt , & capitis gravitatem ,
corpus torpidum & languidum
reddunt , cum sic invaluerint ,
ista in morbis patiuntur. Sin
Aquilonia tempestas fuerit , tus-
ses movet , fauces exasperat , al-
vos indurat , urinam supprimit ,
horrores excitat , laterum & pe-
ctoris dolores. Cum sic invalue-
rit , ejusmodi in morbis expe-
ctanda sunt.

CUM Æstas Veri similis fue- Aph. 6.
rit , in febribus copiosos sudores Sect. 3.
expectare oportet.

PER calores , febres , acutæ Aph. 7.
fiunt , & si quidè annus magnâ Sect. 3.
ex parte talis extiterit , qualem
temporis conditionem effecerit ,
tales ferè quoquè morbos ex-
pectare oportet.

TEMPORIBUS benè & ordine Aph. 8.
constitutis , & tempestivam tem- Sect. 3.
pestivitatem servantibus , morbi
qui facilè consistent & solvan-

tur, fiunt. In malè verò constitutis, qui nequè facilè consistunt, nequè facilè solvuntur.

Aph. 9. PER Autumnum omninò morbi
Sect. 3. acutissimi & maximè exitiales.
Ver autèm saluberrimum & minimè exitiale.

Aph. 10. AUTUMNUS tabidis malus.
Sect. 3. QUOD autèm ad anni temper-
Aph. 11. states attinet, si quidèm Hyems
Sect. 3. plus æquo sicca & Aquilonia fuerit, Ver autèm valdè pluvium & Austrinum, febres acutas & lippitudines, & intestinorum difficultates ad Æstatem oriri necesse est, præcipuè verò in mulieribus & viris naturâ humidioribus.

Aph. 12. AT si Hyems Austrina, & valdè
Sect. 3. pluvia & placida fuerit, Ver autèm plus justo siccum & Aquilonium, mulieres quidèm quibus partus ad Ver imminet, ex quavis causâ abortiunt. Quæ verò pepererint, imbecillos & morbosos infantes edunt, ità ut vèl statim intereant, vèl tenues & valetudinarii vivant. Cæteris autèm mortalibus difficultates intestinorum, & lippitudines arida oriuntur, senioribus verò de-

fluxiones brevì interficientes.

SI verò Æstas plùs æquo sicca Aph.13.
& Aquilonia, Autumnus verò Sect. 3.
admodùm pluvius & Austrinus
fuerit, capitis dolores ad Hye-
mem oriuntur, & tusses, & rau-
citates, & gravedines, nonnul-
lis etiàm & tabes.

SI verò Aquilonius fit & finè Aph.14.
pluviis, iis quidèm qui naturâ Sect. 3.
sunt humidior & mulieribus
commodus, reliquis autèm lip-
pitudines erunt siccæ & febres
acutæ & diuturnæ, nonnullis ve-
rò etiàm melancholiæ.

Ex anni autèm conditionibus, Aph.15.
in totum magnæ siccitates assi- Sect. 3.
duis imbribus sunt salubriores,
minùsque lethales.

PER assiduos imbres morbi Aph.16.
magnâ ex parte oriuntur, cùm Sect. 3.
febres longæ, tùm alvi fluxio-
nes, putredines, comitiales,
apoplexiæ & anginæ. Per ma-
gnas autèm siccitates, tabitudi-
nes, lippitudines, articulorum
dolores, urinæ stillicidia, & in-
testinorum difficultates.

AT status temporum quotidiana- Aph.17.
ni, Aquilonii quidèm corpora Sect. 3.

densant, valentiora, expeditiora, benè colorata, & melius audientia reddunt, alvos exsiccant, oculos mordent, & si thoracem dolor aliquis priùs habuerit, eum magis irritant. Austrini autèm corpora exsolvunt & humectant, gravem auditum, & capitis gravitatem, & vertigines afferunt, oculis & corporibus difficilem motionem inducunt, & alvos humectant.

Aph.20. VERE quidèm infania, melancholiæ, comitiales, sanguinis profusiones, angina, gravedines, raucitates, tusses, lepræ, impetigines, vitiligines, & pustulæ ulcerosæ plurimæ, & tubercula, & articulorum dolores.

Aph.21. ÆSTATE autèm horum nonnulli, & febres assiduæ, & ardentes, & tertianæ plurimæ, & quartanæ, vomitiones, alvi profluvia, lippitudines, aurium dolores, oris exulcerationes, genitalium putredines & sudamina.

Aph.22. AUTUMNO verò, etiàm æstivi multi, & quartanæ febres atquè erraticæ, Lienes, aquæ inter cutem, tabes, urinæ stillicidia, intestinorum

intestinorum levitates, & difficultates, coxendicum dolores, anginae, crebri anhelitus, volvuli, comitiales, insaniae & melancholiae.

HYEME verò morbi laterales, Aph. 23. pulmonum inflammationes, le- Sect. 3. thargi, gravedines, raucitates, tussis, dolores pectorum, laterum & lumborum, capitis dolores, vertigines & apoplexiæ.

SALUBERRIMUM Ver est, pro- Cels. ximè deindè ab hoc Hyems, pe- l. 2. c. 1. riculosior Æstas, Autumnus longè periculosissimus. Ex tempestatibus verò optimæ, æquales sunt, sive frigidae, sive calidae: pessimæ, quæ variant maximè: quò fit ut Autumnus plurimos opprimat.

SALUBERRIMI sunt sereni dies: Cels. meliores pluvii, quàm tantùm lib. 2. nebulosi, optimique Hyeme qui c. 1. omni vento vacant: Æstate quibus favonii perflant. Si genus aliud ventorum est; salubriores septentrionales quàm subsolani vel austri sunt.

VENTUS ubiquè ferè à mediter- Cels. 1. raneis regionibus veniens, salu- 2. c. 1. bris, à mari, gravis. F f

Celf. PESSIMUM agrò est cœlum ;
1.2. c. 1. quod agrum fecit.

Celf. OMNI resolutione nervorum ad
1.2. c. 8. Medicinam non idonea sunt tem-
pora Hyems & Autumnus ; ali-
quid sperari potest Vere & Æsta-
te. Isque morbus mediocris vix
sanatur , vehemens sanari non
potest.

Celf. 1. MATUTINUM tempus remissius
3. c. 5. ferè est agris.

Celf. 1.3. A tempore meridiano omnis
c. 5. æger ferè pejor fit.

Celf. MATUTINUM tempus naturâ
1.3. c. 5. suâ levissimum est.

Celf. INTEGRO corpore , cibo tem-
1.3. c. 5. pus aptius est.

Celf. 1.3. SCIRE oportet optimum cibo
c. 5. tempus esse , febre finitâ.

Celf. 1.5. OPPORTUNISSIMUM curationi
c. 26. tempus , Vernalis est , aut certè
nequè fervens , nequè frigidum ;
si quidè vulnèra & nimius ca-
lor , & nimium frigus infestant ;
maximèque tamèn horum varie-
tas : ideòque perniciosissimus Au-
tumnus est.

Celf. PUSTULÆ maximè Vernis tem-
1.5. c. 26. poribus oriuntur.

Vide ÆTATEM. ÆSTATEM.

CALIDUM. FRIGIDUM. FEBRES.
HYGIEINEM. MORBUM. NA-
TURAM. REGIONEM.

T E N E S M U S.

MULIERI utero gerenti si cre- Aph.27.
bra & inanis desidendi voluntas Sect. 7.
(*Tenesmum* dicunt) accesserit,
abortum facit.

Vide EXCREMENTA.

T E S T I C U L I.

TESTICULI, pudendumque re- Sent.
tractum, malum denunciant. 494.

QUIBUS in tumorem sublato Coac.
ventre, pudendum rubor occu- Sent.
pavit, muliebribus purgamentis 530.
albis humidis subito procedenti- Coac.
bus, diuturnis febribus inte-
reunt.

T I N N I T U S.

AURES frigidaë, pellucidaë, con- Sent.
tractaëque perniciem minantur. 192.

IN præcipitibus morbis, mur- Coac.
mur edentes ac tinnientes aures Sent.
mortem prænunciant. 193.

F f ij

Coac.

Sent.
194.
Coac.

AURIUM sonitus, cum visus hebetudine, & ad nares gravitatis sensu, mentis excessum, ac sanguinis ex naribus profluvium præfagiunt.

Vide DOLOREM AURIS ET CAPITIS.

TORMINA.

Præd.1. At tormina, ea quidè omnia
2.p.104. mala sunt, si cum febre quidè invadunt, aut variis alvi recrementis, aut jecoris inflammatione, aut præcordiorum, aut ventris, aut quæcumquè doloribus cruciant, aut cibos cohibent, sitimque inferunt. Ac celerimè is perit, quem maxima pars horum malorum occupat. Huic verò plurimùm inest spei, cui horum paucissima adsunt. Isque morbus præcipuè pueros à quinto anno perimit, & qui eum superant, ad decimum usquè, cæteræ ætates tutiores sunt. Utilia autèm tormina sunt quæ his malis non affligunt. At ubi sanguis & strigmenta per alvum rejecta fuerint, septimo die

desinunt , aut decimo-quarto ,
aut vigesimo , aut quadragesi-
mo , aut intrà hoc tempus. Hu-
jusmodi namque dejectiones
etiàm eos , qui antè fuerunt in
corporibus , morbos tollunt : in-
veteratos quidè spatio tempo-
ris majore , recentes verò etiàm
paucis diebus levare possunt. Si
quidè & prægnautes ipsæ etiàm
plerumque ad partum supersunt,
& ex partu , fœtumque conser-
vant , etiàm si per multos men-
ses sanguis & strigmenta per al-
vum secedant , nisi dolore affli-
gantur , aut aliquod ex malis si-
gnis quæ in difficultatibus inte-
stinorum adesse scripta sunt , ac-
cesserit. Quod si horum aliquod
adesse visum fuerit , & fœtui
perniciem , ac prægnaanti peri-
culum denunciat , nisi post fœtus
abolutionem aut secundarum
dimissionem , ipsa tormina eo-
dem die , aut non multò post ,
cessaverint.

T O R P O R.

TORPOR in contraria celeritèr

F f iij

Sent.

56.

Coac.

permutatus , perniciem denotat.

Sent. 476. Coac. TORPORES & stupores præter consuetudinem evenientes , adfuturam syderationem denunciant.

Sent. 521. Coac. QUÆ torporis sensu afficiuntur , præcipuèque admotiones impotentes & perfractæ , circa judicationem vexatæ , anxietate laborantes , multo & tenui sudore diffluunt , in his alvus effusa malum denunciat.

Sent. 35. lib. I. Præd. UBI rigori torpor succedit , mentis alienatio significatur.

TREMOR.

Sent. 88. Coac. QUI furiosâ & vehementi mentis emotione tenentur , ii si tremuli evadunt , malignè habere judicantur.

Sent. 141. Coac. QUOS febris detinet , si tremor absquè judicatione conquiescit , iis temporis successu abscessus cum dolore purulenti ad articulos decumbunt , & vesica dolet.

Sent. 348. Coac. EX tremoribus quæ convulsiones fiunt cum sudoribus , recidivas minantur. In his judicatiõ-

hem facit novus subindè obortus rigor. Sed is priùs ardore circà ventrem exorto provocatur. Somnus in his multus convulsionem minatur, & frontis gravitates, ac mictio molesta est.

IN tremulis & anxietate vexatis, parvi ad aures tumores excitati, convulsionem denunciant, si alvus malè affecta sit. Sent. 353. Coac.

TREMORES senioribus in febre contingunt, atquè ubi apparent, calculi fortassè per urinas excluduntur. Sent. 599. Coac.

TREMORIBUS quæ convulsionem accedunt cum sudoribus, recidivas minantur. In his judicationem facit novus obortus rigor, qui priùs ardore circà ventrem oborto provocatur. Sent. 105. lib. 1. Præd.

QUIBUS capitis ac cervicis dolor, & totiùs corporis impotentia, cum tremore adest, ab iis sanguinis eruptio liberat. Quin etiam ista tempore dissolvuntur. Sent. 152. lib. 1. Præd.

Vide DEMENTIAM. FEBRES. FRIGUS. RIGOREM.

TUBERCULA.

Aph. 45. QUIBUS adfunt febres longæ,
Sect. 4. iis tubercula, vèl ad articulos
dolores innascuntur.

Aph. 8. Ex rupto intrò tuberculo, ex-
Sect. 7. solutio, vomitio, & animi de-
fectio contingit.

Aph. 57. QUIBUS in urinariâ fistulâ
Sect. 7. tuberculum innascitur, eo in pus
verso & rupto, dolor solvitur.

Aph. 66. QUIBUS longa tubercula, aut
Sect. 7. in articulis dolores ex febre
fiunt, ii copiosioribus cibis utun-
tur.

Sent. QUÆ cum dolore exoriuntur
199. ad aures tubercula, perniciem
Coac. minantur.

Sent. TUBERCULA ad aures excitata
202. in levitèr syderatis malo sunt.

Coac. IN diuturnis morbis non sup-
Sent. purantia aurium tubercula, mor-
203. tem adferunt.

Coac. IN furditate ac torpore è nari-
Sent. bus substillatio molestiam quam-
208. dam exhibet. Iis vomitio ac alvi
Coac. perturbatio conveniet.

Sent. AT quibus tuberculum ad ve-
473. ficam adnascitur, urinæ difficul-
Coac.

tatem adferens, iis quivis corporis habitus negotium faceffit, cuius quidè m solutio contingit per puris eruptionem.

QUÆ in sinceras tendunt vacuationes, omnibus quidè m ingravescens mali significationem præbent, his verò (suprà dictis) vel maximè. Atquè in hujusmodi casibus ad aures tubercula exoriri solent.

Sent.

III.

lib. I.

Præd.

Vide ÆTATEM. ANGINAM. CIBUM. DOLOREM. FEBRES. HYPOCONDRIAM.

TUMOR.

ARTICULORUM tumores & Aph. 25. dolores absquè ulcere, & podagricas affectiones, & convulsa, hæc magnâ ex parte, frigidâ largè effusâ levat & minuit, doloremque solvit. Moderatus namque torpor dolorem solvendi facultatem habet.

Sect. 5.

QUIBUS cum ulceribus tumores Aph. 65. conspiciuntur, ii ferè nequè convelluntur, nequè in furorem aguntur. At iis derepentè evanescentibus, quibus quidè m idè

Sect. 5.

tergo incidit , convulsiones & nervorum distentiones fiunt. Quibus verò à fronte, furores, aut lateris dolores acuti , aut puris collectio, aut intestinorum difficultas , si rubri tumores fuerint.

Aph.66. Si magnis & pravis existenti-
Sect. 5. bus vulneribus tumor non conspiciatur , ingens malum.

Aph.67. MOLLES boni , at crudi mali
Sect. 5. (tumores.)

Sent. MANUUM ac pedum tumores
63. cum rubore , perniciem denunciant.
Coac.

Sent. PARVI in longis morbis aurium tumores , si subindè sanguis è naribus profluat , & tenebricosa vertigo excitetur , exitio sunt.
105.
Coac.

Sent. IN tumoribus ad aures , urinæ celeritèr ac paucò tempore concoctæ damno sunt. Quin & perfrigerari itidem malum est.
205.
Coac.

Sent. IN diuturnis morbis suppurati ad aures tumores , nisi pus admodum album ac sinè odore reddant , exitium præcipuè que mulieribus afferunt.
206.
Coac.

Sent. AT verò molles & doloris expertes tumores , longiore spatio
281.
Coac.

finiuntur, nèc ità grave periculum afferunt, quod si nequè intra sexaginta dies desinunt, ac febris detinet, suppurationem expectare oportet. Idem verò aut secus quàm in præcordiis perpenditur in tumoribus qui circa ventrem sunt, nisi quòd hi quàm illi minùs suppurant, minimùm verò qui sub umbilico constituuntur. Atquè hi quidèm in tunicâ concluduntur, illi autèm fursùm diffunduntur. Ex quibus etiàm mortem magis afferunt, quicumque intrò rumpuntur. Reliquas autèm suppurationes quæ quidèm foràs erumpunt maximè sanè conducit, in quàm exiguum & acutissimum locum colligi. Quæ autèm intrò vergunt, ut nequè tumore, nequè dolore, nequè colore manifestas foris notas edant. Quod verò contrà fit, pessimum est. Harum autèm quædam, proptèr puris crassitudinem nullam de se significationem ostendunt. At recentes præcordiorum tumores inflammationis expertes, ac dolores qui in ipsis fiunt, murmur circa

præcordia exortum solvit, sed potissimum quidem ubi per urinas ac dejectiones elapsum fuerit, sin minus, ubi etiam hoc ipsum transmissum fuerit. Quin etiam ad infernas sedes devolutum juvat.

Sent. 623. **TUMORES** humefcente alvo
Coac. sublati in altum cum doloribus, malo sunt, alvo verò suppressâ, dum nè quid aliud innovetur, celeritèr rumpuntur, & maligniores sunt. In his vomitus pravus & maligni.

Sent. 86. **DOLENTES** fauces absquè tu-
Lib. 1. more, cum labore & molestiâ ac
Præd. suffocatione, præceps exitum minantur.

T U S S I S.

Aph. 54. **QUIBUS** tusses siccæ levitèr ir-
Sect. 4. ritantes in febribus ardentibus diù perseverant, ii non multum siti vexantur.

Aph. 13. **QUI** spumantem sanguinem
Sect. 5. sputo rejiciunt, iis ex pulmone educitur.

Sent. 204. **TUSSICULÆ** quæ cum crebris
Coac. oris sputationibus procedunt,

T

333

tubercula ad aures emolliunt.

TUSSES cum crebrâ oris salivatione , abscessum circa aures emolliunt.

Sent:

167.

lib. i.

Præd.

Vide HYDROPEM. SPUTUM.
TABEM.



VARICES.

Vide CALVUM.

VENTER.

Sent. **T**EMERARIJ ventris tumores in morbis longis, convulsiones afferunt.
 86.
 Coac.

Vide EXCREMENTA.

VENTRICULI MORSUS.

Vide FEBRES. HÆMORRHAGIAM.

VER.

Vide TEMPUS.

VERMES.

Sent. LUMBRICIS verò tenuibus &
 165. longis (qui *ascarides* dicuntur)
 Coac. in capitis dolore vexatis, consequente surditate & sopore, tubercula ad aures excitantur.

VERTIGO.

Sent. FEBRES vertiginosæ & cum te
 106.
 Coac,

nus intestini morbo, & sine hoc, perniciem intentant.

TENEBRICOSAS vertigines circa initia sanguinis ex naribus fluxio solvit. Sent. 341. Coac.

Ex venis in ano sanguinem fundere solitis aliquantùm apparentibus, tenebricosæ vertigines abortæ, parvam ac sensim factam partium resolutionem indicant, ex quo liberat venæ sectio. Et quicquid hujusmodi apparere solet, mali aliquid denunciat. Sent. 346. Coac.

VE S I C A.

Si quis sanguinem & grumos meiat, & stranguriâ laboret, dolorque ad perinæum, imum ventrem & pectinem pertingat, partes ad vesicam pertinentes malè affici significat. Aph. 39. Sect. 7.

QUIBUS inter septum transversum & ventriculum pituita concluditur, & dolorem exhibet, nequè in alterutrum ventrem viam habet, iis per venas in vesicam pituita versâ, morbi fit solutio. Aph. 54. Sect. 7.

QUÆ per vesicam excernuntur Aph. 68. Sect. 7.

spectare oportet, àn qualia sanis subeunt? Nàm quæ his minimè sunt similia, ea morbosiora. Quæ verò sanis similia, minimè morbosa.

Sent. VESICA dura & gravitèr dolens omninò quidèm mala est.
471.
Coac. Pessima verò si febris continua accesserit (vesicæ nàmque dolores interimendi vim obtinent) & alvus his nihil admodùm reddit. Eos autèm metu liberat urina purulenta procedens, in quâ album & leve subsidet. Quòd si nequè hæc levata fuerint, nequè vesica mollior reddatur, intrà primos circuitus laborantem moriturum expectandum est. Hoc verò pueris à septimo anno ad decimum- quintum præcipuè contingere solet.

Sent. VESICA intercepta maximèque
588. cum capitis dolore convulsio-
Coac. nem quamdam minatur. Quæ in his cum corporis sensu exsolvuntur, molestiam, non perniciem afferunt. Ac fortè etiàm aliquantulum desipiunt.

Sent. VESICA intercepta, præsertim
120. cum capitis dolore, convulsio-
lib. 1. nem
Præd.

nem minatur. Quæ in his cum corporis sensu exsolvuntur, molestiam exhibent, non tamen perniciem afferunt. Videndumque est nùm tale quid etiã mentem excutiat?

Vide SECTIONEM. URINAM.

V I C T U S.

TENUIS & exacta victûs ratio, Aph. 4. cum in morbis longis semper, Sect. 1. tùm in acutis ubi non admittitur, parùm tuta est. Ac rursus victûs qui ad summam pervenit tenuitatem, gravis, si quidẽ ad extremum perductæ plenitudines graves sunt.

IN tenui victûs ratione delin- Aph. 5. quunt ægri, ob quod magis læ- Sect. 1. duntur. Quodcumque enim peccatum in tenui quàm in paulò pleniore victûs ratione gravius esse solet. Idcirco etiã fanis parùm tuta est, quoniã errata graviùs ferunt. Eam igitur ob causam tenuis & accuratus victus paulò pleniore maximã ex parte periculosior est.

CUM ergò morbus est peracu- Aph. 7. Sect. 16.
G g

tus, extremos protinùs obtinet labores, & extremè tenuissimâ victûs ratione necessario utendum. Cùm verò non est, sed pleniorẽ victum adhibere concessum est, tam à tenui victu se subducere oportet, quàm morbus ab extremis recesserit.

Aph. 8. CUM morbi summa est vehementia, tùm vel tenuissimo victu uti necesse est.

Aph. 9. AT conjectura etiàm ex agro facienda, àn cum eo victu satis esse possit ad morbi vigorem usquè, àn non priùs ille deficiat, nequè cum tali victu satis esse possit, vel prior morbus deficiat & obtundatur?

Aph. 10. QUIBUS igitur statim vigor adest, iis protinùs victûs tenuis exhibendus, quibus verò postea vigor futurus est, iis sub ipsum vigoris tempus & paulò antè cibus subtrahendus. Antea verò uberior cibus exhibendus, quo æger satis esse possit.

Aph. 11. IN exacerbationibus cibum re-
Sect. 1. fugere oportet, exhibere enim noxium. Et quæcumque per circuitus ingravescunt, in ipsis ac-

cessionibus reformidare oportet.

SENEs facillimè jejunium tolerant, secundùm eos qui constantem ætatem degunt, minimum adolescentes, ex omnibus verò præcipuè pueri, atquè inter ipsos qui ad actiones obeundas promptiores existunt. Aph. 13.
Sect. 1.

QUÆ increscunt plurimùm calorem innatum obtinent, plurimo igitur indigent alimento, alioqui corpus absumitur. In senibus verò cum paucus calor insit, idcirco sanè paucis fomiti-
bus indigent, à multis namque extinguuntur. Eamdem etiàm ob causam nequè senibus, quòd eorum corpus sit frigidum, febres perindè acutæ contingunt. Aph. 14.
Sect. 1.

PER Hyemem & Ver ventres naturâ calidissimi, somnique longissimi. Per ea igitur tempora copiosiora cibaria exhibenda, si quidèm plurimus est calor natus, ideoque copiosiore indigent alimento. Quod indicant ætates & Athletæ. Aph. 15.
Sect. 1.

VICTUS ratio humida cum febricitantibus omnibus, tum pueris maximè, atquè aliis qui ejus-
modi. Aph. 16.
Sect. 1.

modi victu uti consueverunt,
confert.

Aph.17. ANIMADVERTENDI sunt etià.
Sect. 1. quibus semel, aut bis, & quibus
copiosior, aut paucior, aut per
partes cibus offerendus est. Ali-
quid autem tempori, regioni,
ætati & consuetudini conceden-
dum.

Aph.18. PER Æstatem & Autumnum
Sect. 1. cibos gravissimè ferunt, per
Hyemem facillimè. Ver post
Hyemem secundum locum ob-
tinet.

Aph.19. QUIBUS per circuitus accessio-
Sect. 1. nes contingunt, nihil dato, ne-
què cogito, sed de ciborum ac-
cessione antè judicationes detra-
hito.

Aph. 7. ATTENUATA longo temporis
Sect. 2. intervallo corpora, lentè refi-
cere oportet, at quæ brevi, ce-
leritèr.

Aph.10. IMPURA corpora quo plùs nu-
Sect. 2. trias, eò magis lædas.

Aph.11. POTU quàm cibo refici procli-
Sect. 2. vius est.

Vide CIBUM. FEBREM. HY-
GIEINEM. MEDICUM. POTUM.
REMEDIIUM.

VIGILIA.

IN pervigiliis quibusdam quæ Sent.
cum angore & anxietate fiunt, 157.
ad aures abscessus maximè ob- lib. I.
veniunt. Præd.

Vide CONVULSIONEM.

VISUS.

Vide DOLOREM.

VITA.

Vide CRASSOS.

VITILIGINES.

Vide IMPETIGINES.

VOMITUS.

MULIERI sanguinem vomitio- Aph. 32.
ne rejicienti, menstruis erum- Sect. 5.
pentibus, solutio contingit.

QUI sanguinem vomitione re- Aph. 37.
fundunt, si quidè citrà febrem Sect. 7.
contingat, salutare, cum febre
verò, malum. Curandum verò.

refrigerandi & adstringendi vim habentibus.

Aph. 80. Ex sanguinis vomitione tabes
Sect. 7. & puris per superiora purgatio.

Sent. IN febre distractio velut à vo-
55. mitu in excreationem desinens,
Coac. malum portendit.

Sent. QUI sanguinem evomunt cum
426. febre multâ, dolore ad mam-
Coac. mam, thoracem & dorsum,
quibus, inquam, hæc insunt om-
nia, ii brevi moriuntur; quibus
autem non omnia, nequè intense
adsunt, tardiùs. Ad summum
autem diebus quatuordecim in-
flammationem concipiunt.

Sent. QUI spumantem sanguinem
433. evomunt, partibus infrà septum-
Coac. transversum dolorem nequa-
quàm sentientibus, iis ex pul-
mone vomitio fit. Ac quibus qui-
dè in signis in eo venæ ruptio
fit, copiosus vomitione rejicitur,
periculumque imminet. Quibus
verò minor, minùs rejiciunt, &
majorem sanitatem promittunt.

Sent. BILIS vomitus vulnere succe-
507. dens, malum denunciat, præci-
Coac. puèque in capitis vulneribus.

Sent. VOMITIO autem maximè est
556.
Coac.

innoxia, quæ pituitâ & bile permixta est, dùm nè admodùm copiosa sit. At sinceriores vomitiones, deteriores sunt. Viridis quoquè vomitus & niger, & lividus, vitiosus est. Quòd si omnes colores idem vomat, exitiale est. celerrimum autèm exitium indicat lividus & mali odoris. Mortem quoquè adfert ruber vomitus, isque præcipuè si cum majore conatu & dolore contingat.

VOMITIONES exiguæ, biliosæ, malum denunciant, tùm verò præcipuè si pervigilio conflictentur agri.

Sent.
558.
Coac.

VOMITUS parvi & frequentèr repetentes, biliosi, sinceri, mali sunt in copiosiore ventris subductione, & intenso lumborum dolore.

Sent.
560.
Coac.

UBI ex vomitu anxietudo occupat, vox stridula est, oculi pulvere obfiti, insania portenditur, ac tales vehementi insaniâ correpti, voce defecti intereunt.

Sent.
561.
Coac.

IN vomitu eum qui siti premeatur sitis expertum esse malum est.

Sent.
562.
Coac.

QUI vomituri sunt, iis antea os crebrâ salivatione impletur.

Sent.
566.
Coac.

Sent. CREBR O repetentes , iisdem
571. perseverantibus casibus, vomitio-
Coac. nes , ad judicationem nigrâ vo-
mitione refundunt. Quin etiâ
tremulos ægros faciunt.

Sent. PRURITUS omnibus nigrorum
636. secessum denunciant & grumoss
Coac. vomitione refusos. Tremulæ
etiâ affectiones cum morfu ac
capitis dolore , nigras dejection-
nes prædicunt. Tales verò præce-
dit, vomitus, & ubi vomuerint,
talìa multa prætereà revelluntur.

Sent. VOMITUS virulenti & ærugi-
10. nosi, cum capitis dolore, surdi-
lib. I. tate & insomniâ, promptam in-
Præd. saniam significant.

Sent. VOMITIONES quoquè variæ
60. I. I. malo sunt, præsertim si conti-
Præd. nentèr & assiduè prodeant.

Sent. VOMITIONES sincera & cum
62. I. I. angore aut incontinenti corporis
Præd. jactatione, damnandæ sunt.

Sent. VOMITIONES exiguæ, biliosæ,
79. I. I. malo sunt, tùm verò potissimùm
Præd. si pervigilio conflictentur ægri.
In quibus stillans nasus perni-
ciem minatur.

Præn. VOMITUS per quam est utilis,
p. 41. qui bilem pituitæ quàm maximè
permixtam

permixtam habet, ac nequè admodum crassus est, nequè multus. Qui enim sinceriores, peiores sunt. Si verò quod vomitione rejicitur *porrum* colore referat, aut lividum, aut nigrum fuerit, quisquis horum colorum adfuerit, pravus existimandus est. Quòd si eodem vomitu omnes hi colores rejiciantur, id exitiale est admodum. At lividus vomitus, si gravitèr olet, celerrimam mortem denunciat.

VOMITUS inutilis est gracilibus & imbecillum stomachum habentibus: utilis est plenis, & biliosis omnibus, si vèl nimium se replerunt, vèl parum concoxerunt. Nam si vèl plus est quàm quod concoqui possit, periclitari nè corrumpatur non oportet: si verò corruptum est, nihil commodius est, quàm id quâ viâ primum expelli potest, ejicere.

(VOMITUM) luxuriæ causâ fieri non oportere confiteor. Cels. l. i. c. 3.

Qui valere & senescere volet, (vomere) quotidianum non habeat. Cels. l. i. c. 3.

VOMITUS biliosus non voluntarius. Cels. l. 5. c. 26.

tarius vèl protinùs, ut percussus est aliquis, vèl dùm inflammatio manet, malum signum est in his duntaxat, quorum vèl nervi, vèl etiàm nervosi loci vulnerati sunt.

V O X.

Aph. 5. Si ebrium quempiàm vox deficit.
Sect. 5. ciat derepentè, convulsus moritur, nisi eum febrisprehendat, aut quâ horâ crapula solvi solet, ad vocem redeat.

Aph. 51. Quibus benè valentibus capitis dolores derepentè contingunt.
Sect. 6. statimque voce deficiunt, & sterunt, intrâ dies septem pereunt, nisi febris eos prehenderit.

Sent. In febribus vehementes mentis
65. emotiones cum taciturnitate, in
Coac. eo qui voce defectus non est, perniciem minantur.

Sent. Qui in febre assiduâ voce defecti
77. jacent, & oculis conniventibus
Coac. nictantur, hi evadunt quidem si post sanguinis ex naribus fluxum ac vomitum, ad loquelam & ad se ipsos redeant. Sin verò secùs accidat, cum spirandâ difficultate celeritè intereunt.

Quos vox cum febre & absque
ullâ iudicatione deficit, ii tremu-
li intereunt. Sent. 247.
Coac.

Vocis defectiones in febre
quæ convulsionis speciem præse-
ferunt & in mentis emotionem
cum silentio desinunt, perni-
ciem ostentant. Sent. 248.
Coac.

Quibus voces cum dolore de-
ficiunt, ii tandem non sinè sum-
mo cruciatu vitam cum morte
commutant. Sent. 249.
Coac.

Vocis defectiones cum vi-
rium exsolutione, ac alto stu-
pore (quem *Catochum* vocant)
perniciem minantur. Sent. 250.
Coac.

Contractæ vocis post me-
dicamenti purgantis potionem,
considerandæ nùm pravæ sint?
Horum plerisque tenues sudores
diffluunt, & alvi humectantur. Sent. 251.
Coac.

In vocis defectione respiratio
velut iis qui suffocantur conspi-
cuè elata & visui exposita, per-
niciem minatur. Animadverten-
dum etiàm est nùm delirium
prænunciet? Sent. 252.
Coac.

Vocis defectiones rigore sub-
indè correptis lethales, ferèque
ii capitis dolore conflictari solent. Sent. 255.
Coac.

Sent.
256.
Coac.

VOCIS defectiones cum virium exsolutione, in acutâ febre sinè sudore, sunt quidè lethales, cum sudore verò minùs, at temporis diuturnitas significatur. Ac fortassè quidè quibus ex morbi reversione tale quid contingit, securissimè habent. Ex iis autè maximo in periculo versantur, quibus sanguis ex naribus perfluit, & alvi effunduntur.

Sent.
157.
Coac.

VOX acuta ejulabunda, ac oculorum hebetudo, convulsionem minantur. His dolores ad inferiores partes demissi, toleratum sunt faciles.

Sent.
259.
Coac.

CREBRÆ & quæ cum sopore quodam consistunt vocis defectiones, tabem denunciant.

Sent.
17.
lib. I.
Præd.

UBI post vomitum anxiosum vox stridula est, oculi squalidi & pulvere obfiti, insania portenditur, non secùs ac *Hermoziga* conjugì accidit, quæ vehementer insaniâ correpta, voce defectâ interiit.

Sent.
19.
lib. I.
Præd.

DESIPIENTIÆ cum voce stridulâ & linguæ convulsione tremulâ, voces quoquè ipsæ tremulæ mentis vehementem alienationem

nem significant. In his durities
aut asperitas perniciem minatur.

VOCIS defectiones cum sin- Sent.
gultu pessimæ. 23. l. i.

VOCIS defectiones cum virium Præd.
exsolutione pessimæ. Sent.

QUIBUS vox in morbis acuta 24. l. i.
redditur, iis præcordia intrò tra- Præd.
hantur & tendunt. Sent.

VOCIS in febribus defectiones, 45. l. i.
quæ convulsionis speciem præse- Præd.
ferunt, in vehementem mentis Sent.
emotionem cum silentio vertunt, 54.
& perniciem ostentant. lib. i.
Præd.

VOCIS ex dolore defectiones, Sent.
tandem cum summo cruciatu 55.
mortem afferunt. lib. i.

Vide CONVULSIONEM. RIGO- Præd.
REM.

VULNUS ET ULCUS.

ULCERA undequaque glabra, Aph. 4.
maligna. Sect. 6.

AQUA inter cutem laboranti- Aph. 8.
bus orta in corpore ulcera, non Sect. 6.
facile sanantur.

ULCERA annua quæcumque Aph. 45.
fuerint, aut longius tempus ha- Sect. 6.
buerint, os abscedere est necesse,
& cicatrices cavas fieri.

Aph.24. Ex osse perfecto delirium, si
Sect. 7. ad vacuum usquè penetravit.

Sent. UBI febricitanti fauces exul-
276. cerantur, si aliud quoquè ex gra-
Coac. vioribus signis affuerit, pericu-
lum denunciandum est.

Sent. Ex vulnere convulsio lethalis.

355. VULNERE in thoracem accep-
Coac. to, si quidè externali vulneris

Sent. pars sanitatem receperit, interna

430. verò nequaquam, suppurationis
Coac. periculum impendet. Quibus au-

tèm interni vulneris cicatrix de-
bilis effecta est, promptè rescin-
ditur.

Sent. QUIBUS ex vulnere corporis
477. impotentia accidit, si quidè
Coac. febre citrà rigorem obortâ sani-
evadunt, alioquì dextrâ aut si-
nistrà parte syderantur.

Sent. ULCUS lividum & aridum,
496. aut pallidum effectum mortem
Coac. indicat.

Sent. QUIBUS concussus fuerit ce-
499. rebrum, vèl ex plagâ doluerit,
Coac. aut aliquo casu, his illicò vox
deficit, nequè vident, nequè
audiunt, ferèque intereunt.

Sent. Ex cerebri vulnere, febris ut
500. plurimùm, ac bilis vomitus suc-
Coac.

cedit, & corporis resolutio, iique perniciosè habent.

VULNERI succedens convulsio, malo est. Sent. 506.

Ex vulnere autèm ferè mors contingit, si cui vulneratum fuerit cerebrum, aut spinalis medulla, aut jecur, aut septumtransversum, vel cor, aut vesica, aut quædam grandis vena. Mors quoquè subit si in arteriam & pulmonem insignes valdè plagæ inflictæ sunt, ità ut percussio pulmone, minor sit qui per os prodit spiritus, quàm qui per vulnus excidit. Intereunt verò quibus nervi interiores, sive tenuis aliquis, sive crassus, vulnus acceperit, si plaga transversa fuerit & magna: quòd si parva & recta, nonnulli periculo eximuntur. Minimè autèm ab his vulneribus mors impendit, quæ in corporis partes, in quibus hæc non sunt, aut ab his quàm longissimè absunt, infliguntur.

At in vulneribus quæ in supercilium, aut paulò altiùs inferuntur visus acies obtunditur, & quò vulnus recentius est, eò ma-

Sent.
510.
Coac.

gis vident. Inveterascente autem aut tardante cicatrice, magis obtundi solet.

Sent. SERPENTIA oris ulcera in præ-
§14 gnantibus bono non sunt, ac
Coac. fortè etiàm alvi humectantur.

Sent. IN uterum jam gerentibus,
§29. fluxiones serpentia oris ulcera
Coac. cum dolore excitantes malum denunciant. In his sanguinis per ora venarum profluvium pessimum.

Sent. SERPENTIA ulcera suprà ingui-
628. na ad laterum inanitatem & pu-
Coac. bem enata, malè affectam alvum denunciant.

Sent. QUIN etiàm considerandum est
121. l. I. nùm ossium ad tempora præci-
Præd. siones convulsionem provocent?
An verò madido vulnus inflitum, aut circà initia sanguis magnâ copiâ effluens, convulsionem accersiverit?

Sent. QU rex vulnere cum tenui su-
128. l. I. dore sanguinem fundunt, ii ma-
Præd. lignè habent, & interloquendum derepentè moriuntur.

Sent. AT ulcera qui nosse volet qua-
Præd. l. lem quæque exitum habitura
2. p. 95. sint? Is imprimis quidèmi homi-

num naturas animadvertere debet, quænam ad ulcera melius, quænam etiã deterius affectæ sunt? Deindẽ ætates in quibus sua cujusque generis ulcera non facile profligantur? Locos etiã corporis in considerationem adhibere, quantũ alii aliis præstent? Ac præcipuè quænam horum cuique bona malavè accedunt, nosse debet? His si quidẽ omnibus cognitis, quænam cujusque eventa futura sint facile assequetur. Nequẽ existimandum est eum qui hæc non cognoverit, quinam futuri sint ulcerum exitus perspicere posse. Corporis autẽ naturæ probandæ sunt leves, moderatæ, firmis visceribus præditæ, nequẽ admodum carnosæ, nequẽ duræ, tum quæ colore sunt albo, aut nigro, aut rubro. Hæ etenim omnes probantur si puræ sunt. Deterius est si ex pallido mixtum colorem, aut pallidum, aut lividum habeant. Quæ verò naturæ suprà positis adversantur, eas deteriores esse constat.

IN his quæ circum articulos

Præd. contingunt, in maximum discrí-
lib. 2. men præcipitant pollices, ac
pag. 96. præcipuè pedum. Quibus verò ad
linguæ latus ulcus fit diuturnum,
animadvertendum ex dentibus
qui juxtà sunt nùm aliquis acutus
sit?

Præd. VULNERA autèm ferè quidèm
lib. 2. mortem afferunt, quæ magnas
p. 96. venas quæ sunt in collo & in in-
& 97. guinibus læserunt, deindè quæ
cerebrum & hepar, deinceps
quæ intestina & vesicam pertin-
gunt. Quæ sanè omnia magnam
perniciem afferunt, non eam ta-
mèn, ut (quod quidam existi-
mant) nemo ex his servari possit.
Nàm & his nominibus prædicti
loci multùm inter se differunt,
atquè ipsi modi. Nèc parùm
etiàm cujusque corporis consti-
tutio differt. Incidit enì inter-
dùm ut nequè febre, nequè in-
flammatione tentetur fauciatus,
interdùm etiàm nullâ ex causâ
febricitat, nèc aliquam corporis
partem inflammatio prorsùs oc-
cupat. At ubi is qui ulcere infe-
statur delirat, & vulnus facile
perfert, ad vulnus aggredi oportet.

ter, quod ex arte Medicâ, & eorum quæ consequuntur ratione adhibitâ, speratum exitum est habiturum. Ex cujusvis enim generis vulneribus mori homines contingit. Multæ namque in corporibus venæ tùm tenues tùm crassæ, si eò sponte suâ ferri contingat, sanguinis profusione interimunt, quæ si alio tempore pertundantur, utilitatem afferunt. Non pauca autem vulnera, quæ in contemnendis locis, ac nulla reformidabilia esse videntur in iis tanto dolore plaga cruciat, ut ægri respirare nequeant. Quidam verò præ vulneris dolore, quod nullo merito terreat, spiritum quidè traxerunt, delirio tamèn ac febre perierunt. Quibus enim aut corpus ad febrem est opportunum, aut mens promptè perturbatur, iis talia contingunt. Sed hæc mirari aut formidare desinet qui illud in animum induxerit, quod & cujusque animi & corpora plurimum inter se differunt & præstant. Vulnera igitur quæ talem occasionem, aut corpus, aut

mentem nacta sunt , aut adeo concitatum sanguinem , aut magnitudinem tantam habent , ut curatione sensuum integritas restitui nequeat , ab iis quidem , cujusque modi sint , præter diarias animi defectiones , abstinere oportet. Cæteris verò omnibus recens illatis manus admovere oportet , quo eos qui superfuturi sunt , à febribus & sanguinis profusione , ac depascentibus ulceribus (*Nomas* vocant) vindices. Diligentissimè autem ac diutissimè adversus ea quæ maximè terrent munire se æquum est.

Præd.
lib. 2.
pag. 98.
& 99.

QUOD ad vulnera capitis attinet , præcipuè mortem afferunt (ut antea scripsimus) quæ cerebrum attingunt quin & hujusmodi omnia terrent , os infigne denudatum , os medium desidens , os diffissum. At si ulceris osculum exiguum fuerit , ossis verò fissura longè pertingat , majus periculum subest. Quæ omnia magis terrent , ubi juxta futuram contingant , & in summâ capitis parte existunt. Percontari autem convenit in omnibus effatu di-

gnis capitis vulneribus , ubi adhuc recentes plagæ sunt aut ictus , num qui læsus fuit conciderit ? Aut profundo sopore correptus fuerit ? Hoc enim in casu majore curâ opus est , nimirum quod vulnus cerebrum senserit. Quod si recens plaga non fuerit , alia signa in considerationem ac consilium adhibere oportet. Præstat igitur eum qui capitis ulcere laborat , nequè febricitare , nequè insupèr sanguinis profusionem , aut inflammationem , aut simul dolorem aliquem accedere : aut si eorum quippiam appareat , citrà initia tutissimum esse fieri , paucoque tempore perseverare. Confert quoquè in doloribus , etiàm inflammationes , quæ in ulceribus fieri assolent , supervenire ; in sanguinis autèm profusionibus pus in venis conspici. Quæ etiàm in morbis acutis febribus conferre scripsi , ea in his conducere bonaque hic esse , ut contraria mala , existimanda sunt. At febris in capitis vulnere die quarto , aut septimo , aut undecimo exorta , valdè exitialis est.

Quam plurimis autem judicatio-
nem subit, si quartò quidè m ulce-
ris die febris cœperit, vigesimo,
velût scriptum est in febribus, quæ
ex non evidentibus causis origi-
nem trahunt. At si februm ini-
tiis delirium succedat, aut ali-
quod membrum fideretur, de
hominis morte existimatio fa-
cienda est, nisi aut prorsus opti-
mum aliquod signum supervenit,
aut corporis virtus subsit. Ve-
rum quânam id ratione contingat
animadvertendum est. Nàm &
homini spes salutis adhuc restat,
at claudum fieri articulum in
quem malum decubuit necesse
est, si modo æger superstes fu-
turus est.

Præd.
lib. 2.
p. 100.

M A G N A autem vulnera quæ
in articulis fiunt, si penitus ab-
scissi nervi sunt qui continebant,
absquè dubio claudos reddent.
Sìn dubium est quomodò nervi
affecti sint, si quidè m ex acuto
telo recta plaga est, ea transversa
melior. Quòd si grave fuerit &
retusum quod vulnus inflixit,
nihil inest discriminis. Sed &
vulneris altitudo aliaque signa

huiusmodi considerata sunt. Pus si ad articulum accedat, duriorum eum reddi necesse est. Quod si etiã tumores simul perseverarint, necesse est eum locum in multum tempus durum esse, & sano quoquẽ ulcere tumorem permanere, simulque ea inflecti ac extendi, ubi recurvato articulo curatio adhibita est. At quibus nervus excisurus esse speratur, iis cum maiore fiduciã claudicationem prædixeris, idque tum maximè, si quis nervorum inferiorum exsolutus fuerit. Nervus autem excisurus his indiciis deprehenditur, si pus album crassumque & diuturnum sub eo effluit, doloresque ac inflammationes ad articulum circa initia oriuntur. Quæ etiã contingere solent ubi os excisurum est.

QUÆ in cubitis discissa sunt, Idem. præcipuè cum inflammatione, ad suppurationem sectionemque & uersionem perveniunt.

ULCUS quoquẽ sive antè morbum, sive in morbo natum sit, Præn. P. 37. nosse oportet? Nam si periturus æger est, antè mortem lividum

& siccum, aut pallidum & siccum erit.

Si lividus, aut pallidus, aut varius, aut niger color est, scire: Cels. 1.5.c.26. licet malum vulnus esse.

PERICULOSA vulnera sunt: Cels. ubicumquè venæ majores sunt, Idem. quoniam exhaurire hominem profusione sanguinis possunt.

PESSIMA quæque plaga curva: Cels. 1.5. est: tutissima quæ lineæ modo c. 26. recta est.

ALBUM aut rubicundum esse: Cels. vulnus commodissimum est.

1.5.c.26. VETUS ulcus scapello circum-

Cels. cidendum est, excidendæque: 1.5.c.26. ejus oræ, & quidquid super eas livet, æquè incidendum.

OMNIS feræ morsus habent: Cels. quoddam virus.

1.5.c.27. FERRE sine cicatrice potest esse:

Cels. his locus, qui expertus ferrum: 1.7.c.2. non est.

Vide CHIRURGUM. CONVULSIONEM. HÆMORRHAGIAM. INTESTINA. PUS. SECTIONEM. TUMOREM.

UMBILICUS.

UMBILICUS.

Vide DOLORES UMBILICI.

URINA.

QUIBUS non sinè febre urinæ Aph. 69.
sunt crassæ, grumosæ & paucæ, Sect. 4.
si ab iis copiosæ & tenues pro-
deant, juvant. Præcipuè verò ta-
les redduntur quibus ab initio,
vel non ità multò post, sedi-
mentum inest.

QUIBUS per febres urinæ sunt Aph. 70.
returbidæ, quales veterini gene- Sect. 4.
ris, iis capitis dolor vel adest,
vel aderit.

QUIBUS septimo die judicatio Aph. 71.
contingit, iis urina rubram die Sect. 4.
quarto nubeculam habet, aliaque
pro ratione.

QUIBUS urinæ pellucidæ, al- Aph. 72.
bæ, malæ, præcipuè verò in Sect. 4.
phreniticis apparent.

QUIBUS speratur aliquid ad ar- Aph. 74.
ticulos abscessurum, urina co- Sect. 4.
piofa & crassa, & alba reddita,
abscessu liberat, qualis in febr-
ibus cum lassitudinis sensu quarto

die quibusdam ferri incipit. Quòd si ex naribus etiàm sanguis effluerit , tùm brevi admodùm solutio fit.

Aph. 75. SI sanguis aut pus cum urinâ Sect. 4. redditur , renum aut vesicæ exulceratio significatur.

Aph. 76. QUIBUS cum urinâ crassâ exi- Sect. 4. guæ carunculæ , aut veluti capilli simul feruntur , iis à renibus excernuntur.

Aph. 77. QUIBUS cum urinâ crassâ fur- Sect. 4. furi similia quædam simul exeunt , iis vesica pforâ laborat.

Aph. 78. QUI spontè sanguinem cum Sect. 4. urinâ effundunt , iis renibus venulam ruptam esse significat.

Aph. 79. QUIBUS in urinâ arenosæ sunt Sect. 4. subsidentiæ , iis vesica calculo laborat.

Aph. 80. SI quis sanguinem & grumos Sect. 4. cum urinâ fundat , & stranguariam habeat , dolorque in inum ventrem & inter scæmineum incidat , quæ ad vesicam attinent laborant.

Aph. 81. SI quis sanguinem & pus , & Sect. 4. squamulas cum urinâ fundat , gravisque dolor adsit , vesicæ exulcerationem significat.

QUIBUS in urinæ fistulâ tuberculum innascitur, eo in pus verso & rupto, solutio contingit. Aph. 82. Sect. 4.

URINA copiosè de nocte red- dita, paucam alvi dejectionem significat. Aph. 83. Sect. 4.

URINÆ difficultatem venæ sectio solvit. Secundæ autem sunt interiores. Aph. 36. Sect. 6.

QUIBUS per febres sedimenta hordei tosti non exactè moliti crassioribus frustulis similia in urinis contingunt, longam fore ægritudinem denunciant. Aph. 31. Sect. 7.

AT quibus biliosa sedimenta, supra verò tenuia fuerint, acutum morbum significant. Aph. 32. Sect. 7.

QUIBUS disparatæ sunt urinæ, iis vehemens est in corpore turbatio. Aph. 33. Sect. 7.

QUIBUS in urinarum summo bullæ consistunt, renum morbum eumque longum fore significant. Aph. 34. Sect. 7.

AT quibus summa urina pinguis est & conferta, iis renum morbum eumque acutum significat. Aph. 35. Sect. 7.

URINARUM ex perfrictione interceptiones pessimæ. Sent. 5. Coac.

Sent. URINÆ quæ cum rigore resti-
25. târunt malum & convulsionem
Coac. prænunciant, tùm verò præci-
puè si antea alto sopore æger de-
tentus fuerit. In his autem ab-
scessus ad aures sperare oportet.

Sent. PROCEDENTE morbo surditas,
198. ac urina subrubra, cum nullo
Coac. sedimento, sed cum sublima-
mentis in medio innatantibus,
mentis emotionem prænunciant.
In his morbo Regio corripì ma-
lum est. Quin etiàm malo est ex
morbo Regio fatuitas. Hos voce
defectos, absquè sensuum læsio-
ne præfocari contingit. Ac for-
tassis etiàm in his alvus malè affi-
citur.

Sent. CERVICIS ac dorsi perfrictio-
263. nes, quæ etiàm totum corpus
Coac. pervadere videntur, convulsio-
nes denunciant, in quibus urinæ
hordei tosti non exactè moliti
crassioribus frustulis similia con-
tinent.

Sent. IN dorsi ac pectoris dolore,
272. cruentæ mixtionis suppressio,
Coac. laboriosum exitum affert.

Sent. QUIBUS incogitantibus urina
474. decidit, ac pudendum contra-
Coac. hitur, ii desperati sunt.

TENUIORIS intestini morbus Sent.
 urinæ stillicidio succedens, intra 475.
 septimum diem interimit, nisi Coac.
 subortâ febre urina affatim pro-
 dierit.

URINÆ tenues, nubeculam Sent.
 quamdam in medio assumentes, 532.
 rigorem denunciant. Coac.

URINA in febre album & leve Sent.
 depositum habens sedimentum, 575.
 celerem liberationem denunciat. Coac.
 Celerem quoquè quæ diluta in-
 discretam quamdam habet pin-
 guedinem. Quæ verò aliquantu-
 lum rubet, subrubrum habet
 sedimentum & leve, si quidè-
 m antè septimum diem appareat,
 septimo die solutionem fore desi-
 gnat, post septimum autèm tar-
 diorem, aut planè diuturnam.
 Et quæ quarto die subrubram
 nubeculam capit, septimo die
 liberat, dùm reliqua pro ratione
 habeant. Tenuis autèm & bilio-
 sa, & ægrè lentum habens sedi-
 mentum, & quæ in meliùs ac de-
 teriùs commutatur, temporis diu-
 turnitatem postulat. Quòd si istud
 diutiùs perseverat, aut ad judica-
 tionem temporis longinquitas re-
 quiratur, periculo non vacat.

Sent. **DILUTA** verò & alba in diu-
 576. turnis morbis perseverans, diffi-
 Coac. cilem & non securam judicatio-
 nem facit.

Sent. **IN** urinis nubeculæ, albæ qui-
 577. dèm & quæ infimum locum te-
 Coac. nent, utiles sunt; rubræ verò,
 nigræ ac lividæ, molestiam ex-
 hibent.

Sent. **IN** præcipitibus morbis peri-
 578. culum denunciat urina biliosa,
 Coac. nequè aliquantulùm rubra &
 quæ hordei tosti non exactè mo-
 liti crassioribus frustulis similia
 habet sedimenta, alba, & quæ
 colore ac sedimento variat, præ-
 cipuèque in his quæ ex capite
 fiunt defluxionibus. Perniciem
 etiàm præsefert, quæ ex nigrâ
 in biliosam tenuem transit, &
 quæ sedimentum habet divul-
 sum, quæquè ex his quæ densata
 per urinam feruntur, quod sub-
 fidet habet aliquantulùm lives-
 cens & limosum. Ac fortassè ex
 his quidèm præcordia dextra do-
 lor occupat, aut ex virore pal-
 lescunt, aut abscessus ad aures
 cum dolore excitantur. In his
 paulo post effusa alvus periculum
 denunciat.

URINÆ derepentè præter rationem parùm concoctæ, vitiosæ sunt. Ac in totum quæ in morbo acuto urina præter rationem cocta est, vitium denotat. In his quoquè malo est prærubra efflorescentia contenta atquè æruginosa. Alba verò effusa & perspicua urina mala est, præcipuè in phreniticis apparens. Mala quoquè quæ post potionem celeritè meiitur, præsertimque in lateris doloribus & pulmonis inflammationibus. Mala etiàm quæ antè rigorem oleosa redditur. Malæ quoquè & in acutis morbis, & quæ ex viridi pallescunt, nèc in colore persistunt.

Sent.
579.
Coac.

PERNICIEM verò indicat urina in quâ nigrum est quod subsidet, & quæ nigra est. In pueris etiàm tenuis potiùsquàm crassa. (In tenuibus autèm contrà quàm in commutatis urinis accidit.) Et quæ grandinem refert & genituræ similis effunditur, itèmq; dolorem exhibet. Perniciosa quoquè est quæcumque inscio ægro redditur. At in pulmonum inflammationibus periculum in-

Sent.
480.
Coac.

dicat , quæ initio coctionem habet , verum post quartum diem tenuis evadit.

Sent. IN laterum doloribus urina
581. cruenta , obscura , cum eo quod
Coac. subsidet vario & indiscreto , ut plurimum in quatuordecim diebus mortem adfert. Laterum quoque dolore affectis inpropinquo mortem esse significat , quæ viridis nigrum habet sedimentum , aut fursuribus simile. Febri verò ardente cum alto stupore (quem *Catochum* dicunt) detentis , exalbida urina pessima est.

Sent. URINA cruda , quæ sic diù per-
582. severat , ut reliqua signa salutaria
Coac. sint abscessum & dolorem præcipuèque infra septum transversum denunciat. Doloribus verò ad lumbos oberrantibus , ad coxam , idque in febre & sinè febre. At quæ emittitur urina in quâ quod subsidet pinguedinem habet , febrem significat. Cruenta verò circa initia reddita , morbi reversionem. Alba autem qualis in *veterino* genere redditur , capitis dolorem : membranosa convulsionem. Quæ verò sputo similia

milia habet sedimenta , aut limosa , rigorem denunciat , quæ *araneorum* telis similia quædam habet , colliquationem. At in errantibus febribus nigræ nubeculæ quartanam denunciant , decolores autem urinæ suspensa quædam in medio nigra habentes , cum pervigilio & perturbatione, phrenitidem , cineritiæ verò cum spirandi difficultate , aquam inter cutem.

URINA diluta aut arenida & facile dissolubili asperitate returbata , liquidam fore alvum denunciat. Quæ verò admodum tenuis spissa evadit , fortassè erup-
 turum sudorem indicat , jam autem erupisse , quæ spumam in se ipsam insidentem habet.

Sent.
583.
Coac.

IN tertianis cum horrore nubeculis nigris similia , inconstantem horrorem indicant. Membranosæ quoque mictiones , & quæ cum horrore subsidunt , convulsiones prædicunt.

Sent.
584.
Coac.

URINA in quâ quod subsidet bonum est , & derepentè evanescit , dolorem ac mutationem denunciat. At quæ sedimentum

Sent.
585.
Coac.

habet , returbida , residens , rigorem circa judicationem , fortè etiàm & in tertianam aut quartanam transitum.

Sent. **LATERUM** dolore affectis urina
586. aliquantulum rubra , levem ha-
Coac. bens subsidentiam , securam judicationem prænunciat. Quæ verò aliquantulum pallida , benè florulenta est , & albam habet subsidentiam , celerem quoquè. At quæ admodum rubra & benè florulenta , sedimentum pallidum , leve ac purum habet , diuturnum valdèque turbulentum morbum fore & in alium transiturum , non tamèn perniciosum. Alba verò , diluta , hordei tosti non exactè moliti crassioribus frustulis simile habens sedimentum , fulvum , dolorem & periculum denunciat. At quæ pallida , fulvum habet sedimentum , hordei tosti non exactè moliti crassioribus frustulis simile diuturnitatem ac periculum indicat.

Sent. **IN** his quæ circa aures absce-
587. dunt , urinæ quæ celeritè &
Coac. parvo tempore concoquuntur , damno sunt. Quin & perfrigerari itidèm malum est.

URINA intercepta & ad imum ventrem pondus, ut plurimum futurum urinæ stillicidium denunciat: sin minus, alium aliquem morbum ex consuetudine affligentem.

IN biliosis urina intercepta mortem brevi affore significat.

FEBRICITANTI urina densitatem habens divulsam, morbi reversionem aut sudorem portendit.

IN febribus longis, parvis, vagis, tenuium urinarum ejectiones, lienis affectionem denunciant.

IN febre variarum interdum urinarum mictiones, morbum producant.

URINÆ quæ non sentientibus effluunt, alias perniciem denunciant. Animadvertendum nùm tales his reddantur quales sunt ubi subsidentiam conturbaveris?

QUIBUS urinæ paucae, grumosa, non sine febre, si ab iis tenues & copiosae prodierint, juvat. Talibus autem circa initia procedunt, aut non multò post sedimentum habent.

Sent.

598.

Coac.

Sent.

599.

Coac.

QUIBUS in urinis citò aliquid subsidet , hi brevi judicantur.

URINÆ præter consuetudinem tenues & crudæ , absquè repletionem , in morbo comitiali obnoxiiis , morbi insultum denunciant , idque præcipuè si in summum humerum , aut cervicem , aut dorsum dolor , aut convulsio incidat , aut torpor totum corpus occupet , aut turbulentum insomnium visum fuerit.

Sent.

600.

Coac.

QUÆ parvâ copiâ apparent , velut stillæ sanguinis , urinæ , vomitiones , & dejectiones , malum quidè penitus denunciant , pessimum verò si exiguis intervallis sese consequantur.

Sent.

29.

lib. I.

Præd.

SI quibus urinæ non recordantibus nèc admonitis effluunt , perniciës portenditur. Animadvertendum etiàm est , nùm & ab iis tales redduntur quales sunt ubi subsidentiam conturbaveris?

Sent.

37. l. I.

Præd.

FEMORIS dolore evanescente , si quid sublime per urinam innatet , mentis emotionem expectare oportet , taliaque qualia circa aurium sonitus contingunt.

Sent.

39.

lib. I.

Præd.

IN gravibus malis tenues maxi-

mè circa caput sudores oboriri,
& corporis incontinentiâ quâ-
dam jactari malum indicat: tùm
verò præcipuè pernicies intendi-
tur, si ista cum urinis nigris con-
tigerint, & spiritus magnus &
concitatus adfuerit.

URINARUM in præcipitibus Sent.
malis ex perfrictione intercep- 51. l. 1.
tiones, pessimæ. Præd.

QUIN & laboriosæ urinæ dam- Sent.
nantur atquè ab his detentæ ru- 59.
bræ quædam efflorescentiæ, & lib. 1.
æruinosæ, parvæque veluti quæ- Præd.
dam stillæ apparentes.

CREBRI ex dorso horrores Sent.
subindè locum commutantes, 75.
graves & difficiles, laboriosam lib. 1.
urinæ suppressionem minantur. Præd.

QUIBUS manus sunt tremulæ, Sent.
cum capitis & cervicis dolore, 95.
levi aliquâ sorditate affecti, ni- lib. 1.
gricantes reddunt urinas & den- Præd.
fas. In his casibus nigrorum pro-
gressum expectare & suspectum
habere oportet.

URINÆ quæ cum rigore resti- Sent.
tant, damno sunt, idque præ- 155. l. 1.
sertim si altus sopor prægressus Præd.
sit. Animadvertendum est, nùm

in his abscessus ad aures sperare oporteat?

Sent.
163.
lib. I.
Præd.

CONSIDERANDUM in quibus speramus abscessus circa aures futuros, nùm ex capite doleant? Aut superiorum partium tenues sudores oboriantur? Aut novus insupèr rigor? Ac deindè nùm alvus affatim prorumpat? Aut aliquo sopore detineantur? Videndum quoquè nùm urinæ dilutæ, cum sublimibus quibusdam innatantibus albidis, & quæ variè exalbescunt & graveolent, abscessus ad aures excitent? Ac fortè quidèm quibus hujusmodi urinæ adsunt, iis crebra è naribus stillatio contingit. An & his quidèm lingua levis est ac minimè aspera?

Præd.
lib. 2.
Pag 88.

URINAM autèm copiâ potui resondentem reddere oportet, & sempèr æqualem, & quàm maximè effusam & ad paulò crassius inclinantem quàm quod potu sumptum est. Quòd si diluta fuerit & copiâ major quàm quod potui sit assignatum, hominem dicto non audientem significat, sed abundantiore uti potu, aut

non posse nutritionem accipere ,
quandiu talis urina reddetur. Si
verò paulatim cum stridore urina
emittatur , aut medicamenti po-
tione hominem indigere , aut
vesicam quodammodo malè af-
fectam denunciat. At sanguinis
mictus rarus quidè & sine febre
ac dolore nihil mali indicat ,
verum lassitudinum sensus solvi-
tur. Quod si sæpius mictu red-
datur , aut horum aliquid accesserit ,
periculum minatur. At præ-
dicendum est , siue cum dolore ,
siue cum febre mictu reddatur ,
pus insuper per urinam effluxu-
rum , atque eo pacto dolores
tolli. Urina verò crassa , in quâ
quod subsidet album est , articu-
lorum dolorem aut tumorem de-
nunciat. Quæ autem sunt reliqua
sedimenta in urinis eorum qui
exercentur , ea omnia à morbis
sunt qui circa vesicam affligunt.
Quod manifestum facient dolo-
res qui aderunt & à quibus vix
liberari queant.

URINA optima est , in quâ per Præn.
omne tempus , quoad morbus p. 40.
judicatus fuerit , subsidet al- & 41.

bum , leve & æquale. Securitam enim brevemque morbum fore significat. Quòd si intermitat, & interdum quidè puram eiatur , interdum etià subfidet album & leve , diuturnior & minù securus morbus evadit. At urina subrubra , simileque quod subfidet , & leve , hæc longè quidè diuturnior quàm prima fit , valdè tamèn salutaris. Sedimenta autèm in urinis crassiores hordei tosti non exactè moliti partes referentia , prava sunt , hisque pejora laminis similia. Alba verò & tenuia , valdè prava , atquè his etià deteriora furfuracea. Nubeculæ quæ per urinas feruntur , albæ quidè , bonæ ; nigræ verò , malæ sunt. Quoad autèm urina fulva fuerit & tenuis crudum esse morbum indicat. Quòd si diutiùs talis urina perseveret , periculum est nè non possit æger sufficere , quoad urina concoquatur. At exitiosiores sunt urinæ fœtidæ , & aquosæ , & nigræ , & crassæ. Ad hæc in viris quidè & mulieribus urinæ nigræ , in pueris aquosæ , deterri-

ma. Quibus urinæ tenues & crudæ multo tempore redduntur, si reliqua signa salutaria sint, in iis abscessus ad loca infra septum-transversum expectari debet. Quin etiâ pinguedines supra innatantes *araneorum* telas referentes, damnare oportet, colli- quationem namque significant. In urinis autem quæ nubeculas habent, considerandum venit, an supernè an infernè ferantur? Et quosnam habeant colores? Et quæ quidè deorsum feruntur, cum dictis coloribus, bonæ cen- sendæ & commendandæ, at quæ fursum feruntur, malæ & vitu- perandæ. Nequè verò tibi impo- nat vesica quoquo modo affecta, si hujusmodi urinas reddiderit. Non enim totius corporis, sed ipsius per se indicium est.

SCIRE licet integrum corpus Celf. esse, cum quotidie manè urina lib 1. alba, dein ruffa est: illud con- cap. 2. coquere, hoc concoxisse signi- ficat.

Vide ABSCESSUM. ALVI EX- CREMENTA. CONVULSIONEM. DEJECTIONES. DOLOREM. HY- DROPEM. SURDITATEM.

UTERUS.

Aph.47. Si uterus quâ parte ad coxam
Sect. 5. incumbit , suppuratus fuerit ,
eum per linimenta medicamento
convenienti illita curari necesse
est.

Aph.54. QUIBUS os uteri durum est , iis
Sect. 5. connivere os uteri necesse est.

Sent. MULIERES quæ ab utero
119. promptè strangulantur , idque
lib. 1. sinè febre , in convulsiones pro-
Præd. pensæ fiunt , quod etiâ *Dorca-*
di contigit.

Præd. MULIERES igitur quæ conci-
lib. 2. pere nequeunt , & pallidæ vi-
P. 107. dentur , absquè febre , nequè ali-
quâ causâ in visceribus existente ,
iis caput dolet , & menses malè
ac sincerè prodeunt , aut certè
pauci , nequè ex longo inter-
vallo sic affectis apparent , &
uteri purgatione indigent. At quæ
tùm benè coloratæ sunt , tùm
benè carnosæ & pingues , & ve-
nas latentes habent , & doloris
expertes sunt , hisque menstrua
aut nullo modo prodeunt , aut
pauca & sincera fluunt : in hujus-

modi naturis difficillimè conceptus procuratur. Quòd si liberè apparentibus menstruis , inculpato sit corpore mulier , nequè concipiat , locus in quo uterus continetur in causâ existimandus est , quo minùs fœtus tollatur. Aut enim contractus est , aut diductus. Reliqua enim quæ hùc contingere solent , cum dolore & decoloratione , ac colliquatione fiunt.

QUIBUS verò ulcus in utero or- Præd.
tum est , sivè ex partu , sivè ex lib. 2.
tuberculo , aut aliâ quâpiam cau- p. 107.
sâ , iis febres & inguinum tumores obveniunt , illorumque locorum dolores. Quòd si partûs purgamenta simul quoquè restiterint , tùm ea mala omninò sunt immoderata & diuturna , acceduntque & præcordiorum & capitis dolores. At verò ubi ulcus sanatum est , locus ille lævior ac durior necessariò efficitur , & minus conceptui idoneus. Quòd si ulcus sinistra tantùm occupet mulierque concipiat , aut ubi adhuc ulcus habet , aut postea ubi convaluit , eam marem potius

enixuram spes est. Sed si ulcus dextra teneat, & mulier concipiat, foetus foemineus magis expectandus est. At si febris prehendat eam quæ concipere nequit, & tussicula detineat, quærendum nûm uterum ulcus aliquod occupet? Aut ex his malis quæ scripsimus aliud quippiam? Et enim ubi nihil mali eo in loco subesse constiterit, quod extenuationem aut conceptûs impedimentum afferrat, sanguinis vomitione refusi metus impendet. Ei verò mulierimēstrua ex necessitate disparuerunt. Si verò febris sanguinis eruptione tollatur, & menses appareant, concipiet. Quod si antè sanguinis eruptionem alivus effusa fuerit pravum in modum, periculum est nè mulier antè sanguinis eruptionem intereat.

Vide DOLORS UTERI.

*Dedit & DEUS huic quoque
Finem.*



HIPPOCRATIS GENUS ET VITA

EX SORANO.



IPPOCRATES genere quidè Couis fuit, Heraclidæ & Phænaretis filius, ab Hercule & Aesculapio ortum ducens, ab uno quidè vigesimus, ab altero verò decimus-nonus. Ejus autè generis seriem commemorant Eratosthenes & Pherecydes, & Apollodorus, & Arius Tarsensis. Heraclidæ verò parentis sui discipulus extitit, deinde Herodici, & ex quorumdam opinione etiam Gorgiæ Leontini oratoris, & Democriti philosophi Abderitani. Peloponnesiacis temporibus viguit, natus ut tradit Istomachus in primo de Hippocratis secta, primo octogesiinæ Olym-

piadis anno , ut verò Soranus
 Cous litterarum monimenta in
 Co perscrutatus addit , regnante
 Abriadâ , mensis Agriani sexto
 & vigesimo die , quo etiâ in
 hunc usque diem Coos Hippo-
 crati parentare ait. Arte autem
 Medicâ & vulgaribus disciplinis
 excultus , vitâ functis parentibus
 patriâ excessit , quod tabularium
 in Cnido incendisset , ut eum
 quidem contumeliosè criminatur
 Andreas , in suo de Artis Medicæ
 origine libro. Alii verò id eo
 proposito fecisse dicunt , ut quæ
 in pluribus locis conficiebantur ,
 spectaret , & in eâ varietate se
 magis exerceret. Ut verò Sora-
 nus Cous narrat , per somnum
 admonitus ut Thessaliam incole-
 ret. Per totam autem Græciam
 Medicinam faciens admirationi
 fuit , adeò ut ad Perdiccam Ma-
 cedonum Regem , qui tabe la-
 borare existimabatur , publicè
 vocatus cum Euryphonte , qui
 eum ætate excedebat pervenerit ,
 & animi morbum esse indicârit.
 Cùm enim post Alexandri patris
 mortem , Philam ejus pellicem

amore deperiret, ad eamque re-
delatâ, postquam ex ejus con-
spectu illum prorsûs immutari
animadvertit, propulsato qui-
dè morbo, Regem sanitati re-
stituit. Ab Abderitanis etiâ vo-
catus est, ut eò se conferret, &
Democritum quidè infaniâ la-
borantem curaret, totam verò
urbem peste liberaret. Quin etiâ
cùm in Illyrios, Pæonas & Bar-
barorum regionem pestis ingru-
ret, earum gentium Regibus ro-
gantibus uti sese ad illos confer-
ret, à legatis edoctus quinam il-
lic ventiut plurimùm perflarent,
illos re infectâ dimisit. Cùm verò
rectâ conjecturâ indicasset mor-
bum in Atticam perventurum,
id quod futurum erat prævidens,
tùm urbium, tùm discipulorum
curam suscepit, in tantumque
Græcos dilexit, ut cum ejus no-
minis gloria ad Persas famâ per-
venisset, eâque de causâ Arta-
xerces per Histanidem Helle-
ponti præfectum cum magnis
muneribus ab eo peteret, uti ad
sese veniret, id ob gravitatem,
pecuniæ contemptum, & pro-

pinquorum amorem recusârit,
 velût per epistolam ad eum scrip-
 tam ostenditur. Patriam etiâ à
 bello quod ei inferre parabant
 Athenienses liberavit, Theſſalis
 in auxilium vocatis, ideòque
 splendidos honores apud Coos
 consecutus est. Quin etiâ à
 Theſſalis, Argivis & Athenien-
 sibus honorificè acceptus est, qui
 eum ab Hercule secundùm pu-
 blicè sacris Eleusiniis initiârunt,
 civitate donârunt, victumque
 ei publicum in Prytaneo ejusque
 posteris dederunt. Candidè & li-
 beralitèr studiosos artem docuit,
 debito addito jurejurando. Obiit
 apud Larissæos, quo tempore
 Democritus mortuus esse fertur,
 ut quidam tradunt, ætatis anno
 nonagesimo, ut alii verò, octo-
 gesimo-quinto, alii centesimo-
 quarto, quidam etiâ centesi-
 mo-nono. Inter Gyrtonem & La-
 rissam sepultus est. Et in hunc
 usquè diem monumentum osten-
 ditur, in quo multo tempore
 examen fuit quod mel conficie-
 bat, quo nutrices infantes super-
 ficiariis oris ulceribus (*Aphthas*
 dicunt)

dicunt) laborantes apud tumulum illiniebant & facile libera-
bant. In multis autem ejus ima-
ginibus capite velato pingitur ,
cum pileo ut quidam dicunt , ve-
lūt Ulyſſes , quod eſt nobilitatis
inſigne , alii verò , cum pallio ,
& ex his alii quidē id fieri prop-
ter decorum volunt , quod cal-
vus eſſet , alii verò propter capi-
tis imbecillitatem , alii autem
expresſâ fanè ſignificatione , quod
principis animæ ſedem probè
munitam eſſe oporteat , alii pe-
grinationis amorem indicare
iſtud dicunt , alii ſcriptorum ob-
ſcuritatem , alii verò , ut demon-
ſtretur etiā ſanitatis tempore
quæ nocent vitari oportere. Qui-
dam verò , quod nè manuum ad-
miniſtratio impediretur , com-
prehenſam circumfluentem ve-
ſtimenti laciniā in caput reji-
ciebat. De ipſius autem ſcriptis
magna eſt diſſenſio ; cū alii alia
ſentiant. Undè cum variæ cauſæ
judicio tenebras offundant , de
his non eſt facile , certum quid
ſtatuerè. Primū quidē agno-
minatio. Secundū dicendi ſti-

386 HIPPOCRATIS, &c.
lum fervare posse. Tertiùm quod
unus & idem quandòque robu-
stius, aliàs remissiùs per ætatem
scribat, aliàsque præter hæc causas
recensere liceat. Pecunias negle-
xit, morum gravitate excelluit,
Græcos maximè dilexit, quare
etiàm gentiles suos omni studio
coluit, adeò ut totas civitates
(quemadmodùm dictum est)
pestilentia liberaverit. Ex quo &
præclaros honores, non apud
Coos tantùm, sed & Argivos &
Athenienses adeptus est. Mor-
tuos duos reliquit filios, Thessa-
lum & Draconem, at discipulo-
rum magnum numerum. Carissi-
mos autèm suos filios reliquisse
dicitur.

L. D. B. M. V.

FINIS.

*Approbatio Saluberrimæ Fa-
cultatis Parisiensis.*

NOS Doctores Medici Re-
gentes Facultatis Medicæ in
Univerſitate Pariſienſi, & ab eâ-
dem Facultate Examinatores de-
nominati, legimus *Manuale Me-
dicorum, &c.* de novo mandandum
Typis, *Selectioribus CELSI Sen-
ſentiis auctum & locupletatum, accu-
rante M. GUYOT, Doctore Me-
dico Pariſienſi.* Opus illud exa-
ctiori adhuc diligentia recolle-
ctum, Medicinæ ſtudioſis ma-
ximæ utilitatis fore cenſemus.

DATUM Pariſiis die decimâ-
quintâ Januarii 1739.

BARON, Antiquus Facul-
tatis Decanus.

BERTRAND, Antiquus
Scholarum Profeſſor.

LECTA relatione Clariffi-
morum Virorum quos Fa-
cultas renuntiaverat Examinato-
res Libri cujus titulus eſt *Manuale*

Medicorum, &c. in lucem prodeat
hic Liber per me licet.

CHOMEL, Saluberrimæ Fa-
cultatis Decanus, Medicus
Regis Ordinarius, necnon
Regiæ Scientiarum Acade-
miæ Socius Veteranus.

Die 17^a. Januarii 1739.

Approbatio Censoris Regii.

ILLUSTRISSIMI Franciæ
Cancellarii jussu Codicem Ma-
nuscriptum cui titulus est *Ma-
nuale Medicorum, &c.* accuratè per-
legi, eumque censui dignissi-
mum, qui Typis mandetur.

DATUM Parisiis, die 28^o.
Januarii, ann. 1739. BURETTE.

PRIVILEGE DU ROY.

LOUIS PAR LA GRACE DE DIEU
ROI DE FRANCE ET DE NA-
VARRE , à nos Amés & féaux Con-
seillers les Gens tenans nos Cours de
Parlement , Messieurs des Requêtes
ordinaires de notre Hôtel , Grand
Conseil, Prevôt de Paris , Baillifs , Sé-
néchaux , leurs Lieutenans Civils , &
autres nos Justiciers qu'il appartiendra , SALUT. Notre bien Amé
GABRIEL-FRANÇOIS QUILLAU ,
Imprimeur & Libraire à Paris , Nous
ayant fait remontrer qu'il souhaiteroit
imprimer , ou faire imprimer & don-
ner au Public *Manuale Medicorum , seu
promptuarium Hippocratis : Dis-
cours prononcés au Parlement de Pro-
vence , par un de Messieurs les Avocats
Généraux* , s'il Nous plaisoit lui ac-
corder nos Lettres de Privilége sur
ce nécessaires , offrant pour cet effet
de les imprimer ou faire imprimer
en bon papier & beaux caractères ,
suivant la feuille imprimée & atta-
chée pour modèle sous le contrescel
des présentes : A CES CAUSES
voulant favorablement traiter ledit
Exposant , Nous lui avons permis
& permettons par ces présentes , d'im-
primer ou faire imprimer lesdits li-

vres ci-dessus spécifiés en un ou plusieurs volumes , conjointement ou séparément , & autant de fois que bon lui semblera , & de les vendre , faire vendre & débiter par tout notre Royaume , pendant le tems de six années consécutives , à compter du jour de la date desdites présentes ; Faisons défenses à toutes sortes de personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient d'en introduire d'impressions étrangères dans aucun lieu de notre obéissance ; comme aussi à tous Imprimeurs , Libraires & autres d'imprimer , faire imprimer , vendre , faire vendre , débiter ni contrefaire lesdits livres ci-dessus exposés , en tout ni en partie , ni d'en faire aucuns extraits sous quelque prétexte que ce soit d'augmentation , correction , changement de titre ou autrement , sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant , ou de ceux qui auront droit de lui , à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits , de trois mille livres d'amende contre chacun des Contrevenans , dont un tiers à Nous , un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris , l'autre tiers audit Exposant , & de tous dépens , dommages & intérêts. A la charge que ces présentes seront enregistrées tout au long sur le Régistre de la Communauté des Impri-

meurs & Libraires de Paris , dans
trois mois de la date d'icelles. Que
l'impression de ces livres sera faite
dans notre Royaume & non ailleurs ,
& que l'Impetrant se conformera en
tout aux Réglemens de la Librairie ,
& notamment à celui du dixième
Avril mil sept cent vingt-cinq ; &
qu'avant que de les exposer en vente
les Manuscrits ou imprimés qui au-
ront servi de copie à l'impression
desdits livres , seront remis dans le
même état où les Approbations y
auront été données , ès mains de notre
très-cher & féal Chevalier le sieur
DAGUESSEAU Chancelier de France ,
Commandeur de nos Ordres , &c.
Qu'il en sera ensuite remis deux
exemplaires de chacun dans notre
Bibliothèque publique , un dans celle
de notre Château du Louvre , & un
dans celle de notredit très-cher &
féal Chevalier le sieur Daguesseau
Chancelier de France , Commandeur
de nos Ordres ; le tout à peine de nul-
lité des présentes , du contenu des-
quelles vous mandons & enjoignons de
faire jouir ledit Exposant ou ses ayans
causes , pleinement & paisiblement ,
sans souffrir qu'il leur soit fait aucun
trouble ou empêchement : Voulons
que la copie desdites présentes qui sera
imprimée tout au long au commence-
ment ou à la fin desdits livres , soit te-

que pour duement signifiée , & qu'aux
copies collationnées par l'un de nos
Amés & féaux Conseillers & Secrétaires ,
foi soit ajoutée comme à l'original ;
Commandons au premier notre
Huissier ou Sergent , de faire pour
l'exécution d'icelles tous Actes requis
& nécessaires , sans demander autre
permission , & nonobstant clameur de
Haro , Chartre Normande , & Lettres
à ce contraires : Car tel est notre plaisir ,
DONNE' à Versailles le vingt-
quatrième jour d'Avril , l'an de grace
mil sept cent trente-neuf , & de notre
Regne le vingt-quatrième. Par le Roi
en son Conseil.

SAINSON.

*Registré sur le Registre dix de la
Chambre Royale des Libraires & Im-
primeurs de Paris No. 232. Fol. 211.
conformément aux anciens Réglemens
confirmés par celui du 28. Février
1723. à Paris le 22. May 1739.*

LANGLOIS , Syndic.







